United States
Department of
Agriculture

Forest Service

Pacific Southwest
Research Station

Informe Técnico General
PSW-GTR-227 (Spanish)
March 2009

Memorias del Tercer Simposio Internacional Sobre Economía, Planificación, y Políticas de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes

El Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU. está dedicado al principio de manejo de usos múltiples de los recursos forestales de la Nación para el flujo sostenido de madera, agua, forraje, vida silvestre y la recreación. Siguiendo el mandato del Congreso, trata de proveer una cantidad mayor de servicios a una Nación en crecimiento a través de investigaciones forestales, la cooperación con los Estados y los dueños de bosques privados, y el manejo de los Bosques Nacionales y las Tierras de Pastos Nacionales.

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, siglas en inglés) prohíbe la discriminación en todas sus actividades y programas por razones de raza, color, nacionalidad de origen, edad, discapacidad; y cuando sea aplicable, por razones de sexo, condición civil, condición familiar, condición de paternidad, religión, preferencia sexual, información genética, convicciones políticas, revanchismo, o porque una parte o todo del sustento económico de la persona provenga de los programas de beneficencia pública (no todas las prohibiciones aplican a todos los programas). Las personas con discapacidad que necesiten medios alternativos para recibir información sobre los programas (Braille, impresos grandes, cintas de audio u otros) deben contactar el Centro TARGET del USDA al teléfono (202) 720-2600 (voz y TDD). Para establecer una querrela sobre discriminación, por favor escriba a USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 ó llame al (800) 795-3272 (voz) o (202) 720-6382 (TDD). El USDA es un empleador que provee oportunidades iguales para todos.

Coordinador Técnico

Armando González-Cabán es Economista Investigador, Departamento de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, 4955 Canyon Crest Drive, Riverside, CA 92507.

Los trabajos fueron provistos por los autores listos para publicación. Los autores son responsables por la exactitud y el contenido de los mismos. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la posición del Departamento de Agricultura.

Memorias del Tercer Simposio Internacional Sobre Economía, Planificación, y Políticas de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes

Armando González-Cabán
Coordinador Técnico

Departamento de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal
Estación de Investigación del Pacífico Suroeste
Albany, California
Informe Técnico General PSW-GTR-227 (Spanish)
Enero 2009

Resumen

González-Cabán, Armando. 2009. Memorias del tercer simposio internacional sobre economía, planificación, y políticas de los incendios forestales: problemas y enfoques comunes. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-227 (Español). Albany, CA: Departamento de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste. 446 p.

Estas memorias resumen el resultado de un simposio diseñado para discutir los problemas actuales que confrontan las agencias con responsabilidad para la protección contra incendios forestales a nivel federal y estadual en los EE.UU., al igual que agencias en la comunidad internacional. Los temas discutidos en el simposio incluyen economía del fuego, teoría y modelos para la planificación estratégica de incendios, análisis económico y modelización del manejo de incendios, incendios forestales y manejo de bosques sustentables, políticas públicas y manejo de bosques, el tratamiento de combustibles peligrosos, el uso de los incendios forestales y las actividades de extinción de incendios: ¿balance positivo o ilusión?, ejemplos de planes de manejo de incendios; asignación estratégica de recursos para el manejo de incendios, etc., la perspectiva regional, nacional y global de los incendios forestales: problemas y enfoques comunes, y el papel de las organizaciones internacionales en la solución de los incendios forestales. Representantes de agencias internacionales de 12 países con responsabilidad de protección contra incendios forestales presentaron y discutieron sus experiencias sobre estos temas. En el simposio se presentaron 36 ensayos invitados y voluntarios, y 18 pósteres que discutieron los tópicos y presentaron técnicas actualizadas para tratar los temas de políticas, planificación, y economía de incendios forestales a administradores de terrenos y de programas de manejo del fuego.

Palabras claves: Economía del fuego, intercambio en el manejo de combustibles, valoración de intangibles, política pública y el manejo de incendios forestales, planificación estratégica de incendios forestales, manejo sustentable del bosque.

Prefacio

Durante la pasada década, los costos del manejo de fuegos han ido en continuo aumento debido, en gran parte, al alza en los gastos relacionados con la extinción de grandes incendios forestales. Fuegos frecuentes de grandes proporciones han producido enormes costos debido a la pérdida de vidas, propiedad y recursos naturales. Además, cada vez se reconoce más la inutilidad de combatir incendios en ecosistemas donde las antiguas políticas de exclusión de fuegos han causado una acumulación peligrosa de combustible. Esta situación se repite en países como Argentina, Chile, España, Canadá, Australia y en países centroamericanos como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Colombia, que sufren serios problemas de incendios forestales. En la cuenca del Caribe, países como Cuba y la República Dominicana también atraviesan por situaciones similares. En el año 2005 ocurrieron por primera vez en Puerto Rico grandes incendios en la interfaz urbano-forestal del Municipio de Mayagüez.

Las presiones de índole social y política, como las que se presentan en las zonas de interfaz urbana y de usos múltiples, representan trabas a la implementación de los recientes cambios de filosofía en las agencias con respecto al manejo de ecosistemas sustentables. No se comprenden bien las repercusiones económicas de otras estrategias de manejo. La comparación de la costo-efectividad de los fuegos prescritos con la costo-efectividad de otras estrategias se complica debido a dificultades analíticas. Puede que los gastos ocasionados por los grandes incendios guarden poca relación con el valor de lo que está en peligro. Las herramientas de análisis con las que contamos actualmente para justificar las asignaciones presupuestarias y demostrar los beneficios pocas veces toman en consideración todos los factores que contribuyen a los costos del manejo de incendios y a los cambios en los valores netos. Fuera de América del Norte (Canadá y EE.UU.) y, recientemente, de España, es muy poco lo que se ha hecho por analizar las consecuencias económicas de las diferentes alternativas de manejo de incendios. Últimamente muchos países han reconocido la necesidad de analizar, desde un punto de vista económico, las inversiones que hacen en el manejo de los incendios forestales. Sin embargo, pocos han desarrollado las herramientas necesarias para realizar esta tarea.

En EE.UU. muchos informes han reconocido la importancia de optimizar los costos del manejo de los incendios, pero el progreso hacia este fin ha sido lento, vacilante y difícil. Las recomendaciones contenidas en varios estudios que reexaminaron la política de extinción de incendios después de la desastrosa temporada de incendios de 1994, y después de las temporadas de 1998, 2000 y 2003, señalan la necesidad patente de un foro en el que los responsables de formular la política pública, las entidades que administran los recursos naturales, los especialistas en control y extinción de incendios, y los profesionales relacionados con la materia puedan intercambiar ideas y aprender de las inquietudes y experiencias comunes.

En la primavera de 2004 se celebró en Córdoba, España, el II Simposio Internacional sobre Políticas, Planificación y Economía de Incendios Forestales para lidiar con los problemas delineados aquí. Desde entonces, sucesos desastrosos en las temporadas de incendios de 2003, 2004 y 2005 han exacerbado el problema. Ha habido muchos cambios en política en respuesta a los nuevos desafíos. Nuevamente es necesario reunir a la comunidad de administradores y profesionales de las agencias de control de incendios forestales, a los encargados de administrar los recursos naturales, investigadores, técnicos forestales, economistas, estudiantes y responsables de la política pública para discutir problemas, experiencias y respuestas recientes a la problemática de los incendios forestales. El propósito del simposio propuesto es 1) reunir a individuos interesados en el intercambio de ideas relacionadas con la economía, la planificación y las políticas de manejo de los incendios forestales; 2) dar a conocer los avances y tecnologías más recientes dirigidas a optimizar los gastos del manejo de incendios; 3) sopesar los pros y los contras del tratamiento de los combustibles peligrosos y el uso de los incendios forestales versus los gastos de extinción; y 4) compartir los adelantos recientes en los modelos para la planificación estratégica de incendios.

¡Gracias!

Armando González-Cabán

Carolina, Puerto Rico

Abril 29, 2008

Tabla de Contenido

- 1 Los Incendios Forestales en la Cuenca Mediterránea
ÜBæå[Å. |. ^: Å ~ fi[:
- 9 Asia y Australasia Manejo de Incendios Forestales: Una Perspectiva Regional
Öæ^Å[i *æ
- 27 Aproximaciones Sobre la Protección Contra Incendios Forestales en Centro y Sur América
Ö ~ å | ^ i { [Å R | å Å Ö ^ æ Å
- 38 Hacia un Adelanto en la Teoría Económica de los Incendios Forestales
Ö[~ * | æ Å æ ^ [~ æ Å Å ^ æ Å Å æ Å ^ Å Å • & @
- 50 Problemática de los Incendios Forestales en Costa Rica, su Sistema de Voluntariado y su Estructura Organizacional
Öå ^ i q Å i : ~ ^ ^: Å [å i ö ~ ^:
- 61 Predicciones Estacionales de la Gravedad de los Incendios Forestales
Ü @ Ö Ö @ Å @ } É P æ æ [~ • Ö ' ^ å | ^ i É Ö æ & å Å ~ å \ æ Å Ö @ Å É Ö } [å É Å Ö @ Å É Ü [æ •
- 78 Los Incendios Forestales Recurrentes, ¿Afectan la Demanda de Compradores de Vivienda en Áreas de Alto Riesgo? Un Análisis Hedónico de los Efectos a Corto y a Largo Plazo de los Incendios Forestales Recurrentes en los Precios de las Viviendas en el Sur de California
R | å Å É Å ~ ^ | ^ i É Å Ö Å Ö [{ å É Å Ö æ å å [Å Ö] : i | ^: É Ö æ i } Å
- 92 El Costo del Fuego en Australia
Ö E Y Å Ö @ É É É Å Ö Å ^ } ^ ^ Å Å Ö Å Ö æ æ Å
- 116 El Efecto de los Incendios Forestales sobre la Salud y la Economía: Revisión de la Bibliografía y Evaluación del Impacto
Q ~ Ö Å [& Ö Å Ö Å [{ å É Ü æ Å æ Ö Ö [É Å Ö ^ ~ ^ ^ Å Ö] [ç æ Å
- 133 El Desarrollo de una Base Probabilística en Apoyo a las Decisiones sobre el Manejo de Incendios Forestales
Ý ~ Å ^ æ Å Ö [~ * | æ Å æ ^ [~ Å
- 143 Un Modelo Logit Mixto de las Preferencias de los Propietarios para Reducir el Riesgo de Incendios Forestales
V Ö { æ Å Ü É [{ ^ • É Å Ö Å [{ å É Å Ö æ å å [Å Ö] : i | ^: É Ö æ i }
- 160 El Método de Modelo de Elección para Valorar un Programa de Prevención de Incendios en Cataluña (España)
Ü [å ^ i ö Å æ • æ É Å Å ^ i 5 } æ æ Ö æ i ^ i æ Å
- 174 Los Impactos de los Fuegos y la Vulnerabilidad Socioeconómica de los Ecosistemas Forestales: Un Enfoque Metodológico Usando Teledetección y Sistemas de Información Geográficos
Ö Å [å i ö ~ ^: Å Å ç æ Å Ü É Å [å æ Å æ ö ^: É Å É É Å ^ i ^ i æ Å æ @ & æ Å Å Å Å Å Ü É æ [i æ Ö æ É

- 190 Una Función de Posición para Dos Tratamientos de Combustible para Reducir la Cantidad de Acres Quemados por Incendios Forestales: Una Prueba de Alcance y una Comparación de Viviendas de Blancos e Hispanos
 $\hat{A}[\tilde{\alpha}] \otimes [\tilde{\beta}] [\{ \tilde{\gamma} \in A_i |] * P^*)^{EAE} \{ \vartheta \dot{\alpha}[\tilde{\Delta}] : i | ^\cdot : E_{aa} \}$
- 200 Efectos de las Actitudes Hacia el Riesgo en una Decisión de Ataque Extendido
 $\tilde{O}\}_{\vartheta \dot{\alpha} \tilde{D}} \{ \tilde{\omega}'^* [! EAE \{ \vartheta \dot{\alpha}[\tilde{\Delta}] : i | ^\cdot : E_{aa} \} \} \bar{A}$
- 212 ¿Qué Propició el Interés del Servicio Forestal en la Valoración de Intangibles?
 $\hat{A}[\tilde{\alpha}] \otimes [\tilde{\beta}] [\{ \tilde{\gamma} \in AE \{ \vartheta \dot{\alpha}[\tilde{\Delta}] : i | ^\cdot : E_{aa} \} \} \bar{A}$
- 224 La Figura del Técnico de Brigada Helitransportada. Hacia la Profesionalización del Sector
Ó $\{ aaU^\sim \wedge . aa \delta' , ; \}_i$ } á $^\cdot :$ ÉÖ' á $'[x]$ Ö' $[q]$ Éö'| $\cdot$ aa| ÉÖ { q*[ÁÉ [j q æ'^'.].} ÉÁ /~~~~~Ü } Ü' ~• Éj á!.. Á
- 240 Compensación por Incendios Forestales: Un Ejercicio de Valoración Contingente con Pago Fijo y Variación en los Niveles de Calidad Ambiental
Ö' | & AE { [] } aaÖ' !! $*$ [ÉÄÜ' ÄÜä/a
- 253 Examen de los Sistemas de Detección de Incendios Existentes en Europa y en el Norte de África
T ÉÖ [|æ| ÉÜ' ~* [ÉÖÉ [] ç | ÉRü] |æ æZÖP'^!' | ÉÖÉ' çá ä|æ ÉÖM~ • : É /~~~~~ÜÜ : &* ç | ÉRüç } x | ÉÄÜ' ~• à [~ Á
- 265 Análisis Regional de la Interfaz Urbano-Forestal en la Gestión del Riesgo de Incendio en España
Ö' { æP'^!' |
- 277 Usos Responsables del Fuego en el Manejo de los Incendios Forestales: Una Visión General de la Situación Europea
OEß : æ [
- 291 Análisis del Manejo de Riesgo de Incendio Forestal Desde la Perspectiva de las Políticas Territoriales: Fortalezas y Debilidades del Marco Europeo
AUPE ~ ç æSÇQaa) æÄ OEß : æ [
- 305 Análisis Comparativo de las Políticas Forestales Europeas y su Influencia en el Manejo de Incendios
AO' { æP'^!' |æÖ' á $'$ æSi : æ [ÉÄÖ' ã q æÁ [] ç |
- 318 Puesta en Vigor de un Código de Prácticas para el Manejo del Fuego en Victoria
OE ^^Pæ, [[áÄÜ&q|^Á æÁ
- 331 Modelización de Decisiones para el Análisis de Incidentes de Fuego
Ö' } çãÖÉÆ æÖ'! $*$ [! ÁAE { çá ä[Å] : i | ^\cdot : E_{aa} \} \bar{A}
- 339 Un Esquema Basado en los Sistemas de Información Geográfica para Evaluar las Inversiones en el Manejo de Incendios: Distribución Espacial del Valor de Recreación
S^)} ^c QEFÖe'^') |æ ÉÖ { çá ä[Å] : i | ^\cdot : E_{aa} \} ÉÖæq æ(Ü' ^\cdot : ÉÄ~ æãÅ @ç':
- 350 Un Estudio de los Factores Socioeconómicos que Influyen sobre la Incidencia de Fogos en los Países de la Cuenca del Mediterráneo
Úæ æ q ç S [~ | ^\cdot ÄAQæ } ã Á æ [] [~ || • Á

- 357 La Modelización del Comportamiento del Fuego en Islas Tropicales Utilizando Datos Meteorológicos de Alta Resolución
R. Q. V. E. O. } [a. E. O. } & a. T. E. O. } l. a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. }
- 370 Regímenes de Incendios Forestales y Variabilidad Ecosistémica
M. U. a. } [l. O. } i. ~ & a. E. O. } & a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. }
- 383 Evaluación de los Incendios y Conservación de la Biodiversidad en los Estados Unidos Contiguos
S. E. O. } \ ^ } • @ E. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. }
- 400 Reflexiones Acerca de la Eficiencia de los Tratamientos de Combustible
M. U. a. } a. E. O. } a. E. O. }
- 417 El Uso del Fuego Prescrito en España para un Manejo Rentable del Combustible
O. E. E. } [l. a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. }
- 423 Cartografiado del Balance Entre los Valores Amenazados en la Interfaz de las Zonas Naturales con las No Naturales
O. E. a. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. } a. E. O. }
- 437 La FAO y sus Asociados en el Manejo de Incendios: Un Enfoque Participativo e Integrado
U. a. } a. E. O. } a. E. O. }

Los Incendios Forestales en la Cuenca Mediterránea¹

Ricardo Vélez Muñoz²

Resumen

Los incendios forestales en la Cuenca Mediterránea no sólo son consecuencia de largos períodos de sequía, sino que pueden considerarse como un indicador de las diferencias socioeconómicas entre las distintas zonas de la misma y su grado de desarrollo. Los países mediterráneos al norte de la Cuenca (Europa) son los que registran el mayor número de incendios y las más extensas superficies quemadas, precisamente como consecuencia de su mayor desarrollo económico.

Los cambios socioeconómicos de las últimas décadas influyen en el riesgo de incendios al incrementar la combustibilidad de los ecosistemas.

Para hacer frente a dicho riesgo, durante las dos últimas décadas, los países del Sur de Europa han mejorado intensamente sus recursos de extinción con un alto coste económico y resultados aparentemente aceptables. Sin embargo, las posibilidades de seguir realizando grandes inversiones para hacer frente al continuo agravamiento del problema parecen casi agotadas.

La mayor parte de los recursos se concentra en los trabajos de extinción, con el criterio general de que todos los fuegos deben apagarse. El principio de extinción integral y, la disponibilidad de recursos económicos han permitido mejoras importantes en la formación y equipamiento del personal, así como la generalización en el empleo de medios aéreos. Cada verano cerca de 400 aeronaves intervienen en la extinción de los incendios forestales en los países mediterráneos europeos.

No existe un banco de datos que permita conocer las inversiones en defensa contra incendios forestales. Puede estimarse, sin embargo, que los cinco países mediterráneos de la UE invierten más de 2.500 millones de euros anualmente en prevención y extinción, de los cuales el 60% se destina a equipo, personal y operaciones de extinción y el resto a trabajos preventivos.

Un problema nuevo, cuya presencia se hace más patente en cada nueva época de verano, es el riesgo de incendio en la interfaz urbano/forestal. Este problema, está creando gran preocupación al irse extendiendo las edificaciones por las zonas forestales como residencias

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Programas de Protección Contra Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes. 29 de abril – 2 de mayo, 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Ministerio de Medio Ambiente, Área de Defensa Contra Incendios Forestales, Dirección General para la Biodiversidad, Gran Vía San Francisco 4, 28005 Madrid, España, rvelez@mma.es

tanto permanentes como secundarias, bien en las costas, bien en las montañas con influencia de las grandes ciudades. La legislación preventiva de este problema no existe o es claramente insuficiente, por lo que es previsible que este problema llegue a alcanzar gravedad catastrófica.

Los incendios de 2007 en Grecia han sido una trágica prueba de la existencia de este problema. También han servido para mostrar las posibilidades de cooperación al ser desplazados numerosos recursos de extinción desde los países al Oeste del Mediterráneo hacia el Este, para ayudar en las zonas de mayor riesgo.

1. Introducción

Los incendios en la Cuenca Mediterránea no sólo son consecuencia de largos períodos de sequía, sino que pueden considerarse como un indicador de las diferencias socioeconómicas entre las distintas zonas de la misma y su grado de desarrollo. Los países mediterráneos al norte de la Cuenca (Europa) son los que registran el mayor número de incendios y las más extensas superficies quemadas. Esta tendencia parece que empieza a contagiarse desde el noroeste hacia el este.

Los cambios socioeconómicos de las últimas décadas influyen en el riesgo de incendios al incrementar la combustibilidad de los ecosistemas. Los cambios de mayor repercusión son los siguientes:

- a) La despoblación de las áreas rurales da lugar a un proceso acelerado de abandono de tierras, que son invadidas por la vegetación espontánea con un alto grado de combustibilidad. Además el envejecimiento de la población restante incrementa el riesgo, debido a las quemadas tradicionales realizadas por agricultores y pastores para manejar la vegetación.
- b) La concentración de la población en las zonas urbanas va ampliando la interfaz urbano/forestal. Las nuevas residencias, permanentes o secundarias, se ven amenazadas por la espesura creciente en las zonas circundantes.
- c) El cambio en las prioridades de la política forestal, que anteriormente se centraban en la producción de madera y otras materias primas, y que actualmente son la conservación de la Naturaleza, el paisaje, y el recreo. La disminución en las extracciones de madera y leña en algunas zonas incrementa las acumulaciones de biomasa en el monte, con alta combustibilidad.

La reducida frecuencia de incendios en los países del sur y del este de la Cuenca, en los que no se han producido dichos cambios, contrasta fuertemente con el alto riesgo en los países europeos de la misma.

Para hacer frente a dicho riesgo, durante las dos últimas décadas, los países del “club del fuego” (Portugal, España, Francia, Italia, Grecia) han mejorado intensamente sus recursos de extinción con un alto coste económico y resultados aparentemente aceptables. Sin embargo, las posibilidades de seguir realizando grandes inversiones para hacer frente al continuo agravamiento del problema parecen casi agotadas. Por ello la defensa contra incendios forestales precisa nuevos enfoques para mejorar las estrategias de prevención y extinción.

2. Factores condicionantes de la situación

2.1 Factores ecológicos

La meteorología y su modificación por el cambio climático no hacen prever la reducción de los largos períodos de sequía (3 – 6 meses) en los que la inflamabilidad de la vegetación es muy elevada. Además se observa un incremento de la frecuencia de tormentas secas en dichos periodos que, al coincidir con extensas acumulaciones de combustibles ligeros en los campos por el abandono rural, pueden iniciar fuegos de gran intensidad en varias zonas simultáneamente.

2.2 Factores económicos

Las zonas forestales de clima mediterráneo tienen una renta económica muy reducida en comparación con cualquier otro sector, debido al lento crecimiento de las especies que las pueblan y a la escasa demanda de los productos que pueden obtenerse, con la excepción del corcho. El escaso valor económico directo disuade las inversiones que podrían mejorar su productividad. En España el Sector forestal supone solamente el 5% del mercado ambiental.

El riesgo de incendios forestales es además otro factor negativo para la economía. Hasta ahora no ha sido posible establecer y mucho menos consolidar un sistema de seguros contra incendios que faciliten la obtención de créditos y, por tanto, las inversiones.

Lamentablemente los valores ambientales de las áreas forestales no logran atraer capitales en busca de rentabilidad.

2.3 Factores demográficos

La Cuenca Mediterránea es una región del Mundo con población en crecimiento. En 1950 llegaba a 225 millones de personas, que pasaron a 450 millones en el año 2000

y que previsiblemente llegarán a 600 millones en 2050. Sin embargo esa población se va concentrando en las zonas costeras y en algunas aglomeraciones urbanas del interior.

Debido a ello la población urbana para el conjunto de la Cuenca alcanzaba el 60% del total en 1970 y es ya del 70% en 2000. En los países del norte de la Cuenca esa proporción está ya en el 90%. Es decir las áreas rurales comienzan a estar vacías y, en particular, las forestales de montaña pueden calificarse como desiertas.

Los intensos movimientos migratorios actuales no modifican esta situación, ya que los inmigrantes se concentran en las áreas urbanas y en las zonas agrícolas de alta productividad, es decir, donde hay más oportunidades de empleo.

La desertización de las zonas rurales produce en plazo corto el abandono de tierras y su recuperación por la vegetación espontánea que durante muchos años presentará una combustibilidad alta. La escasez de población se traduce además en la falta de mano de obra para realizar los trabajos forestales en general y los de defensa contra incendios en particular.

2.4 Factores políticos

Lo indicado en los puntos anteriores no describe un panorama muy atractivo para que haya interés político en proteger los montes. Sin embargo la demanda de protección ambiental por la población urbana (la que vota) ha contribuido al establecimiento de programas permanentes de protección como uno más de los servicios que presta el Estado del Bienestar. Estos servicios, sin embargo, adolecen de los defectos típicos de dicho enfoque. En primer lugar, se atiende lo urgente (la extinción) y apenas quedan recursos para lo importante (la prevención).

En segundo lugar, el intervencionismo de las Administraciones genera, por una parte, pasividad de la población y, por otra, exigencia de resultados imposibles en condiciones extremas de peligro no bien comprendidas por la población.

3. Los resultados del trabajo de extinción

Como se ha dicho, la mayor parte de los recursos se concentra en los trabajos de extinción, con el criterio general de que todos los fuegos deben apagarse. La política norteamericana de dejar quemar en algunas zonas (fuego prescrito natural) no es considerada como posible en ningún caso.

La gran concentración de bienes a proteger en las zonas urbanas, acompañada por el desarrollo de servicios contra incendios en ellas, ha producido en muchos casos la transferencia de las responsabilidades en extinción a dichos servicios, disociándolos de las actividades forestales.

Esa transferencia, al no ir acompañada de una especialización en técnicas forestales, ha dado lugar a períodos más o menos largos de descoordinación y deficientes resultados. Poco a poco, sin embargo, los conceptos de comportamiento del fuego forestal y las técnicas específicas de ataque se van generalizando, junto a una mayor coordinación entre servicios contra incendios y servicios de gestión forestal.

El principio de extinción integral y, afortunadamente, la disponibilidad de recursos económicos han permitido mejoras importantes en la formación y equipamiento del personal, así como la generalización en el empleo de medios aéreos. Cada verano cerca de 400 aeronaves intervienen en la extinción de los incendios forestales en los países mediterráneos europeos.

Ese principio significa que se acumulan todos los medios disponibles sobre el fuego con el único objetivo de minimizar los daños a cualquier coste, incluso si es superior a aquéllos.

4. Presupuestos destinados a defensa contra incendios forestales

No existe un banco de datos que permita conocer las inversiones en defensa contra incendios forestales. Puede estimarse, sin embargo, que los cinco países mediterráneos de la UE invierten más de 2.500 millones de euros anualmente en prevención y extinción, de los cuales el 60% se destina a equipo, personal y operaciones de extinción y el resto a trabajos preventivos.

5. Nuevos y viejos problemas

Las bases de datos de incendios forestales muestran que los incendios forestales son un problema permanente de naturaleza estacional en la región mediterránea. A pesar de la despoblación rural, la mayoría de los incendios siguen teniendo su origen en las prácticas tradicionales de quema con finalidades agropecuarias (quemadas de restos agrícolas, quemadas de pastos secos). Los fuegos de invierno en las zonas montañosas (Cantábrico, Pirineos, Alpes) recorren a veces extensas superficies y están obligando a modificar la estrategia de los servicios contra incendios, focalizados en la época de verano, y a disponer de medios movilizables también en invierno.

Las acumulaciones de combustibles, que el abandono de tierras produce en grandes extensiones, favorecen los grandes incendios. Además una causa menor hasta hace algunas décadas, como el rayo, puede incrementar sobre esas grandes extensiones la ocurrencia de grandes incendios. Las trágicas temporadas de 1994 en España y de 2003 en Portugal y Francia fueron causadas principalmente por la conjunción de rayos y acumulaciones extensas de combustibles en los montes.

Intensos efectos erosivos aparecen tras los grandes incendios como era previsible. Es un ejemplo de problema crónico agravado en los últimos tiempos.

Un problema nuevo, cuya presencia se hace más patente en cada nueva época de verano, es el riesgo de incendio en la interfaz urbano/forestal. Este problema, que era considerado como específico de otras regiones del Mundo (California, Australia), está creando gran preocupación al irse extendiendo las edificaciones por las zonas forestales como residencias tanto permanentes como secundarias, bien en las costas, bien en las montañas con influencia de las grandes ciudades. Los accidentes con destrucción de casas y víctimas humanas entre residentes se hacen más frecuentes. Los servicios contra incendios se ven obligados a concentrarse, por ello, en la protección de las viviendas y abandonar la defensa de la vegetación. La legislación preventiva de este problema no existe o es claramente insuficiente, por lo que es previsible que este problema llegue a alcanzar gravedad catastrófica.

6. Coordinación internacional

Constitucionalmente la Unión Europea carece de una política forestal, ya que no fue considerada en el Tratado de Roma. Sin embargo, en la última década ha habido algunos movimientos para llenar esta laguna, como la aprobación de una Estrategia forestal por el Parlamento Europeo y la aprobación del Programa de reforestación de tierras agrarias marginales. Además, desde 1985 hasta 2001 ha funcionado una serie de Reglamentos para la prevención de incendios forestales, dotados con fondos muy reducidos. Estos Reglamentos han permitido crear una base de datos europea sobre incendios forestales (EFFIS) y apoyar solo testimonialmente algunas acciones preventivas.

En 2003 se aprobó un nuevo Reglamento (Forest Focus 2003) con fondos también reducidos para cubrir la Red de seguimiento del estado de los bosques, la base de datos de incendios forestales y algunas medidas preventivas. Este Reglamento concluyó en 2006.

Es preciso señalar que no hay ninguna contribución comunitaria para las operaciones de extinción. En cambio, existe una larga solidaridad entre países vecinos mediante acuerdos bilaterales de ayuda mutua. En los últimos años, la disponibilidad de medios aéreos ha hecho más frecuentes dichas operaciones, lo que ha mostrado la necesidad de regularlas, actualizando acuerdos y tratando de establecer reglas homogéneas de coordinación, es decir un Sistema de Manejo de Emergencias (SME) regional. El Comité FAO/Silva Mediterránea está impulsando la elaboración de dichas reglas.

7. Perspectivas

Los problemas identificados y los factores que condicionan la situación no tienen base forestal. El Sector forestal simplemente los sufre y se manifiestan en él con el signo del fuego.

El desarrollo global para el Sector forestal tiene muchas ventajas, pero, a la vez, un gran inconveniente: la mayor frecuencia de incendios devastadores.

Europa cuenta con una potente infraestructura de extinción y una base de datos aceptable, pero que necesita mejoras importantes en algunos países. Asimismo hay un pequeño grupo de investigadores dedicado a los incendios forestales, aunque la repercusión de sus trabajos en los Servicios operativos es reducida.

La selvicultura preventiva es claramente deficitaria, como lo son los programas de educación ambiental, tanto los dirigidos a la población urbana como a la rural.

Los nuevos problemas en la interfaz urbano/forestal pueden influir para que la sociedad demande mayor atención a la prevención, con acciones efectivas y no solo declaraciones retóricas.

En ello puede influir también la saturación alcanzada con los medios de extinción y su coste, que continúa creciendo. Durante los años 90 los medios aéreos se desarrollaron aprovechando el bajo coste de las aeronaves restringidas de origen militar, tanto de América como de países del Este.

Las nuevas normativas sobre seguridad de aeronaves están obligando a introducir mejoras tecnológicas que favorecen tanto la seguridad como la eficacia, pero que originan costes suplementarios importantes. Ello limitará las posibilidades de ulterior expansión de las flotas de medios aéreos.

Las posibilidades más evidentes de mejorar el sistema sólo pueden encontrarse en una conjunción de acciones preventivas que reduzcan la frecuencia de incendios y limiten la intensidad de los fuegos mediante selvicultura que actúe sobre las acumulaciones de biomasa.

En estas condiciones la mejora de la calidad de los servicios de extinción, con personal bien equipado, bien entrenado y bien dirigido, que aplique técnicas específicas de combate del fuego forestal permitirá mantener o mejorar los resultados señalados.

Para esa mejora de los servicios es fundamental mantener un nivel alto de seguridad personal a lo que contribuirá un sistema generalizado de homologación y certificación de personal, que facilitará además las operaciones de ayuda multilateral entre países que, en el ambiente actual de globalización, es previsible que sean cada vez más frecuentes.

Conclusiones y recomendaciones

- 1.- La protección del medio ambiente en Europa, la Cuenca Mediterránea y el Cáucaso no puede ser efectiva sin una Estrategia Regional para el Manejo del Fuego diseñada de acuerdo con la distribución y la intensidad del peligro y desarrollada en cooperación con los interesados públicos y privados del Sector Forestal
- 2.- El abandono rural y el declive de la economía forestal en la Cuenca Mediterránea, junto con las perspectivas de cambio climático, pueden agravar las condiciones naturales que producen el riesgo de incendios.
- 3.- Se debe dar prioridad a la prevención de incendios originados como consecuencia de cambios socioeconómicos en zonas rurales, favoreciendo la participación de la población local en dicha prevención.

Asia y Australasia Manejo de Incendios Forestales: Una Perspectiva Regional¹

Gary Morgan²

Resumen

Hoy día, en la región, son pocas las comunidades en zonas propensas a incendios que consideran que están administrando con éxito sus bosques y la inherente amenaza de incendio que se asociada a ellos. Durante los últimos cuarenta años, los cambios en los enfoques filosóficos y organizativos de las zonas silvestres, el crecimiento de las poblaciones urbanas en el interior y, recientemente, la incertidumbre asociadas al calentamiento global plantean problemas considerables a los encargados de tomar decisiones. En la mayor parte de la región, el adecuar los regímenes de incendio es crucial para la supervivencia de la rica biodiversidad y, en efecto, de muchas maneras, para el propio carácter de muchos paisajes. En varias naciones asiáticas y en muchas islas del Pacífico, el uso del fuego en la reconversión forestal a gran escala y la falta de medidas adecuadas para prevenir la propagación en la vegetación protegida de los incendios relacionados al uso de tierras, han provocado problemas ecológicos y ambientales sin precedentes y, en algunos casos, crisis sanitarias relacionadas al humo. Esta ponencia examina brevemente:

- La historia reciente de los incendios forestales en la región tras un aparente aumento en la frecuencia de incendios devastadores;
- Los esfuerzos que se llevan a cabo en la región para afrontar mejor las implicaciones económicas de las políticas y de la planificación de los incendios; y
- Los acontecimientos políticos y el deseo, en algunos sectores, de querer simplificar demasiado la experiencia reciente con los incendios en la región.

La ponencia sugiere que existen oportunidades considerables para mejorar la eficiencia y efectividad de los enfoques actuales de manejo de incendios forestales en la región y que:

- Actualmente, partes de la región corren el riesgo de gastar sumas de dinero cada vez mayores en la extinción de incendios forestales, mientras se vuelven menos exitosos en el manejo de incendios en el paisaje;
- En muchas zonas es tiempo de redescubrir la relación entre el manejo forestal adecuado durante todo el año y los incendios forestales;
- En muchas zonas, existe la necesidad de desarrollar un enfoque más estratégico en

¹ Una versión abreviada de esta ponencia se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes; 29 de abril al 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Presidente del Bushfire Co-operative Research Centre. 340 Albert St., East Melbourne VIC 3002, Australia.

cuanto al manejo en la interfaz urbano-forestal y una mejor forma de compartir los riesgos y costos asociados al manejo de incendios en las zonas de interfaz;

- Con el surgimiento del calentamiento global, es cada vez más inútil, en muchas partes de la región, desarrollar políticas en zonas de conservación de agua y biodiversidad, de planificación urbana, fijación de carbono y la preservación de aspectos claves de la cultura indígena, sin antes analizar de manera crítica las consideraciones del manejo de incendios; y que
- La política de manejo de incendios y tierras tiene que estar sustentada por investigación de calidad.

Por último, se plantea que existe la necesidad de un diálogo internacional continuo para que los encargados de establecer políticas y la comunidad comprendan mejor los asuntos claves concernidos y de que existe la oportunidad para una mayor cooperación en relación con los incendios, tanto en la región como fuera de ella.

Palabras claves: Asia, Australasia, manejo de incendios, perspectiva regional.

Introducción

Internacionalmente, existe un consenso creciente de que las sociedades que tienden a ignorar el matorral („la naturaleza’) por mucho tiempo pagarán, en las zonas propensas a incendios, un precio recurrente en términos del trastorno social, los recursos perjudicados, la degradación ambiental y, a veces, la pérdida de vidas humanas.

Al revisar las tendencias internacionales en el manejo de incendios en el 2006, la ONG internacional *The Nature Conservancy* plantea que muchas veces “no existe una conexión entre los programas para la prevención de incendios, la reacción para la extinción de incendios, el uso del fuego, la conservación de la biodiversidad y las necesidades y aspiraciones de las personas que usan y se ven afectadas por el fuego” (Myers 2006).

Hoy día, se sabe que los seres humanos usaron el fuego por primera vez para manipular las sabanas africanas, hace varios millones de años. El uso atento y deliberado del fuego en otras partes del mundo durante el milenio también se entiende cada vez más. Los problemas actuales que se enfrentan en Asia y Australasia parecerían ser, en cierta medida, parte de una larga tradición de adaptación humana a las circunstancias cambiantes.

A través de la mayor parte de la región, el fuego plantea una paradoja – en muchos lugares los fuegos naturales son esenciales para mantener las dinámicas del ecosistema, la biodiversidad y la productividad–. El fuego se usa, también, como herramienta en el manejo de tierras. Sin embargo, cada año los incendios causan

pérdida de vidas, daños al ecosistema e impactos económicos y sociales adversos. También contribuyen cada vez más al calentamiento global. Los efectos secundarios del uso inadecuado del fuego pueden incluir los deslizamientos de tierra y lodo, y las inundaciones.

A pesar de estos impactos, la información fiable y actualizada con relación a aspectos claves del incendio y del manejo de incendios en la región oscila entre apenas adecuada e inexistente. A pesar de que la vigilancia internacional (a través del uso de la tecnología de satélites) está cada vez más en uso, en muchas partes de la región es imposible distinguir entre incendios no planificados e incendios para el manejo de tierras. Esta dificultad, sumada a las variaciones en la disponibilidad y naturaleza de los datos de base, las variaciones en la densidad poblacional y en los tipos de vegetación, dificultan las comparaciones dentro de la región. Sin esta información, el desarrollo de políticas públicas, de legislación y de planes de manejo de incendios adecuados se ve limitado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

No obstante, existe evidencia, en partes de la región, de un aumento en el número de incendios que afectan a zonas más amplias y que son más voraces. Además, un análisis de estas tendencias emergentes se complica aún más con el cambio climático, las presiones de la población y los cambios relacionados en el uso de las tierras, y con las restricciones institucionales al manejo de incendios y al manejo sostenible de los bosques.

Tomemos el ejemplo de Indonesia, donde durante las pasadas dos décadas el manejo de incendios se ha convertido en un asunto cada vez más importante, vinculado al desarrollo. El fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) ha causado una variabilidad climática considerable, lo cual ha provocado sequías severas e incendios desastrosos en el archipiélago. El aumento rápido de la población ha obligado al gobierno del país a reubicar a la gente de las islas superpobladas a las menos densamente pobladas, con las presiones subsiguientes de convertir el bosque tropical en paisaje agrícola. Esta conversión está invariablemente asociada a la falta general de pericia tradicional en el uso del fuego. Por último, el clima regional atrapa con regularidad el humo de los incendios relacionados al uso de las tierras y provoca problemas severos de *smog*.

La mayoría de los países propensos a incendios en la región invierten recursos significativos en la detección y extinción del fuego, tradicionalmente, utilizando personal de campo. Sin embargo, la detección a través del uso de satélites y tecnologías de teledetección relacionadas, así como el uso de aviones para la extinción de incendios, va en aumento. En algunas partes de la región, una tendencia incipiente concibe la política de respuesta a emergencias de incendios como una inversión creciente en las fuerzas y tecnologías de extinción, a expensas de las

actividades de prevención del fuego y del manejo de tierras continuo durante todo el año, estrategias que podrían evitar la emergencia en primer lugar.

En términos organizativos, los acuerdos institucionales para manejar los incendios varían considerablemente. En las naciones propensas a incendios, el servicio nacional de bomberos es quien normalmente protege a la gente y la propiedad en zonas urbanas, mientras que las agencias forestales y para la conservación de zonas asumen niveles variados de responsabilidad en áreas menos pobladas. En algunos lugares, el ejército también brinda apoyo cuando otros recursos son limitados.

La coordinación entre las distintas organizaciones responsables continúa siendo un reto en muchas jurisdicciones. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) hace referencia, en su *South Asia Assessment* (Evaluación del Sur de Asia) del 2006, a una “falta de sentido de responsabilidad (en el manejo de incendios) de ambos lados, el gobierno y la población local. Los parlamentos nacionales posponen lidiar con el difícil asunto del fuego tan pronto... el peligro se desvanece”.

A través de la región, los humanos causan una cantidad abrumadora de fuegos. Sin embargo, en zonas más remotas el porcentaje relativamente pequeño de incendios causados por relámpagos puede hacer que se quemen zonas significativas. En cambio, en zonas tales como el este de Rusia, donde se mantuvieron regímenes de extinción muy activos por muchas décadas, la acumulación de combustible ha provocado cambios en la composición de las especies y la estructura del ecosistema, y en el riesgo de fuegos.

Para resumir, la región es muy diversa en términos socioeconómicos, culturales y ambientales, y cada país enfrenta sus propios retos en relación al manejo de fuego en el paisaje. Cualquier intento de resumir la situación del manejo de incendios en una región tan vasta y diversa de la Tierra tiene que, por necesidad, depender del trabajo de muchos otros. Este es el caso de esta ponencia, y un sinnúmero de referencias claves se mencionarán más adelante. Sin embargo, voy a reconocer desde el principio, el valor, en la preparación de este resumen, del *Fire management – global assessment 2006* (Evaluación Global del Manejo de Incendios) de la FAO. Sin el trabajo de esta organización, y de aquellos que la apoyaron, este resumen regional hubiese sido mucho más limitado.

La situación actual - Asia

Extendiéndose hacia el este desde los Montes Urales y el Canal de Suez, y hacia el sur de las Montañas Caucásicas y de los mares Caspio y Negro, Asia limita al este con el Océano Pacífico, al sur con el Océano Índico y al norte con el Ártico. Este

continente constituye cerca de un tercio del área terrestre del planeta y contiene alrededor del 60% de la población mundial.

Como sería de esperar, ante esta gama de latitudes y relieves, la vegetación, los usos de las tierras y los regímenes de incendio varían enormemente a través de la región. Por ejemplo, en partes del noreste de Asia, el efecto de los fuegos en las zonas de permafrost, el cual puede provocar la degradación de los bosques debido al largo proceso de restauración, representa una preocupación creciente. Mientras tanto, el número creciente de incendios en los bosques boreales de Rusia se considera una amenaza considerable al ciclo global de carbono. (Algunos estiman que los bosques templados y boreales del noreste de Asia representan más del 2 por ciento de la biomasa global que se está quemando y de las emisiones de carbono). Mientras tanto, en el centro y sudeste de Asia, el impacto ambiental de los incendios en las capas orgánicas profundas tales como la torba, los cuales son difíciles o imposibles de controlar, así como el efecto continuo en la salud humana de las emisiones de humo de estos fuegos, representan problemas que van en aumento.

En décadas recientes, en muchas partes de Asia, el rol tradicional desempeñado por el fuego en las economías rurales ha cambiado dramáticamente. Los ciclos de cultivo migratorio, a consecuencia de las presiones provocadas por los cambios en el mercado y la creciente presión de la población, están experimentando un uso mayor de la agricultura “pionera” de corta y quema, sin los barbechos de la agricultura más tradicional. Estas técnicas también las practican, cada vez más, las poblaciones que se ven o atraídas por las zonas boscosas o forzadas a migrar a ellas (particularmente el bosque tropical). La quema también es esencial para mantener los pastos para el ganado que están reemplazando grandes áreas del bosque tropical.

Los constantes incendios relacionados al uso de tierras, que generan emisiones que afectan severamente el ambiente y la salud humana, representan un problema creciente en el sudeste de Asia desde finales de la década del 70. En 1999, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) aprobó una política de ‘cero quema’ que ha resultado ser, según la FAO, inefectiva. Ahora se indica que el rol que desempeña el fuego en el sustento de la gente que vive en zonas rurales es más fundamental de lo que se había pensado. Actualmente se desarrollan directrices modificadas para permitir la quema prescrita a los propietarios de pequeños terrenos, pero el uso del fuego por parte de los que practican el cultivo migratorio en las economías en desarrollo todavía representa un reto considerable.

En Asia central, la prevención de incendios en zonas contaminadas con radiación constituye un reto particular, pues alrededor de 6 millones de hectáreas de bosques resultaron contaminadas a consecuencia del accidente de la planta nuclear de Chernóbil en 1986. A pesar de estos esfuerzos en el manejo de incendios, se ha informado que cada año ocurren cientos de fuegos en estas zonas (que también

contienen turberas y antiguas zonas agrícolas) y se han registrado emisiones radioactivas tan lejos como Canadá.

Un problema similar existe en Kazajistán, donde se llevaron a cabo más de 450 pruebas nucleares en los 40 años antes del 1989, y donde hay áreas significativas de bosques de pinos propensos al fuego.

Algunos de los sistemas de manejo de incendios más avanzados de la región, que incluyen el uso de la tecnología de teledetección para detectar y vigilar los fuegos, se encuentran en China, el Japón, la República de Corea y Rusia. Corea del Sur está implementando un sistema en el terreno que utiliza cámaras automáticas para detectar incendios forestales. Una vez esté en completo funcionamiento, el sistema vigilará el 93 por ciento de la zona forestal de la nación (cerca de 6.4 millones de hectáreas).

Con relación a las actividades de extinción, gran parte de la región todavía depende, ante todo, del personal de campo, mientras que el uso de maquinaria pesada y aviones se va generalizando poco a poco. No obstante, se sabe que en China se utilizan tecnologías más sofisticadas. Por otro lado, en partes aisladas de Mongolia, continúan utilizándose las herramientas tradicionales y los caballos para el transporte en las actividades de extinción de incendios.

En parte como consecuencia de las experiencias en otros lugares del mundo, Rusia se está alejando de su política de extinción total de todos los incendios forestales. Este cambio de política pública se ha complicado debido a cambios organizativos relacionados, y por problemas técnicos y de recursos.

En partes de la región (por ejemplo, en algunas naciones del Sur de Asia) los ganaderos y los pastores continúan provocando incendios para estimular un nuevo crecimiento del pasto para sus rebaños. En Nepal, los recolectores de leña prefieren que el fuego mate los árboles jóvenes y luego que se sequen, a cortar la madera del árbol, porque ésta se quema lentamente y produce un rendimiento de calor más alto. De manera similar, algunos agricultores todavía acogen con agrado las primeras inundaciones repentinas luego de un monzón, desde los bosques quemados hacia sus tierras, porque estas transportan materia orgánica, fósforo, potasa y nitrógeno.

Un número creciente de naciones asiáticas propensas a incendios mantienen programas de concienciación y adiestramiento para las poblaciones locales como parte de sus programas de prevención de incendios. En Sri Lanka, los habitantes de los alrededores del bosque a menudo obtienen permiso para recolectar madera muerta gratis, y así ayudar a reducir la acumulación de combustible en el bosque. A cambio, se les pide ayudar a las autoridades en la extinción del incendio.

En varios países en la región, continúa la transición de una economía de planificación centralizada a una basada en el mercado. Muchas veces esta transición se asocia a movimientos para descentralizar sistemas de manejo forestal y de

incendios que antes estaban muy centralizados.

Durante las pasadas dos décadas, el sudeste asiático se ha destacado por incendios severos que han generado preocupación tanto en la región como a nivel mundial. La búsqueda de la subsistencia e ingresos (p. ej., el uso del fuego para propósitos agrícolas o de plantación) continúa siendo la razón principal para el uso del fuego. Han ocurrido repetidamente episodios importantes de bruma con humo generados por incendios forestales e incendios para el uso de tierras, siendo los impactos de agosto del 2000 y agosto del 2005 lo más notables.

En partes significativas de la región, y en particular en el sudeste asiático, los principales problemas asociados al uso inadecuado del fuego incluyen la pérdida de hábitats y biodiversidad en los bosques. Las turberas constituye uno de los biomas más amenazados como consecuencia de su conversión, por fuego, a plantaciones de cultivo comercial, especialmente para la producción de aceite de palma (el sudeste asiático contiene el 60 por ciento de las turberas tropicales del mundo, lo cual cubre 22 millones de hectáreas). La FAO indica que más de 2 millones de hectáreas de turberas han sido quemadas en los últimos diez años, lo que contribuye considerablemente a la densa capa de humo que antes mencionamos que cubre región.

El primer acuerdo ambiental regional de la ASEAN de carácter legal, el *Agreement on Transboundary Haze Pollution*, entró en vigor a finales de 2003. Sin embargo, hasta ahora, no todas las naciones miembros de la ASEAN han ratificado el acuerdo y hasta que no lo hagan, habrá dudas sobre su efectividad.

La situación actual - Australasia

Australasia, que se compone de Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y las islas vecinas en el Pacífico Sur, es geográficamente diversa, con paisajes que incluyen desde desiertos y semidesiertos en el interior de Australia a los exuberantes bosques tropicales de Nueva Guinea y algunas islas del Pacífico. Unos 30 millones de personas viven en esta parte de la región Asia/Australasia.

En un año promedio, los fuegos de matorrales queman alrededor de 29 millones de hectáreas en Australia. No obstante, con las fluctuaciones estacionales, la cifra puede ser 4 veces mayor o menor que este promedio. Por ejemplo, en 1974/75, se quemaron 115 millones de hectáreas -o el 15%- de Australia.

Alrededor del 90% del área total de Australia quemada por incendios cada año se encuentra al norte del Trópico de Capricornio, y estos incendios ocurren durante la „temporada seca“, generalmente entre abril y noviembre. La mayor parte del área quemada restante (alrededor de tres millones de hectáreas) se encuentra en la región templada y más densamente poblada de Australia, donde el alto peligro de incendios

ocurre entre diciembre y marzo.

Existen diferencias significativas entre los tipos de incendios que ocurren en el norte y el sur de Australia. Los incendios en el norte de Australia tienden a ocurrir en los bosques de la sabana y en las praderas de *triodia*. La cantidad de combustible en estos ambientes es, generalmente, limitada y las condiciones climatológicas en la temporada seca tienden a ser estables. En estas situaciones, la intensidad máxima del fuego raras veces sobrepasa los 20,000 kW/m. Durante los incendios de matorral en los bosques del sur de Australia, la intensidad máxima puede llegar a 100,000 kW/m.

El fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que se mencionó anteriormente, ha sido la causa de una sequía de 10 años de duración en la mayor parte del sur de Australia. Desde el 2000 el país ha experimentado temporadas de incendios que han sido tan dramáticas como cualquiera que se haya visto en los 200 años desde la colonización europea. Los impactos de estos fuegos han llevado a una serie de investigaciones y estudios sobre el manejo de incendios en Australia. Los hallazgos clave se resumen más adelante en esta ponencia.

Como ocurre en otras partes de la región, el área susceptible a incendios disminuyó un tanto durante las pasadas décadas; en el caso de Australia, como consecuencia de los cambios en los patrones de uso de tierras, las prácticas para la extinción de incendios, y como resultado del cese de las quemas tradicionales por parte de las poblaciones aborígenes. En años recientes, en el sur de Australia, las actitudes urbanas hacia el uso de la quema prescrita también han sido un factor en la disminución de su uso. Nueva Zelanda, que se enfrenta a un reto de manejo de incendios menos diverso, parece, de acuerdo con los datos disponibles, haber alcanzado un enfoque más balanceado de los elementos de „prevención, preparación, extinción y recuperación’.

En Papúa Nueva Guinea y en las islas del Pacífico Sur, la gama de asuntos relacionados al manejo de incendios refleja, con ciertas diferencias, los retos resumidos del sudeste de Asia.

El periodo entre el 1998 y el 2006 se ha destacado por un nivel de escrutinio sin precedentes al manejo de incendios de matorrales en Australia. A pesar de todos los informes y recomendaciones, ciertos asuntos fundamentales no se han atendido. Más de dos millones y medio de hectáreas, o más de un tercio de la tierra pública del estado de Victoria, ha sido quemada por incendios desde finales del 2002.

Políticamente, parece haber un reconocimiento creciente de que es posible que el aumento en los costos de extinción pueda, al menos en parte, estar vinculado a la tasa decreciente en el uso de la quema prescrita. De estas Investigaciones estatales y federales han surgido un sinnúmero de temas recurrentes. Entre ellos:

- *Financiamiento del manejo de parques y bosques.* A nivel nacional, durante los pasados 25 años, más de 11 millones de hectáreas de bosques públicos

de Australia han sido reservados como parques nacionales y reservas relacionadas, en parte en respuesta a preocupaciones urbanas en cuanto a la explotación maderera. Este cambio de estatus ha resultado, muchas veces, en una administración de tierras menos ‘activa’. La creación de nuevas ‘reservas’, por ejemplo, experimenta una reducción gradual en la red de rutas de acceso, mano de obra reducida y menos especializada, menos maquinaria disponible para la extinción y una disminución en los niveles de quema prescrita. En general, los gobiernos no han aumentado los presupuestos de las agencias encargadas de los parques en la misma proporción en que han aumentado la cantidad de tierras que se les requiere administrar, y con la partida de la mayoría de las industrias de la tierra en cuestión, los recursos de financiamiento alternos disponibles para los administradores de tierras, tales como el turismo, no logran compensar la disminución;

- *El uso de la quema prescrita.* El rol y uso de la quema prescrita en los parques y bosques del sur de Australia es, posiblemente, el asunto relacionado al manejo de incendios que con más frecuencia se debate, con un enfoque preventivo en el manejo de incendios que ha tendido a prevalecer en décadas recientes;
- *La extensión y valor de los recursos en la zona de interfaz urbana.* La pérdida más grande de recursos de construcción en la zona de interfaz urbana en años recientes ocurrió durante los fuegos de 2003, los cuales rodearon la capital de la nación. A pesar de las recomendaciones de varias Investigaciones para un mejor uso del *Australian Standard for the Construction of Buildings in Bushfire Prone Areas (Regulaciones australianas para la construcción en zonas propensas a incendios forestales)* en la zona de interfaz urbana, los gobiernos se muestran reacios a implementar estas medidas en edificios nuevos o ya existentes;
- *El nivel de pericia en el comportamiento del fuego y las condiciones climatológicas que influyen en el fuego, en las agencias concernidas.* Hubo anécdotas considerables y otros tipos de evidencia disponible durante las temporadas de incendios del 2002/2003 y 2006/2007 en el sudeste de Australia que confirmaban que las destrezas especializadas en el comportamiento y las condiciones meteorológicas del fuego se habían reducido entre los bomberos y los *Incident Management Teams* (Equipos de manejo de incidentes), al compararlas con los que existían en épocas anteriores. Esta escasez de destrezas podría estar retrasando los esfuerzos de extinción y podría estar contribuyendo al aumento de áreas quemadas por los incendios;

- *Seguridad del bombero, minimización de riesgos y el sistema legal.* Existen sospechas dentro de la comunidad del manejo de incendios y de tierras, de que el efecto acumulativo de los cambios actuales en la legislación de seguridad y salud ocupacional, y la creciente intervención del sistema legal en las tareas de extinción de incendios podrían haber desplazado el „balance’ del esfuerzo de supresión de un enfoque en la „seguridad’, a un enfoque en la „evasión de riesgos’. Con relación a los incendios de matorrales, donde el propósito es poner „bajo control’ una situación „fuera de control’ tan rápido y seguro como sea posible, este cambio significativo en el énfasis parece contribuir a que estos fuegos sean más grandes, quemen más tiempo, lo cual hace que cueste más extinguirlos y más personas estén en riesgo. Una actitud de „evasión de riesgos’ no es deseable ni le conviene a la comunidad.
- *El aumento en el uso de la tecnología.* Sin lugar a dudas, la tecnología, en muchas de sus formas, ha mejorado grandemente la eficiencia y efectividad del manejo de incendios de matorrales en Australia. Dado el aumento en los costos de la extinción de incendios, se requiere más rigor en la evaluación actual de la efectividad y eficiencia de las distintas tecnologías, particularmente los aviones (los costos por temporada de los aviones ahora exceden los 100 millones de dólares);
- *Cambio climático.* Con la mayor parte del sur de Australia en medio de una sequía de una década de duración, se destaca el papel de los déficits en la humedad subyacente en la naturaleza fluctuante de la experiencia australiana con los incendios de matorrales. La tentación política de usar estos dos factores (sequía y el inminente cambio climático) para evitar el escrutinio de la actual administración del manejo de las tierras públicas de Australia parece, en ocasiones, difícil de resistir.

En el 2003 el gobierno australiano acordó establecer el *Bushfire Cooperative Research Centre* (Centro cooperativo de investigaciones de incendios de matorrales) el cual se convirtió, en ese momento, en uno de los 56 centros de investigaciones que funcionan en Australia. La formación del *Bushfire CRC* era, y sigue siendo, una iniciativa importante de las agencias para el manejo de incendios y tierras en Australia y Nueva Zelanda (Los hallazgos actuales del *Bushfire CRC* expiran en 2010). Más allá de esta iniciativa nacional, el manejo de incendios en Australia continúa siendo responsabilidad de los gobiernos estatales y territoriales. Las agencias con base de voluntarios en la Australia rural continúan siendo esenciales para el esfuerzo general, y en el sur todavía ocurre un nivel generalmente alto de supresión efectiva.

Por último, y al igual que el resto de la región, Australia necesita desarrollar un

proceso de recolección de datos concertado y coherente en todos los aspectos del manejo de incendios.

Posibles Situaciones Futuras de Incendios Forestales y Posibles Enfoques

En su informe del 2006 *Fire management – global assessment* (Evaluación Global del Manejo de Incendios), la FAO de las Naciones Unidas sugiere que demasiadas veces “La prevención y extinción de incendios se ven obstaculizadas por líneas poco claras de responsabilidad institucional, así como por políticas y legislación contradictorias en algunos países.....No es posible exagerar la importancia de planes nacionales de manejo de incendios que cubran todos los aspectos (del manejo de incendios) y que reconcilien las consideraciones intersectoriales.”

Como ya se ha sugerido, y a pesar de la insuficiencia de los informes nacionales actuales de la región, en varios lugares ha surgido evidencia de cifras mayores de incendios más intensos que queman zonas más grandes. Continúa el trabajo acerca del impacto del calentamiento global en el panorama actual.

Los sistemas de evaluación del grado de peligro de incendio y los sistemas de aviso temprano se están utilizando cada vez más en la región para dar aviso anticipado de los períodos de alto riesgo de incendios. El *Specialized Meteorological Centre* (Centro Meteorológico Especializado) de la ASEAN y el *Southeast Asian Fire Danger Rating System* (Sistema de Evaluación del Grado de Peligro de Incendios para el Sudeste Asiático) han dado a conocer su información en Internet desde el 2000. Vietnam cuenta ahora con un sistema de evaluación del grado de peligro de incendio y se cree que Rusia está por implementar un sistema similar.

Se ha establecido un sistema de detección y vigilancia de rayos para identificar y localizar incendios causados por rayos en el Japón, Corea del Sur y en algunas zonas forestales en China y Rusia.

En cuanto al futuro del manejo de incendios basado en la comunidad, dos tendencias distintas parecen surgir en la región. En las economías en desarrollo (tales como China, India, Pakistán y Nepal), han surgido ‘comunidades de interés’ para ayudar con el esfuerzo del manejo de incendios, mientras que en las economías más desarrolladas, la participación comunitaria disminuye rápidamente.

La FAO informa que en el noreste de Asia, los países “han reconocido las presiones inmensas sobre los bosques en las zonas densamente pobladas, y también que los estilos autoritarios de manejo forestal centralizado son inapropiados e ineficientes para alcanzar los objetivos actuales más abarcadores del manejo forestal”. En la India, se promueve activamente la participación comunitaria a través de la creación de ‘comités de manejo forestal conjunto’ en una zona de más de 10

millones de hectáreas. Sin embargo, en otras partes de la India se ha considerado que los enfoques del gobierno reemplazan los sistemas tradicionales de manejo de incendios basados en la comunidad y, como resultado, han sido menos exitosos.

En años recientes, en el sudeste asiático ha habido un sinnúmero de iniciativas positivas. „basadas en la comunidad’ En el 2001, en Bangkok, se celebró el primer taller internacional sobre la participación comunitaria en el manejo de incendios.

La colaboración entre los países de la región varía considerablemente. Por ejemplo, existe poca colaboración en el sur de Asia, mientras que en Australasia ésta ha aumentado. China y Rusia tienen acuerdos de apoyo mutuo, al igual que Mongolia y China. La *Regional Northeast Asia Wildland Fire Network* (Red Regional contra Incendios Forestales del Noreste Asiático) se estableció en el 2004 con la ayuda de las Naciones Unidas. Esta red es coordinada por el Instituto Coreano de Investigaciones Forestales y actualmente provee una plataforma para la diseminación e intercambio de información relacionada con incendios.

En la Cumbre Internacional sobre Incendios Forestales celebrada en el 2003 en Australia, se presentó un acuerdo internacional para el intercambio de personal de manejo de incendios entre Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, que ha estado en vigor desde el 2000. El acuerdo fue considerado como un posible modelo para otros acuerdos internacionales en el futuro.

Recientemente, los países miembros de la ASEAN han adoptado una *Peatland Management Initiative* (Iniciativa para el Manejo de Turberas) para mejorar el manejo de turberas en la región. Una estrategia relacionada se ha desarrollado para guiar las acciones en el manejo sostenible de las turberas y reducir los fuegos y la bruma asociada dentro del marco del *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Acuerdo sobre la Contaminación de Transfronteriza de la Bruma). También se ha establecido una comisión de expertos para llevar a cabo una evaluación rápida de la situación real durante los potenciales o inminentes períodos cruciales de incendios y bruma.

En términos de las respuestas institucionales contra el fuego, existen múltiples razones para el optimismo. Varias naciones en la región han adoptado versiones nacionales y/o locales del Programa 21 de las Naciones Unidas (que se relaciona con los impactos humanos sobre el medio ambiente), y se ha alcanzado progreso en materia ambiental en la mayoría de los países, según el informe de la FAO de 2006.

La situación legislativa tiende a ser más problemática. Incluso en los países que tienen leyes bien definidas, su aplicación puede ser bastante débil.

Factores financieros y humanos

Los problemas asociados con la calidad de los datos disponibles a través de la región,

que ya se han mencionado, se agravan considerablemente cuando se trata de extraer tendencias en las áreas de recursos humanos y financieros. Ante la ausencia de estándares acordados para la recolección de datos sobre asuntos como los daños causados por el fuego, cualquier resumen en esta área puede, como mucho, limitarse a comentar sobre la escasa información disponible.

El informe de la FAO del 2006 contiene información sobre los pocos países y regiones que han proporcionado información sobre los daños causados por incendios; por ejemplo, 107 millones de dólares en la India en un año, o 4,200 millones de dólares en Rusia en el 1998. Las naciones del noreste asiático registraron pérdidas de madera a causa de los incendios forestales entre 0.5 y 1,000 millones de dólares anualmente. Mongolia informó que entre los años 2000-2004 se quemaron 5.1 millones de hectáreas de bosques y 9 millones hectáreas vegetación de estepa, lo cual causó un estimado de 8.5 millones de dólares en daños ambientales, 150,000 dólares en daños a la infraestructura y 600,000 en costos de extinción.

China estima que entre el 1959 y el 1998 cerca de 100 personas han muerto apagando incendios, mientras que 500 han resultado heridas. En 1998 y 2003 en Rusia también hubo pérdidas humanas significativas, mientras que en abril del 2000, en Corea del Sur se registraron pérdidas de propiedades por valor de 83 millones de dólares y efectos severos asociados sobre los bosques.

La FAO ha expresado sus dudas en cuanto a la exactitud de la ya limitada divulgación de las pérdidas de propiedades. Como ejemplo, ésta tomó los incendios en el Lejano Oriente ruso en 1998 que quemaron cerca de 2.2 millones de hectáreas de bosques. Rusia, para esa época, informó pérdidas económicas de alrededor de 200 millones de dólares. No obstante, un cálculo posterior utilizando los precios del mercado mundial sugirió que las pérdidas reales probablemente estaban cerca de los 4,200 millones de dólares.

Cuando se trata de prevención y extinción, la mayoría de las naciones en la región aún dependen de la detección temprana a través del uso de las torres de vigilancia, y el uso de vigilancia aérea y satélites.

En su informe del 2006 la FAO indicó que varias naciones del sudeste y noreste asiático informaron que aunque hay disponibles recursos para la extinción de incendios, muchas veces son insuficientes. Por ejemplo, Tailandia tiene una capacidad de extinción de incendios organizada nacionalmente, pero reconoció en el 2000 que solo puede ofrecer cobertura al 20-30 por ciento de sus bosques.

Varias naciones del sudeste asiático informaron que el uso de helicópteros está aumentando, especialmente en las operaciones de ‘ataque inicial’. El uso de equipo más sofisticado y tecnología avanzada por parte de más naciones industrializadas, tiene implicaciones en los costos relacionados a la supresión. En la temporada de incendios del 2002-2003 Australia informó que gastó más de 80 millones de dólares

en apoyo aéreo a las operaciones de extinción de incendios y que esta actividad se había convertido en un componente significativo de los costos totales de la extinción de incendios. En la temporada de incendios del 2006-2007, un estado del sudeste de Australia (Victoria) gastó más de 250 millones de dólares en la extinción de incendios forestales.

En Australia, de manera más general, es posible extraer indicaciones de los costos globales de la lucha contra incendios utilizando los informes anuales de los organismos y fuentes relacionadas. Un análisis de este tipo deja a uno con la fuerte impresión de que ha habido una tendencia a aumentar los presupuestos de los organismos para la protección contra incendios, y quizás una reducción en los presupuestos para la administración de tierras, incluida la prevención de incendios.

A nivel institucional, a través de la región, aquellos países como Australia (donde el manejo de incendios es, en gran parte, responsabilidad de los estados y provincias), tienden a tener acuerdos transfronterizos para el manejo de emergencias. Invariablemente, en múltiples situaciones de incendios forestales existen espacios críticos entre la disponibilidad de recursos humanos equipados y adiestrados de forma adecuada, particularmente para las funciones más especializadas.

Satisfactoriamente, la FAO señala que, en gran parte de la región, la investigación y el estudio de los bosques se ve cada vez más como un prerrequisito para un manejo efectivo de los recursos naturales.

El rol de las ONG, en gran parte de la región, particularmente en la implantación de proyectos de desarrollo bilaterales y multilaterales así como en facilitar el diálogo y el intercambio, continúa siendo importante. Japón es uno de los principales países donantes que contribuyen de manera substancial a los proyectos de silvicultura en Asia y el Pacífico.

Por último, durante la pasada década y media ha habido varios intentos en Australia de cuantificar los beneficios económicos que surgen de la inversión en el manejo de incendios en el paisaje. El primero de estos esfuerzos, de parte de una firma de consultores sobre el manejo actuarial y de riesgos, concluyó en el 1992 que se pueden lograr ahorros considerables minimizando el tamaño de los incendios más grandes en cada región estudiada, que ocurrieron en un año dado. Los consultores concluyeron que “el 50% de los daños de los incendios de matorrales fueron causados únicamente por el incendio más grande de cada región”.

En el 1997, los economistas empleados por el gobierno del estado de Victoria (Bennetton et ál.) concluyeron que “el Programa para el Manejo de Incendios (FMP, por sus siglas en inglés) le producía al estado de Victoria una razón costo-beneficio alta (22 a una) por sus inversiones en la prevención y extinción de incendios a través de una reducción en los recursos agrícolas, capitales y forestales, los cuales, de otra manera, se hubiesen perdido al ocurrir el incendio. Además, este beneficio

probablemente subestima el valor real del FMP, ya que las pérdidas causadas por los daños sobre la flora y la fauna, la infraestructura pública, el turismo y la recreación, la calidad y cantidad del agua, y la vida humana no han sido clasificadas.”

Con relación a asuntos específicos, los incendios de matorrales en 2006 y 2007 causaron una interrupción considerable en el sistema de electricidad, más de 8.5 horas, en la segunda ciudad más grande de Australia. Se estima que los impactos directos e indirectos de esta interrupción costaron 500 millones de dólares australianos. Además, 70,000 comercios se vieron afectados, algunos hasta por una semana.

Recientemente, el trabajo llevado a cabo por el profesor John Handmer para el *Bushfire Cooperative Research Centre* (Centro Cooperativo de Investigaciones sobre Incendios de Matorrales) ha identificado una razón costo-beneficio de 9.75 a una tasa de descuento de 5%, en términos de los beneficios económicos nacionales de los programas de investigaciones de asuntos relacionados a incendios de los CRC. La tasa es considerada conservadora en el sentido de que excluye los beneficios que la administración de tierras obtiene de un mejor manejo del fuego.

Limitaciones Existentes

Al intentar desarrollar una visión general de una zona tan grande de la Tierra, las limitaciones en la disponibilidad actual y fiabilidad de la información disponible deben, una vez más, destacarse. Más allá de los problemas asociados a los datos “en bruto” disponibles actualmente, (el número de incendios, zonas quemadas, etc.), son pocos los países que proveen mucha, si alguna, información sobre los costos ambientales, sociales y económicos de los incendios forestales. Este problema de ‘datos/análisis’ es, probablemente, la mayor limitación existente en el desarrollo de una perspectiva regional o internacional en el manejo de incendios. En cuanto al alcance de los incendios, por ejemplo, la creciente sofisticación de los análisis por satélite “proporciona información mucho más fiable (a menudo varias veces más) que los análisis basados en la tierra”, según la FAO.

Entre las limitaciones específicas actuales dentro de la región están:

- La complejidad de los asuntos asociados muchas veces al manejo de incendios (y al humo) y la necesidad de conocimiento y adiestramiento fundamentales en ecología y manejo del fuego;
- Los recursos tecnológicos y de infraestructura asociados, muchas veces limitados;
- El movimiento de poblaciones desde las zonas rurales hacia las ciudades, lo que equivale a menos personas para lidiar con los incendios rurales descontrolados;

- La tendencia de los que viven en las zonas urbanas a considerar todos los incendios en el paisaje como nocivos, lo que provoca presión política para limitar el uso de la quema prescrita;
- El movimiento, por razones de estilos de vida, de personas que viven en zonas urbanas a zonas de alto riesgo de incendios;
- Los problemas, en muchos países, con la aplicación y administración de las disposiciones legales y de programas existentes para la prevención de incendios;
- El problema de lidiar con los incendios intencionales. Por ejemplo, en Australia en el 2002/03, 10,000 fuegos fueron clasificados como “intencionales o posiblemente intencionales”, mientras que solo hubo 43 condenas;
- En algunos países, el vínculo entre la explotación maderera ilegal y los incendios forestales (por ejemplo, los incendios intencionales facilitan la obtención de permisos para los cortes de recuperación); y
- La falta general de evaluación de los impactos ecológicos y ambientales de los incendios forestales, lo cual es esencial para explicar los cambios en las prácticas del manejo de tierras y apoyar el desarrollo de políticas públicas, y ayudar a dar prioridad a los esfuerzos de recuperación luego del incendio.

Conclusiones

En muchas partes de la región, los humanos han utilizado el fuego durante varios miles de años para cultivar y conservar los bosques, montes y praderas, y los ecosistemas han evolucionado correspondientemente. Sin embargo, en años recientes, el fuego se ha convertido en un agente destructivo en la respuesta humana a las presiones económicas y poblacionales. Las presiones de la población humana son especialmente graves en las partes tropicales y subtropicales de la región, y el fuego se utiliza, cada vez más, de formas que contribuyen a la conversión del bosque a la agricultura o que alteran dramáticamente los regímenes previos de incendios, lo cual muchas veces tiene consecuencias graves en la vegetación y el ambiente.

En cuanto al futuro, y ante el cambio climático acelerado, se recomienda que la comunidad internacional para la lucha contra incendios forestales continúe, y con prioridad, centrándose en ayudar a las naciones y regiones, entre otras cosas a:

- Reconocer las funciones positivas y negativas que puede desempeñar el fuego en el paisaje, y la necesidad de un enfoque integral al manejo de incendios, contrario al enfoque en la supresión;
- Asegurarse de que la prevención y extinción de incendios, y las responsabilidades de la administración de tierras, estén claras; que las

agencias concernidas estén respaldadas por políticas públicas y legislación adecuadas; que las agencias tengan los recursos apropiados; y que estén en vigor mecanismos adecuados de apoyo regional y, cuando sea pertinente, de apoyo internacional.

- Un mejor enfoque al análisis de los impactos económicos y sociales de los incendios forestales;
- Reconocer mejor el papel de los acercamientos basados en la comunidad como elementos adaptativos y sostenibles en un enfoque integral del manejo de incendios;
- Hacer un mejor uso de las redes regionales existentes, y en particular de aquellas organizadas a través de la Red Mundial de Incendios Forestales de la EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres) de las Naciones Unidas, y fomentar el apoyo y uso de las Directrices Voluntarias para el Manejo de Incendios de la FAO;
- Desarrollar e implementar evaluaciones fiables y regulares de la extensión e impacto de los incendios de vegetación, lo que implica una terminología y unas definiciones armonizadas, estándares y procedimientos aceptados a nivel internacional y el desarrollo de bases de datos regionales; y
- Continuar enfocándose en la importancia del adiestramiento y la investigación en todos los aspectos del manejo de incendios.

Referencias

- Council of Australian Governments (2004). Report of the National Inquiry on Bushfire Mitigation and Management. Australian Government. Canberra. 415 pp.
- Benetton, J., Cashin, P., Jones, D. and Soligo, J. (1997). An Economic Evaluation of Bushfire Prevention and Suppression in Victoria. Working Paper 9703. Economics Branch. Department of Natural Resources and Environment, Victoria. 53 pp.
- FAO (2007). Fire management – global assessment 2006. A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005. Food and Agricultural Organisation of the United Nations. Rome. 156 pp.
- Goldammer, J.G. (1997). Overview of Fire and Smoke Management Issues and Options in Tropical Vegetation. In: Transboundary Pollution in the Sustainability of Tropical Forests; Toward Wise Forest Fire Management. Proceedings of the AIFM International Conference. ASEAN Institute of Forest Management. Ampang Press, Kuala Lumpur. 437 pp.
- ITTO (2001). Fire alarm – More action is needed to address the causes and effects of tropical forest fires. The International Tropical Timber Organization. Yokohama, Japan. 8 pp.
- MIRA (1992). Fire Protection Risk Management Study for the Department of Conservation and Natural Resources. MIRA Consulting Ltd. Actuarial and Risk management Consultants. 60 pp.
- Myers, R. L. (2006). Living with Fire – Sustaining Ecosystems & Livelihoods Through Integrated Fire Management. The Nature Conservancy. 30 pp.
- Pyne, S. (2006). The Still-Burning Bush. Scribe Short Books, Melbourne, Australia. 137 pp.
- The Brookings Institution (2005). The Mega-Fire Phenomenon: Toward a More Effective Management Model. Concept Paper. Presented to the U.S. National Fire and Aviation Board, 20th September, 2005. The Brookings Institution Centre for Public Policy Education, Washington, D.C. 15 pp.

Aproximaciones Sobre la Protección Contra Incendios Forestales en Centro y Sur América¹

Guillermo Julio Alvear²

Resumen

No existen dudas que la Región se encuentra afectada de manera permanente por los incendios forestales, con importantes perjuicios en los planos económico, social y ambiental. Los daños que se provocan, no obstante los esfuerzos que se han aplicado en los últimos años, continúan siendo graves, lo que lleva a la necesidad de analizar con profundidad sobre de la naturaleza del problema, las restricciones presentes en la implementación de medidas de prevención y combate, y también, en relación a las formas como los diferentes países están abordando el tema de la protección.

En primer lugar, llama la atención la precaria información que existe en la mayoría de los países respecto a la cuantía de las pérdidas que se generan con la ocurrencia y propagación del fuego, lo que indudablemente representa una importante limitación para la elaboración de planes que conduzcan a una efectiva mitigación. Por otra parte, una importante proporción de los Gobiernos Nacionales han impulsado la formulación de leyes proteccionistas y han establecido mejores esquemas institucionales para canalizar las acciones de control de los incendios forestales, pero estas iniciativas al parecer no logran ser bien implementadas para lograr el propósito perseguido. Además, se observa un insuficiente avance en la capacitación de personal especializado y, también, un precario desarrollo de una investigación en la materia que facilite y sustente el diseño de esquemas tecnológicos y operacionales ajustados adecuadamente a las realidades y condiciones propias de los países.

Los aspectos antes mencionados se revisan en la presente ponencia, con el fin de fundamentar algunos planteamientos políticos y estratégicos que conduzcan a mejorar los sistemas de protección en los países de Centro y Sudamérica.

Referencias iniciales

Permanentemente Latinoamérica está bajo la amenaza de los incendios forestales, los que provocados por el hombre o agentes naturales afectan con frecuencia a extensas superficies de vegetación, destruyendo a su paso centros poblados, provocando en muchos casos la de pérdida de vidas humanas. En los recientes días de septiembre del presente año 2007 los medios de comunicación informaban que el fuego estaba arrasando, en sólo unos pocos días, a más de dos millones de hectáreas en Bolivia y en otro medio millón en Paraguay.

Los incendios forestales pueden destruir hasta un 50 % de la biomasa del bosque, con efectos graves pero poco comprendido sobre la fauna residente.

¹ Una versión abreviada de este Trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de Incendios Forestales, 29 abril - 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Catedrático, Universidad de Chile, La Pintana, Santiago, Chile; Email: gjulio@uchile.cl.

Además, los fuegos superficiales pueden liberar cantidades importantes de anhídrido carbónico al ambiente con impactos importantes en el estado atmosférico global, influyendo de manera significativa en el cambio climático.

Por otra parte, el efecto de los incendios forestales en la salud puede ser muy graves, especialmente en la generación de problemas respiratorios, como se comprueba en algunos ejemplos recientes, como en 1997, cuando el humo proveniente de incendios desde Guatemala, Honduras y México cubrió gran parte del sur de los Estados Unidos, obligando al Gobierno de Texas a emitir advertencias sanitarias a los habitantes. También, el humo producido en Bolivia en 1999 provocó una elevada contaminación del aire en el Estado de Acre, en Brasil, con un incremento substancial de casos de atención médica por problemas respiratorios en Río Branco. Cabe mencionar, además, contaminaciones atmosféricas en Paraguay por humos que se desplazaron desde el Mato Grosso.

La combinación de la tala de árboles con períodos cada vez más frecuentes de sequía severa, tanto de zonas tropicales como templadas, incluso en formaciones vírgenes húmedas, conduce a estados críticos en cuanto a la susceptibilidad a la ignición y, por lo general, dada la alta biomasa existente, los incendios se propagan observando un comportamiento extremadamente crítico.

Los antecedentes antes descritos revelan la enorme magnitud del problema, por la grave destrucción de recursos naturales renovables y sus impactos en la economía, en el desarrollo social y en el medio ambiente mismo. Ello ha sido corroborado en las conclusiones de las diversas reuniones celebradas bajo la organización de la FAO sobre programas forestales en Latinoamérica, en las que reiteradamente se denuncia que los incendios y las quemaduras constituyen causas de la mayor incidencia en la deforestación y la destrucción de bosques.

A pesar que día a día se observa una mayor preocupación por la ocurrencia y daños generados por los incendios, en general no se aprecia realmente un cambio significativo en las políticas nacionales ni en las actitudes de las poblaciones respecto al problema y, consecuentemente, los impactos generados tampoco disminuyen. Incluso, debido al cambio climático que se está apreciando en todo el mundo, ahora están ocurriendo con una mayor frecuencia temporadas catastróficas, por los elevados niveles de daños y efectos de la propagación del fuego.

Los incendios forestales, al igual que otras regiones en el mundo, se presentan en Latinoamérica de una manera muy variable entre un país y otro, por las naturales diferencias existentes en las condiciones climáticas, vegetacionales, orográficas, uso de la tierra, niveles culturales y comportamiento de las poblaciones humanas existentes. Ello lleva a que la ocurrencia y la propagación del fuego difieran en forma notable. Incluso, al analizar cada país por separado, internamente se pueden

observar diferencias geográficas significativas en cuanto a la magnitud y características del problema y, también entre una temporada y otra.

Por otra parte, la forma y la efectividad con que se aborda el control de los incendios forestales presentan también grandes variaciones entre los países. En primer lugar, las capacidades económicas que se poseen ya establecen una diferencia en la implementación de los programas de manejo del fuego, en el nivel de conocimiento sobre el problema y en la creación y aplicación de tecnologías y esquemas organizativos eficientes. También influye la concepción y la prioridad que se otorgan en las políticas nacionales respecto al valor de los recursos forestales y la necesidad de protegerlos. Además, las tradiciones en el uso de la tierra, que en muchos casos se expresan en rasgos atávicos difíciles de superar, plantean situaciones, a veces incomprensibles, que restringen seriamente a las naciones más pobres a aplicar acciones que se ejecutan normal y rutinariamente en otros países.

La información sobre incendios forestales

En general, se evidencia en Centro y Sur América una clara deficiencia de registros sobre la ocurrencia de incendios forestales y los daños que provoca la propagación del fuego. Se constata que solamente en la minoría de los países funcionan sistemas estadísticos nacionales que contienen información completa y confiable. En algunos casos existen antecedentes nacionales parciales, de fuentes diversas, las que no siempre coinciden. Por otra parte, en prácticamente en dos tercios de los países no existe información al respecto, o bien, es apreciada de una manera subjetiva.

Un esfuerzo realizado para la recopilación de antecedentes, basados en informes oficiales, diversas publicaciones y, también a través de medios informales, ha permitido reunir información estimativa sobre la ocurrencia de incendios forestales en los países latinoamericanos, la se expone en el Cuadro 1

Cuadro 1-- Estadísticas Estimativas de Incendios Forestales en Centro y Sur América.

País	Período	Ocurrencia (N° incendios/año)	Superf. Quemada (ha/año)
Argentina	1990-1999	11.513	1.028.739
Belice S/I		S/I	S/I
Bolivia 1999		31.245	12.749.475
Brasil 1990-	2000	160.000	1.500.000
Colombia 1996-	2002	4.137	46.080
Costa Rica	1998-2004	1.511	55.928
Chile 1981-	2002	5.251	53.395
Ecuador S/I		S/I	S/I
El Salvador	1998	5.500	87.992
Guatemala 1998-	2003	652	205.781
Guyana S/I		S/I	S/I
Honduras 1998-	2003	4.564	69.609
Nicaragua	1998-2004	5.652	55.776
Panamá 1998-	2003	S/I	18.140
Paraguay S/I		S/I	S/I
Perú S/I		S/I	S/I
Surinam S/I		S/I	S/I
Uruguay	1990-94	2.353	3.311
Venezuela	1987-99	1.394	8.230
Total Registrado		223.772	15.882.456
Total Real Estimado		320.000	22.500.000

Adicionalmente a lo señalado en el Cuadro 1, se estima que el tamaño medio de los incendios forestales en la Región es de 70,3 hectáreas, y que la proporción de terrenos afectados por el fuego sobre la superficie total alcanza al 1,24 % (Julio, 2007).

La información sobre el origen de los incendios forestales es aún más precaria que la relativa a la ocurrencia y superficies afectadas recién expuestas. En el Cuadro 2, referido a la causalidad, sólo fue posible obtener antecedentes de seis de los 19 países de la Región. Lamentablemente los criterios de tipificación de las causas no coinciden, y en algunos casos, agentes de riesgo importantes, como las quemas, aparecen calificadas bajo otros conceptos (negligencias, actividades agropecuarias).

Aunque no existen las estadísticas oficiales que lo respalden claramente, no cabe dudas que el uso del fuego, como herramienta de trabajo en la habilitación de terrenos para la agricultura y ganadería, constituye claramente en Latinoamérica el

factor de mayor importancia en el origen de los incendios forestales y en la devastación de bosques.

Cuadro 2--Distribución Porcentual de la Causalidad Actual Estimada de Incendios Forestales en seis Países.

CAUSA Arg	entina	Brasil	Chile	Guatemala	Honduras	Nicaragua
Operaciones Rurales	-	3	4	-	-	40
Quemas -		32	10	36	22	32
Recreación y Fogatas	-	5	4	-	4	13
Fumadores -		10	-	-	-	-
Juegos de Niños	-	-	8	-	-	-
Ferrocarriles -		1	2	-	-	-
Tránsito de Peatones	-	-	32	-	-	-
Fenómenos Naturales	11	1	0,3	-	-	-
Intencionales 17		41	37	23	56	5
Negligencias y otras	49	7	3	12	18	10
Desconocidas 23		-	-	29	-	-

Las quemas se han estado aplicando desde tiempos remotos sin observar las prescripciones ni las técnicas apropiadas para asegurar un resultado positivo o beneficioso. Por el contrario, no sólo se provocan incendios incontrolables por el escape del fuego, destruyendo vegetación y otros bienes valiosos, sino que también se constata una continua degradación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, que se expresa en la pérdida de la fertilidad de los suelos, la generación de procesos erosivos, el deterioro de los recursos hídricos, la contaminación de suelos, aguas y aire y, en general, diversos problemas que afectan a la vida silvestre y a la calidad del entorno de la población humana.

El problema de las quemas es complejo, porque en una importante medida inciden factores que exceden a las posibilidades que realmente poseen los agricultores de utilizar el fuego racionalmente. Por lo general, los mayores daños se presentan en zonas socioeconómicas deprimidas, en donde la población rural está representada por pequeños propietarios, minifundistas, comuneros o indígenas, marginados del desarrollo y ajenos al avance del conocimiento y de la tecnología, pero con la imperiosa necesidad de sobrevivir, siendo entonces el fuego la única posibilidad que poseen para continuar con su tradicional uso de la tierra.

También está presente un problema cultural, especialmente en las grandes propiedades o estancias, dedicadas a la ganadería extensiva, en donde la quema permanentemente se ha utilizado para mejorar las empastadas, por su fácil aplicación y bajo costo, y porque no importa realmente que se propague por grandes extensiones y, menos aún se tienen presentes los daños ambientales que el fuego puede provocar.

Por otra parte, de acuerdo a diversos informes y antecedentes se comprueba un notable incremento de la intencionalidad o premeditación en el inicio de los incendios forestales, la que se genera por diversas razones, pero esencialmente como una respuesta a la presencia de mayores niveles de riesgo derivadas por el aumento significativo de actitudes indeseables de la población urbana y rural. Concretamente, la piromanía en los alrededores de las grandes urbes, está surgiendo como una enfermedad mental producto del desarrollo o de la civilización, al igual que la tasa de suicidios y los índices de drogadicción y alcoholismo.

La institucionalidad para el control de incendios forestales

Ya se mencionó que los países de Centro y Sur América presentan diferencias importantes en una amplia gama de aspectos, relativos al clima, la topografía, los recursos renovables y, en general, a los ambientes naturales y ecosistemas que prevalecen. También se evidencia una elevada heterogeneidad en cuanto al desarrollo económico, social y cultural. Ello establece, como es natural, que los problemas que generan la ocurrencia y regulan la propagación de los incendios forestales sean igualmente diferentes, como así mismo, las capacidades existentes, los criterios y las modalidades aplicadas para llevar a efecto la prevención y combate del fuego.

Según *Fire Management-Global Assessment 2006* (FAO, 2007), en Centro América una amplia variedad de instituciones están involucradas con el manejo del fuego. Las principales agencias gubernamentales poseen responsabilidades conjuntas para la agricultura, ganadería y actividades forestales. Adicionalmente, otras agencias relacionadas con el medio ambiente y la protección de áreas silvestres también poseen responsabilidades en la materia. Otras organizaciones relacionadas corresponden a las que cumplen funciones en meteorología, turismo, salud, infraestructura, desarrollo, legislación, emergencias nacionales, defensa y bomberos.

La misma publicación, al referirse al caso de Sudamérica, señala que en la mayoría de los países la política sobre recursos naturales está orientada hacia la agricultura, la minería y sectores de transportes, porque la contribución del sector forestal en las economías nacionales es muy baja, con la excepción de Brasil, Bolivia y Chile. En Colombia y Ecuador prácticamente no existe una administración pública para la actividad forestal.

La agenda política para los incendios forestales es principalmente una reacción después de la ocurrencia de eventos catastróficos, o bien está conectada a intereses de la política partidaria contingente. En general, el tema no es parte de los procesos de desarrollo, como tampoco una línea de necesidades nacionales. Se evidencian inestabilidades al respecto debido a los cambios de gobiernos y por los problemas de

corrupción, que conduce a la transformación de los terrenos forestales a usos diferentes (FAO, 2007).

Respecto a la normativa vigente en la materia, *Fire Management-Global Assessment 2006* (FAO, 2007) expresa que los Gobiernos de la Región emplean diferentes herramientas legales para el control de incendios y el uso del fuego prescrito. No existe una integración de normas que permita calificar como especializada la legislación sobre incendios forestales, porque corresponde leyes promulgadas por diferentes instituciones en cada país. Existen al menos unas 153 leyes nacionales en Sudamérica, pero sólo 57 de ellas son específicas para el control de incendios y uso del fuego en zonas rurales, correspondiendo las restantes a derivaciones de leyes que tratan el problema forestal o ambiental en términos generales. Sin embargo, en la mayoría de los países se observa una clara debilidad en la aplicación de la legislación vigente en la materia. Esto, por diversas razones: Los textos legales están incompletos son o insuficientes; no se han elaborado los reglamentos que permitan la aplicación de las normas; no se asignan presupuestos para permitir la supervisión del cumplimiento de las leyes.

Aunque en la mayoría de estos países ya se ha adquirido una real conciencia sobre la gravedad de los daños y efectos de los incendios forestales, se aprecia que no existe una suficiente claridad sobre cómo debe abordarse el control de este problema, lo que en alguna medida deriva del hecho de no haberse asumido la necesaria decisión política para impulsar una efectiva protección forestal.

En relación a las apreciaciones recién expuestas, cabe exponer cuatro comentarios planteados por Julio en la IV Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, celebrada en Sevilla en el año 2007

- a) La total responsabilidad de la protección forestal recae, en la mayoría de los casos, en agencias gubernamentales. Sin embargo, el sector forestal no está claramente identificado o posee una baja jerarquía dentro de los esquemas organizativos públicos. Por lo general, a la actividad forestal se le considera como una suerte de extensión de la agricultura y la ganadería, lo que limita fuertemente el tratamiento del sector en lo que respecta su análisis y evaluación con la profundidad requerida y, por lo tanto, dificulta la formulación de propuestas de desarrollo debidamente sustentadas.
- b) En la práctica, frente a la contingencia de los incendios forestales, que provocan elevados daños y alarma pública, los Gobiernos recurran a diversas organizaciones que poseen alguna capacidad para contrarrestar los focos que se producen, tales como compañías de bomberos, cuerpos militares y de la policía, entre otros. Estas organizaciones normalmente no poseen la especialización ni el equipamiento adecuado para el combate, de manera que el resultado de su acción

con frecuencia no es eficiente. La experiencia de los países desarrollados indica que la única forma efectiva de combatir los incendios es sobre la base de organizaciones profesionales dedicadas exclusiva o preferentemente a esta tarea.

- c) Cabe destacar que el tema de la protección es mucho más que el del combate, porque engloba una diversidad de acciones que deben ejecutarse simultánea y coordinadamente. Aspectos tales como la prevención, la detección de incendios y la organización misma de los medios para la supresión, deben realizarse sobre la base de un mismo esquema de planificación y programación, si es que se pretende lograr una gestión exitosa. La situación es que, cuando estas actividades distintas a la liquidación de incendios se efectúan, normalmente están asignadas a organizaciones diferentes, las que las asumen con distintos criterios y grados de preparación y, frecuentemente, compitiendo entre ellas en vez de reforzar un accionar cooperativo y sinérgico.
- d) Finalmente, es necesario reiterar el punto de la precariedad de registros confiables sobre incendios forestales en la Región. Ello, en parte ocurre debido a que no está identificada con claridad en qué organización recae la principal responsabilidad sobre la protección forestal, lo que limita seriamente la capacidad de análisis del problema, e impide la correcta planificación de la prevención y el combate. No es posible formular políticas acertadas en la materia ni definir las estrategias correspondientes, si no se posee un conocimiento apropiado de la gravedad y características de los daños y efectos que se están produciendo, como tampoco de los medios y condiciones existentes para diseñar e implementar las medidas de control.

Comentarios finales

Está claro que los países de la Región están siendo afectados de manera importante por la ocurrencia y propagación de los incendios forestales y, por otro lado, que sus gobiernos no han logrado aún establecer esquemas efectivos para la protección de sus recursos naturales renovables. No debieran existir impedimentos importantes para que cada uno de estos países pueda diseñar e implementar su propio esquema para el control de los incendios forestales, basado en las condiciones que prevalecen y en las capacidades efectivamente disponibles.

Sin embargo, ello se podrá lograr en la medida que realmente se asuman las responsabilidades que implica la protección forestal. Cuando los técnicos relacionados con el problema, especialmente aquellos vinculados a la actividad forestal, cambien su posición desde espectadores a la de actores, en gran medida se

estarán dando las condiciones para organizarse adecuadamente para el control de los incendios forestales.

En esta tarea, no debe dejar de tenerse presente que, si bien las experiencias extranjeras pueden ser muy valiosas, cada país posee una importante proporción de condiciones propias y diferentes a las de otras naciones. Ello indica que la iniciativa, la originalidad y la disposición para enfrentar el problema, deberá provenir principalmente de los directamente afectados por el problema.

La consecución de todo lo indicado en los párrafos anteriores pasa ineludiblemente por el desarrollo de programas efectivos de capacitación y entrenamiento para todo el personal involucrado al tema, en todas las instancias de gestión y ejecución. No solamente los operarios de las diferentes organizaciones requieren estar adecuadamente adiestrados para la realización de las distintas actividades de prevención, combate y uso del fuego, sino que también los estratos directivos, que deben comprender el problema en toda su magnitud, y también conocer las capacidades de los recursos disponibles para la protección, como asimismo los criterios y estrategias aplicables en general y en particular. Debe señalarse que, en estos países, la mayor limitación no radica tanto en la disponibilidad de recursos (que en general son escasos), sino que más bien en la forma como se asignan y utilizan.

Algunos de los países latinoamericanos han logrado incorporar en las escuelas de técnicos e ingenieros forestales asignaturas obligatorias sobre protección contra los incendios forestales. Estos casos justamente coinciden con los países o provincias que observan los mejores niveles de prevención y combate. Este aspecto debiera generalizarse, porque la experiencia obtenida ha demostrado que estos profesionales son los mejores capacitadores del personal operativo y que, a su vez, desde ellos fluyen las bases para la formulación de las políticas y planes en la materia, porque son los únicos que efectivamente pueden argumentar y convencer a las autoridades sobre la necesidad de establecer esquemas de trabajo técnicamente correctos y factibles de ejecutar.

Finalmente, debe señalarse que una importante referencia para el establecimiento y funcionamiento de sistemas nacionales de protección contra incendios forestales la constituye las Directrices de carácter voluntario para el Manejo del Fuego, cuya formulación ha sido recientemente elaborada por la FAO con el apoyo de las experiencias y recomendaciones de diversos países (FAO, 2006)

Las Directrices tienen como propósito primordial definir las bases para la prevención y combate de incendios, el uso del fuego y la rehabilitación y restauración de zonas afectadas por la propagación del fuego. En general, contribuyen proporcionando conceptos y argumentos para la formulación y aplicación de políticas y estrategias en la materia, como así también respecto a los

fundamentos que deben sustentar a la institucionalidad y legislación requeridas para el adecuado cumplimiento de los objetivos del manejo del fuego.

La identificación y descripción de las estrategias para planes nacionales de manejo del fuego son un aspecto importante de las Directrices, por las referencias que entregan para guiar y apoyar a la gestión de los actores responsables de la protección contra los incendios forestales. En ese sentido, cabe destacar que las estrategias propuestas, clasificadas en 14 lineamientos, los que a continuación se señalan mencionando sus títulos, cubren adecuadamente todo el espectro de acciones y tareas requeridas para lograr una efectiva reducción de los impactos y daños que provocan los incendios forestales.

- Programación del manejo del fuego y los recursos
- Manejo del fuego en áreas y reservas naturales y protegidas
- Concienciación y educación sobre el fuego
- Prevención de incendios
- Sistemas de cálculo del peligro de incendios y de alerta temprana
- Preparación contra los incendios incluida la formación técnica
- Actividades previas a la temporada de incendios
- Detección de incendios, comunicaciones y envío inicial de medios
- Ataque y acciones iniciales
- Extinción y manejo de grandes incendios
- Tratamiento del combustible
- Fuego programado
- Restauración y rehabilitación de áreas quemadas
- Seguimiento y evaluación

En el Documento de la Directrices se señala de manera especial la diversidad de contextos y requisitos especiales que requieren ser considerados para el establecimiento y operación de sistemas nacionales de manejo del fuego eficientes, dadas las importantes variaciones que se observan entre los países por la naturaleza de sus condiciones naturales, ambientales, socioeconómicas y culturales. Es importante mencionar que la propuesta de principios orientadores y acciones estratégicas en todos sus niveles para la defensa de los recursos naturales renovables, recomienda considerar de manera fundamental los contextos cultural, social, ambiental y económico en que se desenvuelve cada uno de los países.

Referencias

- International Tropical Timber Organization (ITTO). 1997. ITTO Guidelines on Fire Management in Tropical Forest. ITTO Policy Development Series N°6. Yokohama, 40 p.
- Julio, G. 2004. Gestión en la Protección contra Incendios Forestales en América del Sur. Proc. II Symposium of FIRE Economics, Planning and Policy: A Global View. Consejería de Medio Ambiente de Andalucía/USDA Forest Service/U. Córdoba. Córdoba, España. 11 p.
- Julio, G. 2006. Planificación y Prevención de Incendios Forestales en Ecosistemas Nativos – Una Perspectiva Latinoamericana. VIII Maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural. Univ. Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana. La Rábida, España. 14 p.
- Julio, G. 2007. El Modelo Iberoamericano: Alcances sobre los Sistemas Nacionales de Manejo del Fuego. IV Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. Sevilla, España. 7 p.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2006. Directrices de carácter voluntario para el Manejo del Fuego: Principios Orientadores y Acciones Estratégicas. Documento de Trabajo FM17S. Dirección de Ordenación Forestal, FAO. Roma. 71 p.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2007. Fire Management – Global Assessment 2006. FAO Forestry Paper N° 151. Roma. 160 p.

Hacia un Adelanto en la Teoría Económica de los Incendios Forestales¹

Douglas Rideout², Yu Wei² y Andy Kirsch³

Resumen

Los programas tradicionales de control de incendios comprenden varios componentes importantes, entre ellos: la supresión y el ataque inicial, la prevención y el tratamiento de combustibles. Existen tres razones clave por las cuales estos componentes se manejan bajo un mismo programa y cada una de ellas se relaciona con otros componentes en la estructura económica del manejo del fuego. Éstas incluyen el tratamiento de los costos comunes, los efectos complementarios o de sustitución en la productividad de los componentes y la gestión de los componentes dentro de un mismo presupuesto. La consideración de las interacciones entre los componentes sugiere una ampliación de la teoría económica del manejo del fuego de manera que sea más abarcadora. La función probabilística de producción que se emplea aquí permite que los componentes de estos programas se unifiquen en una sola expresión de ejecución y facilita la consideración simultánea de cada componente. Esta estructura teórica constituye una evolución natural de la teoría generalizada de la economía de los incendios que comenzó con Headly y Sparhawk.

Palabras clave: Manejo de fuegos, probabilidad, SIG, teoría económica.

Contexto Histórico

Lovejoy y Headley (1916) formularon el problema de la eficiencia económica de los programas para el manejo de fuegos como una cuestión de minimizar el costo más el daño neto ocasionado por el fuego. Más adelante, el concepto del costo más el daño fue ampliado e ilustrado por Sparhawk (1925) en su modelo del menor costo más la responsabilidad, y lo expresó como el modelo del menor costo más pérdida que se ilustra en la figura 1.

Según indica González-Cabán (2007), "El principio fundamental del modelo de Sparhawk es minimizar la suma de los costos de supresión más la pérdida de recursos (la "responsabilidad total") y los costos de protección (la presupresión); donde la presupresión sería la variable independiente que determinará los costos de supresión y los daños. La responsabilidad total está inversamente relacionada con los esfuerzos

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Catedrático y Catedrático Asociado, respectivamente, Department of Forest Rangeland and Watershed Stewardship, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523; email: doug@warnercnr.colostate.edu; wei@warnercnr.colostate.edu

³ Analista Programa de Incendios, Servicios de Parques Nacionales de EE.UU.; e mail: andy_kirsch@nps.gov

de protección primarios; en la medida en que aumentan los gastos de la presupresión, disminuyen los costos de supresión y los daños.

Figura 1 – Ilustración de Sparhawk del modelo de costo más pérdidas.

Gorte y Gorte (1979) catalogaron una serie de aplicaciones basadas en Sparhawk, que redefinen la variable independiente como tiempo de llegada, acres y otros en lugar de protección primaria. Para parafrasear a González Cabán (2007), hasta 1990 parecía no haber desacuerdo, en términos generales, sobre la utilidad y la corrección de la fórmula C+NVC. Sin embargo, Rideout y Omi (1990) argumentaron que para explicar mejor los beneficios potenciales inducidos de los incendios forestales era necesaria una expresión alterna de la teoría económica del manejo de los fuegos forestales. Ellos proponen una nueva fórmula de la expresión C+NVC como maximización de las ganancias en lugar de minimización del costo, lo que proporciona un modelo más general que "permite una comparación más directa entre el problema de los incendios y la bibliografía económica (Rideout y Omi 1990: 620)". Donovan y Rideout (2003a) retoman los argumentos presentados por Rideout y Omi (1990) y ofrecen un análisis de lo que se considera intrínsecamente incorrecto en la fórmula de menor costo más pérdida de Sparhawk (1925) y la variación más reciente de la expresión C+NVC (Mills y Bratten 1982). Argumentan que la supresión está modelizada incorrectamente como producto del modelo y que la supresión y la protección primaria (presupresión) están incorrectamente modelizadas como una correlación negativa. Más adelante argumentan que estos errores tienen serias repercusiones sobre la capacidad del modelo de identificar correctamente el nivel más eficiente de gastos de manejo de fuegos (Donovan y Rideout 2003a: 318)."

Como lo indicaron Rideout y Omi (1990), para hacer una representación correcta del modelo C+NVC, la presupresión y la supresión deben ser modelizadas como insumos independientes. En otras palabras, se les debería permitir variar de manera independiente, usando la función de NVC para relacionarlas. Rideout y Ziesler (2004) detallan cómo la aplicación incorrecta del modelo C+NVC ha dado lugar a algunos mitos que han perdurado en la bibliografía. Con algunas excepciones, como Simard 1976, el error de Sparhawk continuó a través del desarrollo de los modelos operacionales, entre ellos el *National Fire Management Analysis System* [Sistema de Análisis Nacional para el Manejo de Fuegos, NFMAS, por sus siglas en inglés] (Servicio Forestal del Depto. de Agricultura de EEUU, 1985), y a través de la estructura actual del *Fire Program Analysis System* [Sistema de Análisis de Programas de Incendios (FPA por sus siglas en inglés)].

¿Por qué un nuevo marco teórico?

Con un gran interés en formular y operacionalizar una nueva generación de modelos de manejo de fuegos que reflejen mejor el nuevo paradigma de ordenación de las tierras, se está realizando un mayor esfuerzo por alcanzar esta nueva frontera. Hay dos razones clave para establecer un nuevo acercamiento teórico:

1. Algunas aplicaciones actuales, y las previas, propagan el error de Sparhawk.
2. La teoría previa no integra la gama de componentes de los programas que se esperan del nuevo paradigma de ordenación de las tierras.

La segunda razón amerita una explicación. La expectativa de muchas de las aplicaciones actuales es que tienen la capacidad de integrar adecuadamente los diversos componentes de los programas de incendio, tales como el ataque inicial, la supresión y la prevención. Los modelos gráficos, como los que se basan en la ilustración de Sparhawk, emplean la capacidad de preparación como variable decisional, pero tratan inadecuadamente la supresión como un resultado y no incluyen directamente a la prevención. Por el contrario, dependen del enfoque dado a un componente individual del programa. Los modelos actuales no estaban pensados para que se ocuparan de cómo los planes para el ataque inicial y el tratamiento de combustibles se afectan mutuamente de manera simultánea. Por ejemplo, los modelos de ataque inicial utilizados en los Estados Unidos, como el *National Fire Management Analysis System (NFMAS)* y el *California Fire Economics Simulator (CFES2)* son específicos para el ataque inicial. Los modelos de combustible, incluidos los adelantos diseñados por Hof y Omi (2003), no están pensados para incorporar directamente el ataque inicial o los efectos de supresión. En algunos casos,

los modelos para componentes específicos pueden utilizar el resultado de un componente como insumo para el otro. Este acercamiento secuencial a la interacción de los programas posee limitaciones que se pueden mejorar mediante el desarrollo cabal de un sistema que intente abordar el problema de una manera más holística. Hay tres tipos básicos de interacciones entre los componentes de los programas.

- El proceso de planificación de *presupuesto*
- Las estructuras de *costo*
- Las interacciones físicas entre la *productividad* de los componentes

En relación con el *presupuesto*, los fondos asignados a un componente a menudo reducen los fondos disponibles para otro componente. Por ejemplo, asignar más fondos a la prevención puede reducir los fondos disponibles para la supresión. Esta forma de interconexión refleja directamente insuficiencia en el presupuesto del programa de incendios y los procesos de asignación de fondos. A menudo, el principio económico utilizado para enfrentar la escasez en todos los componentes es requerir mejoras equivalentes en cada componente por cada dólar gastado. Esto es una aplicación de lo que los economistas llaman el principio de equimarginalidad. Aunque esta consideración es importante, no ofrece una razón de peso para desarrollar una teoría económica unificada. Esto se debe a que un presupuesto común no afecta directamente el beneficio subyacente o la estructura de costos del programa. Los niveles de los componentes de programas podrían ajustarse independientemente, hacia arriba o hacia abajo, de manera tal que se logre conformidad con el principio de equimarginalidad.⁴

El *análisis de costos* por componente es complicado y a menudo frustrante porque los recursos para el manejo de fuegos (autobombas, aeronaves, personal, etc.) están interrelacionados a través de la función de costos. Un recurso para el manejo de fuegos, como un autobomba, a menudo se utiliza como apoyo a componentes de diversos programas. Por ejemplo, el costo de compra de un autobomba utilizado tanto en la protección contra incendios como en el manejo de combustibles sería conjunto, lo que haría imposible dividir lógicamente el precio de compra del vehículo contra incendios entre estos dos componentes del programa. En economía, esto es un

⁴ Esto requeriría una enumeración poco común de un grupo completo de niveles de financiación para cada componente del programa, donde cada uno debe ser comparado para seleccionar la combinación óptima de los niveles de los componentes.

problema muy común de asignación de costos conjuntos. Este tipo de consideraciones de costo no están bien tratadas en un análisis separado o secuencial de los componentes. Es poco probable que una consideración individual de los componentes del programa permita que la planificación o preparación del presupuesto aproveche los ahorros en costo disponibles en los recursos que son comunes a los componentes.

La interconexión en la *productividad* de los componentes se ha reconocido por mucho tiempo, pero no ha sido bien analizada. Por ejemplo, una justificación importante de la reducción de los combustibles peligrosos es afectar positivamente los esfuerzos de supresión mediante la reducción de la longitud de las llamas, la reducción de los índices de crecimiento de los incendios, y la facilitación de una construcción más rápida de las líneas de defensa. La preparación de presupuesto y las interacciones físicas entre los componentes del programa de incendios gozan de un reconocimiento general desde hace mucho. Sparhawk (1925) reconoció la interacción entre la preparación y la supresión para la planificación del manejo de fuegos. Crosby (1977) trató la preparación, la supresión y la prevención al evaluar el impacto de los incendios. Más recientemente, Pyne *et ál.* (1996, página 386) indicaron:

—Todas estas actividades y todos estos niveles de manejo requieren planificación. Especialmente, cuando el manejo de fuegos entra en un período de consolidación, los planes mediante los cuales se integran programa con programa, agencia con agencia y región con región van a asumir cada vez más importancia”.

Una teoría unificada de los componentes de los programas de incendios forestales

Para formular un modelo económico unificado del análisis de los programas de incendios, afirmamos que los administradores federales muestran un comportamiento compatible con la minimización de los costos. Aunque dicho comportamiento no siempre refleje la realidad, esta aseveración ha resistido la prueba del tiempo para los propósitos de modelización y sugerimos que modelizar dicho comportamiento es deseable al menos como punto de comparación con un comportamiento distinto. La aseveración de la minimización de costos también ayuda a entender y reconocer un programa de incendios rentable.

En términos generales, definimos la supresión como las actividades involucradas en la extinción de los incendios forestales, aunque, para propósitos prácticos, la supresión puede estar dividida en las categorías de ataque inicial y subsiguiente, como en un “incendio de gran magnitud”. Enfocar nuestra discusión en dos componentes simplifica mucho y mejora nuestra capacidad de ilustrar las relaciones económicas subyacentes. Expandir el análisis para incluir componentes adicionales como la prevención de incendios y el tratamiento de combustibles ecológicos para mejorar el estado del terreno es simple. También presentamos un cambio mayor con respecto a muchos enfoques previos. Aquí, reconocemos que la planificación de programas y la preparación de presupuestos se realizan en el contexto del manejo de futuros incendios y temporadas de incendios que son *desconocidos* con respecto a su incidencia, intensidad, tamaño, etc. La suposición habitual de que los sucesos de incendios específicos que denotan una carga de trabajo relacionada con futuras temporadas de incendio, puedan ser modelizados a la luz de eventos pasados se ha utilizado ampliamente y se presenta en modelos como el de la *Interagency Initial Attack Analysis System (IIAA)* y en el *CFES2* (Fried *et al.* 2006). También ha sido habitual modelizar la ubicación de los tratamientos de combustible basado en supuestos lugares de ignición como los simulacros de Monte Carlo, de Hof y Omi (2003), o como en las simulaciones Flam Map (Finney 2005).

La modelización basada en eventos introduce una incongruencia filosófica potencial entre el nivel del programa y las tácticas del análisis del nivel del evento. Esta incongruencia puede contrarrestarse por medio de la incorporación de una función de producción probabilística. A pesar de que no se pueden predecir futuros incendios o temporadas de incendios, la probabilidad de incendio por intensidad y procedencia se puede calcular utilizando los métodos probabilísticos establecidos. Resumir miles de eventos individuales de incendios en una función de producción probabilística elimina la incongruencia filosófica potencial de modelizar eventos individuales para analizar un programa completo y se adapta mejor a la escala de análisis, a menudo necesaria para enfrentar los programas de incendios.

Sugerimos que la productividad de cada programa de incendios puede ser representada por los cambios al mapa de probabilidades del paisaje. La representación de la productividad de los programas es esencial para cualquier análisis económico basado en la producción. Dado que nuestro acercamiento probabilístico se aleja de los eventos aislados de incendios, paralelamente se aleja de los recursos para fuegos individuales. Finalmente, reconocemos que las interrelaciones espaciales y temporales son importantes. Las relaciones espaciales son importantes porque la probabilidad de que ocurra un fuego en un determinado

lugar está influenciada por las condiciones de los lugares vecinos. Por ejemplo, la probabilidad de incendios en un determinado lugar (p. ej., una celda rasterizada de un Sistema de Información Geográfica (SIG)) es una función de los atributos para producir incendios que tiene esa celda y de los atributos de las celdas vecinas. La ilustración número dos (2) ofrece una muestra de una cuadrícula de probabilidad del componente del programa de prevención de incendios aplicado a una porción del programa de manejo de fuegos en Colorado.

A medida que los recursos de prevención se colocan sobre el paisaje, estos operan para alterar la probabilidad de incendios forestales según estén espacialmente dispuestos. Dicha superficie puede estar integrada con un ataque inicial así como las probables superficies de manejo de combustibles. La clave para unificar la economía del análisis de programas es que los componentes de cada programa “hablen el mismo idioma” a través de la función de producción.

Figura 2. – Superficie de probabilidad para la prevención en un paisaje forestal en Colorado.

Si bien una función de producción probabilística permite una integración más robusta de las interacciones espaciales y temporales, utilizamos modelos estáticos

como un primer paso⁵ simplificador, porque nuestro énfasis está en la teoría. Comenzamos con la estructura más general en (1) para minimizar la pérdida anticipada de presupuestos limitados causada por los incendios forestales (Z) donde los componentes del programa, combustibles (F) y la supresión (S) son modelizados como variables decisionales.

$$\text{Min}_Z = L \bullet P(F, S) + \lambda(B - \text{SCS}(S) - \text{SCF}(F) - \text{JC}(F, S)) \quad (1)$$

Donde:

P (F, S) denota la función de producción probabilística para el programa

C denota la función del costo del programa de incendio

B denota el presupuesto del programa de incendio

λ (Lambda) denota el multiplicador Lagrange para la restricción de presupuesto del programa.

B denota una asignación o presupuesto

SCS denota el costo separable de la supresión

SCF denota el costo separable de los combustibles

JC denota el costo conjunto —este costo no es separable entre los componentes—

Se pueden desarrollar muchas interrelaciones de esta función objetiva (Rideout *et ál.* 2008), pero es suficiente decir que dicha formulación del modelo permite una consideración directa de la estructura de los costos conjuntos, que es tan importante en el programa de incendios y para las interacciones en la productividad de los componentes del programa, en modos que las formulaciones previas no habían abordado como consideraciones simultáneas. La formulación general provee una base de la cual se pueden hacer muchas mejoras, que incluyen la introducción del análisis estocástico y la introducción de las consideraciones beneficiosas en incendios forestales, así como la capacidad de tratar una respuesta de manejo apropiada (AMR, por sus siglas en inglés), donde los incendios forestales sean manejados de forma tal que proporcionen un beneficio neto mayor. Aquí, para producir un resultado deseable, los efectos beneficiosos de los incendios están directamente reconocidos y manejados en conjunto con los efectos detrimentales.

⁵ Las formulaciones estáticas de la teoría son tradicionales en el manejo de fuegos (Rideout y Omi 1990.)

Conclusión y Discusión

El desarrollo de la teoría tradicional hacia una función de producción probabilística unificadora permite un análisis más rico. Cada componente del programa puede comunicarse efectivamente con cada uno de los otros componentes del programa a través del lenguaje de la probabilidad. Esto hace posible la consideración de un acercamiento holístico al manejo de los programas de fuego que no era posible a través de los modelos tradicionales. Además de esto, la estructura probabilística hace posible el uso directo de un análisis espacial a través de un Sistema de Información Geográfica. Por ejemplo, la estructura probabilística hace posible el análisis espacial donde las células rasterizadas se pueden comunicar efectivamente para transmitir información que afecta a cada componente del programa con respecto a la relación entre la propagación del fuego y la ignición.

Aunque la función de producción probabilística requiere una mayor abstracción que la modelización tradicional basada en eventos, ésta puede ser más apropiada para el análisis estratégico y el análisis integrado. El reto de este acercamiento global es permitir que cada componente del programa ocasione un cambio en las probabilidades de forma tal que esté directamente disponible para los otros componentes del programa. En otras palabras, cuando los tratamientos de combustible están programados espacialmente, cómo alteran la superficie de probabilidades de forma que sea significativa para los programas de supresión y de ataque inicial. Aunque conectar los cambios que establecen relaciones a nivel del componente del programa con los cambios en las probabilidades es un reto, los beneficios de la integración de los costos conjuntos y la productividad de los programas parecen ser prometedores.

La aplicación de este tipo de novedad representa muchos retos, pero el progreso demostrado en algunas aplicaciones es esperanzador. En una primera aplicación, Wei et al. (en prensa) demostraron cómo la función de producción probabilística puede utilizarse para programar de manera óptima los tratamientos de combustible a en todo el paisaje forestal. A pesar de que esta aplicación utilizó un solo componente de programa, proporcionó un comienzo y una demostración. En una segunda aplicación, más retante, Wei y Rideout (ver la ponencia de Wei y Rideout en este simposio, 2008) explicaron el desarrollo del modelo económico probabilístico unificador para abordar el manejo de respuesta de manejo apropiada a través del paisaje del sur de California. Este modelo incluye una interfaz gráfica de usuario (fig. 3).

Figura 3 – La principal interfaz gráfica de usuario desarrollada para implementar la teoría económica unificada en el análisis de respuesta de manejo apropiada.

El mapa de retícula en la ilustración no. 3 aplicado a una porción clave del Parque Nacional Sequoia y Kings Canyon con un mapa de elevación digital como trasfondo. Cada píxel define un área donde la probabilidad de incendio puede demostrarse y manejarse en un contexto espacialmente explícito. Dadas ciertas condiciones atmosféricas, topográficas y de combustible, los pixeles en la ilustración no. 3 se pueden transformar en una superficie de probabilidad de incendios como la de la ilustración no. 4. La probabilidad, entonces, se puede manipular a través del tratamiento de combustibles o del manejo de fuegos particulares.

Resulta particularmente interesante la integración de los componentes de los programas facilitados por la función de producción probabilística. Aquí integramos conjuntamente el manejo de combustibles con el manejo de fuegos para apoyar las decisiones en un programa de respuesta de manejo apropiada.

Figura 4 – Probabilidad reportada de quema dentro del sitio estudiado para un conjunto específico de condiciones atmosféricas, topográficas y de combustibles. Los colores más oscuros representan probabilidades más altas de quema.

Referencias

- Arnold, R.K. 1949. Economic and social determinants of an adequate level of forest fire control.
- Davis, Lawrence S. 1971. The economics of fire management. In: Planning in fire management proceeding. Phoenix, AZ: Southwest Interagency Fire Council; p 60-69.
- Donovan, Geoffrey H. and Douglas B. Rideout. 2003. A reformulation of the cost plus net value change (C+NVC) model of wildfire economics. *Forest Science*. 49(2):318-323.
- Donovan, Geoffrey H.; Rideout, Douglas B. 2003a. A reformulation of the cost plus net value change (C+NVC) model of wildfire economics. *Forest Science* 49(2): 318-323.
- Donovan, Geoffrey H.; Rideout, Douglas B. 2003b. An integer programming model to optimize resource allocation for wildfire containment. *Forest Science* 49(2): 331-335
- Finney M.A. 2006. FlamMap 3.0. Missoula, MT: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory
- Finney, M.A. 2001. Design of regular landscape fuel treatment patterns for modifying fire growth and behavior. *For. Sci.* 47:219-228.
- Flint, Howard R. 1928. Adequate fire control. *Journal of Forestry* 26(5): 624-638.
- González-Cabán, Armando. 2007 Fire Management Policy and Fire Management Economic Efficiency in the USDA Forest Service. Invited Keynote lecture at the IV International Wildland Fire Conference, 13-17 May 2007, Seville, Spain.; http://www.wildfire07.es/html/in/cMagistrales_in.html
- Gorte, Julie K.; Gorte, Ross W. 1979. Application of economic techniques to fire management.
- Headley, Roy. 1943. Re-thinking forest fire control. Res. Paper M-5123. Missoula, MT: North Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station; U.S. Department of Agriculture, Forest Service. 361 p.
- Hesseln, Hayley; Rideout, Douglas B. 1999. Economic principles of wildland fire management policy. In: González-Cabán, Armando; Omi, Philip N., technical coordinators. 1999. Proceedings of the symposium on fire economics, planning, and policy: bottom lines; 1999 April 5-9; San Diego, Ca. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-173. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture; 332 p.
- Hornby, L.G. 1936, Fire control planning in the northern Rocky Mountain Region. Missoula, MT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service; 179 p.
- Lovejoy, P.S. 1916. Costs and values of forest productions. *Journal of Forestry* 14(1): 24-38.
- Mills, Thomas J.; Bratten, Frederick W. 1982. Economic efficiency and risk character of fire management programs, northern Rocky Mountains. Gen. Tech. Rep. PSW-65. Berkeley, CA:

- NWCG (National Wildfire Coordinating Group). 2001. Review and update of the 1995 federal wildland fire management policy. National Interagency Fire Center, Boise, Idaho, USA.
- Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture; 52 p.
Parks, George M. 1964. Development and application of a model for supresión of forest fires. *Management Science* 10(4): 760-766.
- Rideout, D.B., Yu Wei, Andrew Kirsch and Stephen J. Botti. 2008. (In Press). Toward a unified economic theory of fire program analysis. In: *The Economics of Forest Disturbances: Wildfires, Storms and Invasive Species (Forestry Sciences)*. Thomas Holmes, Jeff Prestemon and Karen Abt. Eds.. Kluwer.
- Rideout, Douglas B. and Philip .N. Omi. 1990. Alternative expressions for the economics of fire management. *Forest Science*. 36(3):614-624.
- Rideout, Douglas B.; Omi, Philip O. 1990. Alternate expressions for the economic theory of forest fire management. *Forest Science* 36(3): 614-624.
- Rideout, Douglas B.; Ziesler, Pamela S. 2004 Three great myths of wildland fire management. In: González-Cabán, Armando, technical coordinator. 2004. 2004 April 19-22; Proceedings of the II International symposium on fire economics, planning and policy: A world view. Córdoba, Spain; Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture; CD only.
- Schweitzer, D.L.; Andersen, E.V.; Mills, T.J. 1982. Economic efficiency of forest management
- USDA Forest Service. 1985. National fire management analysis system user's guide of the initial action assessment (FPL-IAA2.2). Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service. USDA Forest Service.
- USDA/USDI (1995). Federal Wildland Fire Management Policy & Program Review, USDA Forest Service, USDI Bureau of Land Management, USDI National Park Service, USDI Fish and Wildlife Service, USDI Bureau of Indian Affairs. Boise, Idaho, National Interagency Fire Center.
- Wei, Y, Rideout, D.B., Kirsch, A, (in press), An optimization model for locating fuel treatments across a landscape to reduce expected fire losses, *Can. J. For. Res.*
- Wei, Y., D.B. Rideout. 2008. Developing a Probability Based Approach to Support Wildland Fire Management Decisions. In: proceedings of this symposium.

Problemática de los Incendios Forestales en Costa Rica, su Sistema de Voluntariado y su Estructura Organizacional¹

Alberto Vásquez Rodríguez²

Resumen

Los incendios forestales en Costa Rica se presentan durante la época de menor precipitación, que comprende los meses de enero a mayo, tiempo atmosférico que puede adelantarse o postergarse en base al comportamiento climático de las distintas zonas que posee el país. Las regiones más afectadas a este tipo de siniestros son: Pacífico Norte, Central y Sur del país, así como a menor escala en la región Huetar Norte, específicamente en los cantos de Los Chiles y Upala de la provincia de Alajuela.

La cacería, los incendios forestales y agropecuarios, la invasión, la tala ilegal y la extracción de recursos son parte de los problemas principales que enfrentan las áreas silvestres protegidas.

Sin embargo los incendios forestales son producidos por actividades humanas de manera involuntaria o en forma premeditada, cuyo problema se da tanto dentro de los límites de las áreas silvestres protegidas como en sus zonas de amortiguamiento, donde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ha tenido que implementar una serie de acciones de carácter preventivo y de control que exitosamente han conllevado a la reducción de las áreas año tras año, acciones que se han originado en muchas ocasiones a la desigualdad social, carencia de tierra, falta de una cultura forestal y de información, políticas gubernamentales mal orientadas o desconocimiento de las mismas, así como proyectos y propuestas sobre el manejo del fuego, fuera del contexto de la realidad socioeconómica nacional.

¹ Una versión abreviada de este Trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril - 2 de mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² Ingeniero Forestal, MINAE –DIGECA, San José – Costa Rica 10104; Email: vasqueza29@hotmail.com.

1. Introducción

Entre las causas mas relevantes del origen de los incendios forestales en Costa Rica se pueden citar:

Quemas agropecuarias. Los productores realizan este tipo de prácticas habituales, sin el cuidado de realizar las rondas y los cortafuegos pertinentes que originan la dispersión del fuego a otras zonas no afectadas por este tipo de siniestro, aunado a este problema, se presenta el desconocimiento de la legislación vigente, reglamentos de quemas agropecuarias, desactualizados, poco divulgados y poco operativos, que no responden a las necesidades reales con que viven los campesinos, productores, agricultores y ganaderos en otros cuando desarrollan este tipo de actividad.

Venganza. Esta se produce en forma malintencionada, y en muchas ocasiones por represalias de las acciones que implementan los guarda parques dentro de los límites de las áreas silvestres protegidas y sus contornos, cuando los cazadores, pescadores, madereros infringen las leyes respectivas relacionadas con los recursos naturales y el ambiente. Ejemplo de lo anterior se presento en el año 2002, con la quema de la Casona de Santa Rosa (Sitio de Patrimonio Mundial), localizada en el Parque Nacional Santa Rosa, por parte de cazadores ilegales, conllevando a pérdidas económicas significativas y históricas al país.

Vandalismo. Problema que se acentúa en el país cada día mas significativo el cual se produce por un acto delictivo, donde las personas buscan destruir o dañar tanto el patrimonio natural e infraestructura dentro de las áreas silvestres protegidas así como las propiedades privadas.

Actividades de caza. Donde la persona realiza prácticas ilegales y irresponsables con el afán de capturar las presas respectivas dentro de las áreas silvestres protegidas como en sus zonas de amortiguamiento, originado la desaparición a corto plazo de muchas especies silvestres de valor científico, ecológico y comercial.

Botaderos de basura. Sitios donde la disposición de residuos sólidos, se realiza sin ningún control, ni tratamiento adecuado por parte de los gobiernos locales, originando la acumulación del gas metano, infiltración de elementos nocivos al suelo,

así como la distorsión del paisaje entre otros problemas lo que provoca en la época seca el punto de ignición del fuego.

1.1. Estadísticas sobre incendios forestales en Costa Rica

En Costa Rica, según los registros estadísticos realizados por el SINAC, en los últimos años (1998 – 2007), se ha afectado por incendios forestales una área promedio de 351.276,24 has.(cuadro No. 1), tanto dentro de los límites de las áreas silvestres protegidas como en sus zonas de amortiguamiento.

Cuadro 1-- registro de área por incendios forestales tanto dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, período 1998 – 2007.

Año Área	afectada Dentro ASP	Área afectada Fuera ASP	Área Total (ha)
1998 8.	011,55	56.881,90	64.893,45
1999 85	7,00	10.334,50	11.191,50
2000 2.	390,82	34.505,48	36.896,30
2001 9.	540,70	47.970,00	57.511,40
2002 3.	150,00	47.187,00	50.337,00
2003 6.	287,05	26.495,50	32.782,55
2004 4.	706,00	30.522,22	35.228,31
2005 3.	175,24	11.647,00	14.822,24
2006 4.	220,10	10.971,50	15.191,60
2007 4.	849,67	27.572,22	32.421,89
Total 4	7.188,22	304.088,02	351.276,24
Porcentaje (%)	13,43	86,57	100,00

Fuente: P.N.M.F./SINAC –MINAE, 2007

En el año 1998, se presentó la mayor área afectada por los incendios forestales que fue de aproximadamente de 64.893,45 has y la menor en el año 1999 con un total de 11.191,50 has (cuadro 2), sin embargo las áreas cubiertas por pastos son las más afectadas por este tipo de siniestros, donde el área promedio entre 1998 fue de 64.893,45 y para 2006- 2007 de 32.421,89 has, donde el tipo de vegetación más afectada fue de pastos, charrales, tacotales y bosques secundario.

En el cuadro 2, se representa el área afectada por los incendios forestales, de acuerdo con cada área de conservación, que comprenden del período 1998 al 2007, donde las más afectadas por este tipo de siniestros han sido: Área de Conservación Tempisque la que presentó una mayor área afectada y con un menor rango el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, lo cual obedece que su mayor parte del territorio presenta características climáticas no favorables para la propagación de incendios forestales.

Cuadro 2--área afectada por los incendios forestales, por área de conservación, período 1998 – 2007.

Área de Conservación	Área Promedio (1998 – 2007)	Promedio (%)
Arenal – Tempisque	42.730,06	10,84
Tempisque 15	4.048,40	43,61
Huetar Norte	29.816,75	9,22
La Amistad Pacífico	21.398,60	6,04
Guanacaste 62.117,31		17,87
Pacífico Central	37.564,57	11,29
Osa 3.	280,50	1,03
Cordillera Volcánica Central	320,05	0,10
Total 35	1.276,24	100,00

Fuente P.N.M.F/SINAC-MINAE, 2007

Cuadro 4-- Áreas de Conservación Costa Rica.

Entre las Áreas de Conservación con mayor incidencia de incendios forestales están: Área de Conservación Guanacaste (ACG), Tempisque (ACT), Arenal Tempisque (ACA – T), Huetar Norte(ACA-HN), Pacífico Central (ACOPAC) y Amistad Pacífico (ACLA –P), localizadas la mayoría de ellas en la Costa Pacífica de Costa Rica. Cabe mencionar que cada una de estas áreas de conservación cuenta con su propia estructura organizativa para la extinción de los incendios forestales.

2. La participación del Voluntariado en los Incendios Forestales

En la actualidad Costa Rica, específicamente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), cuenta con un sistema de apoyo denominado **“Voluntario para el control de los incendios forestales”**, los cuales han sido el pilar para la participación de la sociedad civil en la protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente, apoyo que se consolida y fortalece durante la época seca (enero a junio de cada año).

La primera brigada de voluntarios de incendios forestales, se creó en abril de 1991 en la provincia de Guanacaste, específicamente en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y en el Parque Nacional Palo Verde, la cual surgió, como una necesidad para fortalecer las capacidades de respuesta contra este tipo de siniestros principalmente dentro de los límites de las áreas silvestres protegidas tanto estatales como privadas y en sus zonas de amortiguamiento, posteriormente se extiende la ayuda a los proyectos de reforestación que gozan de servicios ambientales, corredores biológicos, áreas de recarga acuífera y otras áreas de interés comunal y municipal entre otras.

Un bombero forestal voluntario se define **“Como aquella persona que participa en la prevención, mitigación, control y liquidación del fuego, capacitada y entrenada para trabajar en forma segura y eficiente”**

Una brigada forestal es definida como **“ El equipo activo dentro del sistema de respuesta para la prevención y manejo del fuego, la cual se encuentra, capacitada, organizada bajo una normativa administrativa y estructura adecuada, que cuenta con planes de trabajo, protocolos y procedimientos operacionales bajo el Sistema Comando de Incidentes”**. Una brigada está constituida por un jefe de brigada, un jefe de cuadrilla y dos cuadrillas de bomberos forestales de 12 personas como máximo cada una. Su ámbito de trabajo se fundamenta en la prevención, mitigación, manejo del fuego (control y quemaduras controladas y prescritas), detección y vigilancia, participación comunal, liquidación, gestión de recursos, custodia, manejo y mantenimiento de equipos y herramientas, capacitación y el entrenamiento.

El mecanismo de funcionamiento de las brigadas se realiza a través del trabajo voluntario gratuito, donde cada vez que se presenta un evento, el coordinador del programa del manejo del fuego de cada área de conservación, solicita el apoyo a los líderes de las brigadas y coordina la logística como es: la alimentación, transporte, alojamiento, herramientas entre otros para el control de cada siniestro.

Cabe destacar que desde 1998 el Instituto Nacional de Seguros a través del Cuerpo de Bomberos patrocina anualmente para la temporada de incendios la **“Póliza Básica de Accidentes”**, la cual se le otorga a los bomberos forestales que estén

organizados en brigadas a nivel nacional. En el cuadro 4, se detalla la cantidad de brigadas inscritas en la póliza.

Cuadro 5-- registro de bomberos forestales por brigada y por área de conservación 2005 – 2007.

Área de conservación	Número brigadas	Cantidad bomberos forestales
Huetar Norte	10	115
Arenal – Tempisque	21	255
Guanacaste 16		178
La Amistad Pacífico	15	178
Pacífico Central	14	170
Cordillera Volcánica Central	5	95
Osa 5		49
Tempisque 67		744
Total 15	3	1784

Cuadro 6-- registro bomberos forestales voluntarios inscritos bajo póliza básica de accidentes, período 1998 – 2006.

A	ño	Cantidad
1998		570
1999		706
2000		688
2001		700
2002		861
2003		802
2004		797
2005		847
2006/07		984
Total		6,955

2.1 Requisitos de operación de las brigadas

Para que el MINAE, acredite la operación de las brigadas de voluntarios es necesario que emprendan una serie de acciones que a su vez contribuyan a que de un proceso voluntario poco sistematizado, las brigadas puedan trabajar conforme a procedimientos y requisitos tales como:

- Realización y control de inventarios anuales de recursos
- Diagnóstico del estado actual de la brigada
- Elaboración y ejecución del plan anual de trabajo
- Procesos de capacitación para brigadistas

- Registros de accidentes
- Capacidad para la formulación de proyectos y búsqueda de financiamiento
- Mecanismos de evaluación internos anuales
- Trabajo regionalizado y coordinación interinstitucional
- Aplicación de protocolos de trabajo
- Tener una base de datos a nivel local y regional de miembros y contactos activos
- Colaborar con las áreas de conservación en la detección, comunicación y control de incendios forestales
- Contar con un reglamento interno

2.2 Perfil del brigadista

Con el fin de facilitar la formulación de las líneas de trabajo para este tipo de voluntarios y posibilitar el diseño de planes de formación y capacitación a futuro, así como establecer los criterios de la selección adecuada se establece un perfil para el brigadista como es:

- Comprometido con la protección del ambiente
- Solidario y con capacidad para el trabajo en equipo
- Respetuoso hacia los compañeros y compañeros brigadistas
- Disponibilidad para el trabajo
- Con capacidad para asumir responsabilidades y responder por sus actos
- Con sensibilidad para responder frente a las necesidades sociales y ambientales
- Disciplinado y con disposición para trabajar bajo autoridad
- Con condiciones físicas y de salud apropiadas para participar en procesos de control de incendios forestales.
- Con capacidad para establecer y mantener relaciones de cooperación con sus compañeros brigadistas
- Con una actitud de humildad que le permita reconocer sus capacidades como sus limitaciones
- Con capacidad para responder en forma paciente frente a las limitaciones de sus compañeros brigadistas
- Comprometido con el aprendizaje permanente
- Leal con sus compañeros de equipo

2.3 Acreditación de una brigada voluntaria forestal

La acreditación de una brigada obedece a los siguientes requisitos:

- Participación comprometida y responsable de voluntarios comunitarios e institucionales.
- Brigadistas con capacitación adecuada en procesos de prevención y control de incendios forestales.

Participantes con experiencia en atender situaciones de control de incendios forestales.

Brigada integrada por hombres y mujeres en una relación de equidad de género

Estructura organizativa consolidada y con capacidad en procesos de gestión ambiental.

Recursos disponibles para la atención efectiva de procesos de prevención y control de incendios forestales.

Adecuado sistema de coordinación y comunicación.

Procesos permanentes para el intercambio de experiencia y el desarrollo de la capacidad organizacional y personal.

Que cuente con un efectivo sistema de planificación, ejecución y monitoreo del trabajo.

Brigada con capacidad para identificar, formular, gestionar y ejecutar proyectos alternativos para la canalización de recursos.

Brigada con capacidad instalada para la administración del trabajo en situaciones de prevención y control de incendios forestales.

Brigada debidamente reconocida por el área de conservación correspondiente.

3. Estructura Organizacional del Manejo del Fuego en Costa Rica

Con el fin de alcanzar el nivel de coordinación adecuado dentro del contexto nacional, regional y local, el país cuenta con una estructura organizativa para afrontar la problemática de los incendios forestales, permitiendo la integración simultánea de diferentes actores y manteniendo el MINAE, a través del SINAC, la responsabilidad y el liderazgo en el desarrollo de acciones relacionadas con el manejo del fuego.

La estructura organizativa consta de una Comisión Nacional de Incendios Forestales denominada la (CONIFOR), conformada por una serie de entidades gubernamentales y un comité técnico (COTENA), el cual es representado por los coordinadores del Programa del Manejo del Fuego de las Áreas de Conservación más vulnerables a los incendios forestales, Comisiones Regionales, Comités Cantorales y brigadas contra incendios forestales.

3.1 Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR)

La Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, fue creada en 1997, por Decreto Ejecutivo No. 26399 – MINAE, publicado en La Gaceta No. 206 de 1997 y ratificada en el Decreto Ejecutivo No. 29149 – MINAE en diciembre del 2000. La CONIFOR

es una instancia adscrita y coordinada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), la cual ha estado operando permanentemente desde su creación.

Le corresponde a esta comisión, la formulación, gestión, apoyo, evaluación y seguimiento de acciones interinstitucionales relacionadas con esta disciplina. Esta conformada por las siguientes entidades:

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que coordina la CONIFOR.

Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros (INS), que desempeña la secretaría ejecutiva.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Ministerio de Educación Pública (MEP).

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).

Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Cruz Roja Costarricense (CRC).

Un representante de la Asociación de voluntarios para el Servicio de las Áreas Silvestres Protegidas (ASVO).

Cada entidad que conforma la CONIFOR, posee su propio presupuesto para la realización de acciones (preventivas, capacitación, educación ambiental y operación entre otras), mismas que se establecen en el plan operativo que elaboran y aprueba la CONIFOR, para cada entidad participante. Brindan además el apoyo necesario al SINAC, cuando este lo solicite, ya sea por motivos de la activación del nivel tres y cuatro (la extinción de incendios forestales), donde aplican el Sistema de Comando de Incidentes u otras acciones pertinentes.

3.2 Comisiones regionales

La CONIFOR se apoya en la gestión que realizan estas comisiones regionales que establece el MINAE a través del SINAC, según las recomendaciones emanadas por el Comité Técnico Nacional de Incendios Forestales y con la debida aprobación de dicha comisión.

Estas comisiones tienen la responsabilidad de coordinar, apoyar, ejecutar y dar el seguimiento adecuado a las acciones establecidas en los programas de manejo del fuego existentes en las diferentes regiones o en las áreas de conservación.

3.3 Comité Técnico Nacional de Incendios Forestales

El comité tiene como tarea el dar la respuesta pertinente a las necesidades de coordinación propias del SINAC y está compuesta por los coordinadores de los Programas de Manejo del Fuego de aquellas Áreas de Conservación más vulnerables a los incendios forestales.

Su función primordial es lograr el adecuado desempeño y consecución de los objetivos del Plan de Manejo del Fuego y de la Estrategia Nacional. Este comité es el soporte técnico para la toma de decisiones en esta disciplina por parte del SINAC y a la vez es el ente coordinador de apoyo y de seguimiento de las acciones que deben definir, establecer y desarrollar las Áreas de Conservación, mediante sus propios planes o programas

3.4 Comités cantorales

Son órganos de coordinación, apoyo y gestión local, los cuales son promovidos por las Áreas de Conservación o sus oficinas sub-regionales, con el fin de fomentar la participación activa de las instituciones, organizaciones locales y de la sociedad civil en este campo.

3.5 Brigadas contra los incendios forestales

Las brigadas contra incendios forestales están compuestas por bomberos y bomberas forestales, quienes son apoyados e integrados por funcionarios de entidades públicas, empresa privada, organizaciones no gubernamentales o por personas voluntarias que han sido capacitadas y entrenadas para tal fin.

Estas brigadas forman parte de la estructura nacional para el manejo del fuego, según lo establece la estrategia nacional y son parte en el desarrollo operativo de las acciones, de tal forma que permite la coordinación tanto con las comisiones regionales interinstitucionales como con los comités locales de emergencia.

Predicciones Estacionales de la Gravedad de los Incendios Forestales¹

Shyh-Chin Chen², Haiganoush K. Preisler³, Francis Fujioka², John W. Benoit², y John O. Roads⁴

Resumen

Los índices del Sistema Nacional de Evaluación del Grado de Peligro de Incendio Forestal (NFDRS, por sus siglas en inglés) inferidos de las predicciones, tanto mensuales como estacionales, de un modelo meteorológico del clima, con una cuadrícula a espacios de 50 Km., de enero de 1998 hasta diciembre de 2003, se utilizaron en conjunto con un modelo probabilístico para predecir la cantidad esperada de incidencias de fuego y de fuegos grandes en el oeste de EE.UU. Los pronósticos climatológicos a corto plazo son producto de experimentos en curso del Experimental Climate Prediction Center del Scripps Institution of Oceanography. El modelo de probabilidad emplea una regresión logística no paramétrica con funciones *spline* para evaluar las relaciones entre las covariables y las probabilidades de incendio. Previamente, se encontró que la humedad relativa de 2 metros y los índices de peligro de incendios Fosberg, junto con los índices de la NFDRS del índice de sequía de Keetch-Byram e intensidad de reacción producían más información significativa acerca de los grandes fuegos estudiados, que la que producían las demás variables meteorológicas independientes.

Utilizando esta relación de regresión previamente determinada entre la información histórica de los fuegos y los índices de peligro inmediato de fuego, estos índices produjeron eficazmente pronósticos de la severidad del fuego a escalas temporales mensuales y estacionales. Sin embargo, fue necesario remover de los índices pronosticados algunos sesgos en el modelo meteorológico, debido a un defecto secante, ya conocido, del modelo climático, antes de utilizarlos como insumo para el modelo de probabilidad. Se demostró que el modelo probabilístico que empleaba los índices con el sesgo corregido superó el modelo que utilizó sólo información histórica. La variabilidad interanual de frecuencia de fuegos se pronosticó de manera particularmente precisa. Esta aplicación dinámico-estadística híbrida para el pronóstico climatológico muestra una capacidad potencial para pronosticar (con precisión

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes; Carolina, Puerto Rico, 29 de abril - 2 de mayo de 2008.

² Meteorólogo Investigador, Depto. de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, CA 92507 schen@fs.fed.us

³ Estadística Investidora, Depto. de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Albany, CA 94710; hpreisler@fs.fed.us.

⁴ Instituto Scripps de Oceanografía, Universidad de California, San Diego, CA 92093

especificada) los impactos económicos resultantes con un plazo de antelación que fluctúa de un mes hasta una estación.

Palabras clave: Logística semiparamétrica, NFDRS, predicciones estacionales, severidad de quema.

Introducción

Los incendios forestales han sido un problema mundial de grandes proporciones que ha afectado a millones de hectáreas de bosques de matorrales. Tan solo en EE.UU., 2.5 millones de hectáreas se han visto afectadas anualmente, entre 2000 y 2004, con un costo de supresión promedio de \$1.2 mil millones, es decir, más del doble del costo de los cinco años anteriores (González Cabán 2005). Parte del incremento en costo puede deberse a la ampliación de la interfaz entre los bosques y las zonas urbanas en las comunidades (Shafran 2006). Sin embargo, también podría deberse al incremento en la frecuencia de incendios forestales y por lo tanto, a la superficie quemada. Mientras el nivel del área quemada afectada y los costos de supresión asociados reten la capacidad nacional para enfrentar el problema, el uso ineficiente de los costos de supresión podría desalentar el deseo de la sociedad de seguir dando apoyo financiero a los programas de manejo de incendios forestales.

Por consiguiente, desarrollar un sistema de manejo con la capacidad de proyectar pérdidas potenciales como consecuencia del impacto de los incendios forestales representaría un beneficio directo a la sociedad y a aquellos organismos responsables de la supresión del fuego. Sin embargo, un sistema de manejo de incendios de este tipo requeriría predicciones cuantificadas de la intensidad del fuego y una predicción, no sólo del peligro de incendios, sino de la cantidad de fuegos de diferentes tamaños, con una precisión específica.

Actualmente, no existe pronóstico operacional objetivo a largo plazo de la severidad del fuego. Los pronósticos de incendio y del peligro de incendios a nivel nacional, a escalas semanales o estacionales, son provistos por el Centro Nacional para la Coordinación Interagencial Nacional (NICC por sus siglas en inglés). Éste es el centro nacional de apoyo y el hogar de siete organismos federales, entre ellos la división de extinción de incendios forestales del Servicio Forestal. Los pronósticos y la evaluación se realizan actualmente mediante la consideración de productos estándar para pronósticos estacionales de temperatura y precipitación del Servicio Nacional de Meteorología (ver Brown et ál. 2003) junto con otros indicadores, y el ejercicio cuidadoso del juicio humano. Por consiguiente, el apoyo actual a la toma de decisiones para el manejo de incendios forestales es más bien inadecuado. Aún el apoyo a los pronósticos a largo plazo del peligro de incendios, que requieren predicciones atmosféricas expertas, es, en el mejor de los casos, cualitativo.

Sin embargo, con el progreso continuo del conocimiento y el entendimiento de las fluctuaciones climáticas, varios modelos climáticos numéricos han mostrado su potencial para ofrecer a la comunidad de la ciencia forestal las predicciones requeridas de peligro de incendios, así como pronósticos de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, Roads et ál. (2005) evaluaron los índices de los pronósticos experimentales del Sistema Nacional de Evaluación del Grado de Peligro de Incendio Forestal (NFDRS) a escala semanal y estacional, y utilizó un modelo meteorológico como insumo meteorológico. Demostraron que estos índices podían ser exitosamente pronosticados a escala semanal cuando son evaluados en relación con los índices de validación que se deducen de los modelos de pronóstico de un día. Algunos índices poseen esta capacidad incluso a escala estacional, especialmente en las temporadas de verano en el oeste de los EE.UU. Sin embargo, a pesar de la alta capacidad de predicción de los índices del NFDRS, Roads et ál. (2005) demostraron que solo había una relación débil entre sus índices de validación y el conteo de fuegos o *acres* incendiados que se observaron.

Preisler et ál. (2004, 2007), adoptaron un acercamiento estadístico para reevaluar la relación entre los índices derivados de modelos de la NFDRS y las características del fuego observadas. Adoptaron un modelo probabilístico que utilizó regresión logística no paramétrica con funciones *spline* para evaluar las relaciones entre los índices de fuego y sus probabilidades de incidencia, así como su tamaño. Demostraron que, basándose en los promedios históricos solamente, el modelo probabilístico superó el modelo de persistencia, y los mapas geográficos de probabilidad de incendios forestales estuvieron bastante a la par con los eventos de fuego reales. Este método provee una manera factible de utilizar el resultado de las predicciones meteorológicas de un modelo meteorológico dinámico con un modelo estadístico para predecir la probabilidad de la intensidad de los incendios forestales con precisiones específicas.

En este estudio adoptaremos este concepto de modelo híbrido para examinar la capacidad de anticipación de la severidad de los incendios utilizando los índices de peligro de incendios pronosticados mediante modelos climáticos en Roads et ál. (2007), como insumos al modelo probabilístico sugerido en Preisler et ál. (2007). Las variables de peligro de incendios anticipadas por los modelos meteorológicos, así como los datos sobre la incidencia de fuegos, serán brindados en la próxima sección, seguidos de la descripción del modelo probabilístico estadístico, el resultado de la evaluación y las discusiones.

Datos

Las variables pronosticadas de peligro de incendio

Las variables de peligro de incendio de este estudio fueron adaptadas del trabajo de Roads et ál. (2005), en el que se utilizó un sistema de pronósticos meteorológicos, de global a regional, que fue desarrollado en el Experimental Climate Prediction Center (ECPC, Centro de Predicción Climática Experimental) (Roads et ál. 2003). El sistema de modelización consiste de un modelo espectral global (GSM, por sus siglas en inglés) y un modelo espectral regional (RSM, por sus siglas en inglés). El RSM, desarrollado inicialmente en los Centros Nacionales de Predicciones Medioambientales (NCEP, por sus siglas en inglés) (Juang y Kanamitsu 1994; ver también Juang et ál. 1997), es una extensión regional del GSM (Kalnay et al 1996). El RSM provee, específicamente, una transición casi perfecta del GSM a la región de interés con mayor resolución (Chen et ál. 1999) y, por consiguiente, evita un problema común de los modelos regionales cuando se usan físicas incompatibles entre el modelo global y el modelo regional anidado (Chen 2001). El GSM es una versión congelada del modelo global operacional de la NCEP. Las descripciones del GSM y el RSM, así como el montaje utilizado en este estudio, se pueden encontrar en Roads et ál. (2003).

El modelo utilizó análisis operacionales 00 UTC de Asimilación de Datos Global de la NCEP como condiciones iniciales. El período de evaluación de los pronósticos se inició el 1 de enero de 1998 y terminó el 31 de diciembre de 2003, con un pronóstico de 16 semanas emitido cada sábado e inicializado por el análisis 00UTC. A través de cada integración persistieron la temperatura inicial de la superficie del mar y las anomalías del hielo marítimo. Los cuatro resultados diarios del GSM se utilizaron posteriormente como condición límite inicial y lateral para el RSM. Horizontalmente, los espacios de la cuadrícula del RSM representaban 60 km. Las variables climatológicas de la superficie pronosticadas, entre ellas la temperatura, humedad relativa a dos metros (R2M), la velocidad del viento del modelo, y el contenido de humedad de los diez centímetros más superficiales del terreno, junto con la precipitación, los combustibles y el declive, fueron el insumo para la computación de los índices NFDRS (Burgan 1988) y el índice meteorológico de peligro de Fosberg (FFWI; Fosberg 1978; Fujioka y Tsou 1985). La diferencia principal de nuestro cálculo del NFDRS y el cálculo estándar es el uso del resultado de las predicciones del modelo meteorológico, en lugar de las observaciones de la estación meteorológica. No todos los índices de peligro de incendio nos son útiles en este estudio. Preisler et ál. (2007) concluyeron que solo los índices del FFWI, R2M, y dos índices del NFDRS, esto es, el componente de la intensidad de reacción (ER, por sus siglas en inglés) y el componente de la sequía de Keetch-Byram (KB, por sus siglas en inglés) eran importantes para el modelo estadístico que se describirá más

adelante. El añadir otros índices no fue particularmente efectivo por lo que, a través de este estudio, utilizamos estas cuatro variables como insumo del peligro de incendio para el modelo estadístico.

Para evaluar inicialmente la capacidad del modelo meteorológico de producir estos índices de peligro de incendios, se produjo un conjunto de índices deducidos del modelo meteorológico GSM/RSM de 1 día conocidos como “índices de validación”. De manera similar a Roads et al (2005), estos índices promedio mensuales son utilizados como sustitutos de los valores “observados”, ya que los pronósticos de 1-día han resultado muy eficientes al compararlos con las observaciones. Los lectores interesados pueden referirse a Roads et ál. (2005) para obtener descripciones detalladas así como una comparación de estos índices.

Todos los pronósticos de 16 semanas se organizaron en promedios mensuales conforme a su respectivo mes en el calendario. Por ejemplo, los resultados de los pronósticos de 16 semanas que comenzaron el 27 de junio de 1998, se agruparon y se promediaron en pronósticos mensuales con desfase de 0 a Julio de 1998, desfase de 5 a agosto de 1998, y desfase de 9 a septiembre de 1998. Por consiguiente, por cada mes objetivo existen pronósticos individuales mensuales con lapsos de antelación de 0 a 11 semanas. Estos pronósticos mensuales fueron promediados más adelante en pronósticos estacionales con 3 posibles desfases, esto es, 0, 1 y dos semanas. Estos índices pronosticados a largo plazo sí poseen la capacidad de predicción, como se observó en los mapas de correlación temporal (fig. 1) para los pronósticos estacionales con una semana de desfase, cuando se comparan con los “observados”. Tal como se describe en Roads (2005), estos índices “observados” fueron en realidad calculados de una serie de pronósticos de 1 día del modelo. Ya que se encontró que los pronósticos de 1 día eran muy eficientes cuando se compararon con las observaciones, estos índices de validación se utilizaron como sustitutos para las “observaciones”. Esta evaluación se realizó a lo largo de toda la temporada de incendios, de mayo a octubre, de cada año. Por lo tanto, se utilizó un total de 36 pronósticos independientes. Se puede observar que los 3 índices y el R2M son muy eficientes a una escala estacional en la región oeste de los EE.UU. con la correlación más alta de FFWI sobre la Gran Cuenca y el área de California. Sin embargo, la eficiencia en los pronósticos de estas variables está algo deteriorada en la frontera norte del noroeste de los EE.UU. y la porción oriental del suroeste de los EE.UU. Dado que la precipitación constituye la variable meteorológica más difícil de predecir (ej. Chen et ál.1993), no es sorprendente ver que la predicción de peligro de incendio del modelo es efectiva en las regiones climatológicamente secas.

Figura 1. —Correlaciones estacionales para los índices de fuegos (ER, FFWI y KB) y los 2 metros de humedad relativa (R2M). Se usan los pronósticos observados con 1 semana de desfase de mayo hasta octubre, desde 1998 a 2003. Los puntos de la cuadrícula con coeficientes de correlación mayores de 0.32 pasaron la prueba -t de Student con 95% de nivel de confianza.

Datos sobre la incidencia de fuegos

Este trabajo se basó en conjuntos de datos históricos de los fuegos en la parte occidental de los EE.UU.. Westerling et ál. (2003) compilaron un conjunto de datos en una cuadrícula de un grado de latitud/longitud (317 celdas), de fuegos iniciados y acres quemados mensualmente, de aproximadamente 300,000 fuegos reportados por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EEUU, el Buró de Administración de Terrenos y Asuntos Indígenas del Departamento de lo Interior de EEUU, y el Servicio Nacional de Parques entre el 1980 y el 2003. No obstante, solo

usamos los datos de enero de 1998 a diciembre de 2003 para ajustarnos al período de los índices de peligro de incendios derivados de modelos meteorológicos. Como en Preisler et ál. (2007), los fuegos iniciados y acres quemados han sido incorporados a un grupo de datos de eventos de incendios graves (área quemada > 400 ha = 1000 acres). A través de este estudio, todas las variables de peligro de incendio derivadas de modelos (fig. 1) se interpolaron a las mismas celdas de un grado de latitud/longitud de los datos del incendio.

Métodos Estadísticos

La adopción de un acercamiento de regresión logística semiparamétrico (Hastie et ál. 2001, Preisler y Westerling 2007) ha permitido desarrollar un modelo de probabilidad de fuego mediante la utilización de los datos sobre la incidencia histórica mensual del fuego como variable dependiente y los índices de peligro de incendio derivados del resultado del modelo meteorológico como las variables explicativas o (independientes). El modelo de regresión calcula dos probabilidades de peligro de incendios: la probabilidad de incidencia del fuego y la probabilidad condicional de un evento de fuego grande. La probabilidad de incidencia de fuego se definió como la probabilidad de observar al menos un incendio, de cualquier tamaño, que tenga lugar en la celda de un grado durante un mes dado del año. La probabilidad de un incendio de grandes proporciones se definió, a su vez, como la probabilidad de incidencia de una zona quemada mayor a 400 ha. (≈ 1000 acres) en el caso de al menos un fuego en la celda de un grado durante un mes específico del año. El resultado de las dos probabilidades anteriores se utilizó como medida de peligro para un incendio de grandes proporciones. El límite de 400 hectáreas para los incendios graves, a pesar de que es arbitrario, se alinea con los fuegos de la clase F. Los mismos métodos se pueden utilizar para calcular el espectro de probabilidad de la zona quemada, si las variables históricas dependientes, así como las explicativas, fueran suficientes.

Las variables explicativas utilizadas en el modelo de regresión fueron los índices de peligro de incendio modelados descritos anteriormente, sumados a una variable puramente temporal (mes en año) y a una variable vectorial geoespacial (latitud y longitud de la celda de cuadrícula de un grado). La variable temporal (mes) se incluyó en el modelo para representar los patrones anuales cíclicos de la incidencia de fuegos y los eventos de fuego de grandes proporciones que puedan haber sido captados de manera inapropiada por los índices. El vector geo-espacial (latitud, longitud) se incluyó en la regresión como sustituto de las variables con patrones espaciales (p. ej., tipo de vegetación, elevación o actividades humanas) que no cambian con el tiempo. Los lectores interesados pueden referirse a, por ejemplo,

Brillinger et ál. (2003), Preisler et ál. (2004), y Preisler et ál. (2007) para detalles adicionales.

En este estudio, se utilizaron dos modelos probabilísticos tomados de Preisler et ál. (2007). El primero es el modelo histórico - climatológico- (o modelo H). No se han utilizado variables de peligro de incendio en este modelo, excepto mes-en-año y localización (latitud, longitud). Con este modelo, cada cuadrícula tiene una probabilidad diferente para cada mes del año, pero las probabilidades no varían de año en año. El modelo H es, de hecho, una función temporal y espacial suavizada de la frecuencia de los incendios graves observados en cada celda de la cuadrícula. El segundo modelo de probabilidad es el modelo de índices combinados (o modelo C). Las variables explicativas en este modelo fueron localización espacial, mes, y una combinación de cuatro variables de peligro de incendio, a saber: FFWI, ER, KB y R2M. Por consiguiente, alimentando el modelo C con un grupo de variables pronosticadas de peligro de incendios mensuales, se realizará un mapa de la probabilidad de los eventos graves de fuego en el oeste de los EE.UU.

Resultados

Dado que entrenamos el modelo C mediante usando variables de peligro de incendio que validan los pronósticos meteorológicos de 1-día (Preisler et ál. 2007), hubo que tomar algunas precauciones al usar los pronósticos meteorológicos mensuales descritos anteriormente como insumo del modelo C. Los modelos meteorológicos numéricos nunca son perfectos y son propensos a tener defectos, como una tendencia al sesgo cuando están integrados por un periodo largo de tiempo. El modelo meteorológico que usamos en este estudio no es la excepción. Tenía un sesgo seco, de manera tal que, según avanzaba la integración, se fue reduciendo la humedad del terreno y la precipitación (Roads y Chen 2000; Chen y Roads 2005). Para contrarrestar parcialmente este sesgo y quizás otros defectos no tan obvios, primero elaboramos el promedio mensual de cada variable de peligro de incendio pronosticado en cada desfase correspondiente. Las diferencias de estas climatologías promedio mensuales de los 12 pronósticos desfasados y el correspondiente promedio mensual de las variables de validación de 1 día fueron removidas posteriormente del pronóstico original de las variables de peligro de incendio antes de ser incorporadas al modelo C.

A pesar de que el período de evaluación abarcó solo 6 años, lo que significa que solo había seis mapas mensuales para computar la climatología mensual correspondiente, esta corrección resultó remover eficazmente el sesgo seco ya conocido del insumo meteorológico según sugiere la bondad del ajuste de los diagramas de confiabilidad (fig. 2). Estos se realizaron mediante la agrupación de

todas las celdas de los pronósticos mensuales con probabilidades pronosticadas similares dentro de un cierto intervalo para cada pronóstico desfasado, y la fracción del número de celdas observadas con fuego se computó para la totalidad del espacio y el tiempo. Si un pronóstico era perfecto, la fracción observada de celdas con fuego a la cantidad total de celdas sería idéntica a la probabilidad de fuegos pronosticada y por consiguiente, habría un punto en la línea diagonal. La amplitud de las percentilas 95 de la distribución binomial con la probabilidad respectiva y el tamaño de muestra se representaron con dos líneas curvas entrecortadas. Las amplitudes mayores a una probabilidad alta fueron resultado del número menor de celdas. Como se puede observar, los puntos dispersos para el modelo C sin corregir están mayormente bajo la línea diagonal, e indican una sobrepredicción de peligro de incendio, lo que, se presume, es una respuesta a los índices de peligro de incendios de un ambiente seco. Esta sobrepredicción del peligro de incendios no es solo cierta para los casos de probabilidad extrema; la sobrepredicción de incendios se vuelve severa incluso a una probabilidad menor en desfases de pronóstico mayores. El modelo C con el sesgo corregido, por otra parte, removió efectivamente la mayor parte de la sobrepredicción, especialmente a una probabilidad de incendio menor.

Figura 2. —Diagramas de confiabilidad para el modelo C de probabilidad pronosticada con los respectivos desfases. Los paneles a la izquierda son los índices con sesgos corregidos y los de la derecha son los que utilizan resultados sin corregir. El diagrama de confiabilidad muestra la fracción observada de eventos graves de fuego y la probabilidad pronosticada del modelo C. Las dos curvas entrecortadas marcan las percentilas 95 para la distribución binomial con el tamaño respectivo (número de celdas) y la probabilidad.

Para comparar mejor la bondad del ajuste, computamos χ^2 para los modelos C con sesgos corregidos y sin corregir, junto con el del modelo H (fig. 3). Las χ^2 más pequeñas indican un mejor ajuste a la línea diagonal en el diagrama de confiabilidad; los χ^2 más grandes demuestran ya sea una peor predicción o casos en que las distribuciones espaciales y temporales de las celdas con fuego estaban fuera de lo observado, nuevamente, se presume que a causa de un pronóstico meteorológico de sesgo seco. Para los pronósticos con desfases cortos, hay pequeñas diferencias entre los modelos C corregidos y sin corregir. Ambos modelos predijeron fuegos con una distribución estadística igual a la observada y fueron mejores que el modelo H (la línea delgada sólida constante) con un 95% de confiabilidad. Sin embargo, con desfases mayores, con una χ^2 en aumento, el modelo C sin corregir, aparentemente, se diferenciaba estadísticamente del corregido, o, lo que es más importante, de la

observación.

Figura 3. χ^2 de las celdas de fuego observadas y pronosticadas como función de desfases en los pronósticos. La línea sólida delgada representa el modelo Histórico, la línea de punto entrecortada y las líneas continuas gruesas se utilizan para los modelos C corregidos y sin corregir. Los niveles de confiabilidad de 95% o más están sombreados.

Aunque casi podemos llegar a la conclusión preliminar de que debemos utilizar el modelo C corregido basándonos en el diagrama de confiabilidad y su χ^2 , hasta ahora, el análisis solo ha demostrado que la severidad de fuego pronosticada posea

propiedades estadísticas similares a aquellas de los eventos de fuego observados.

Figura 4. —Suma del total (arriba) trimestral (estacional) y las series de tiempo anómalas (abajo). Las sumas de los tres meses observados están representadas por líneas rojas gruesas, mientras que los números de incendios pronosticados están representados por las línea finas sólidas, con puntos y entrecortadas, para los pronósticos con 0, 1 y 2 semanas de desfase con correlaciones temporales respectivas de (g.d.l. 70) de 0.46, 0.61, y 0.52. Los pronósticos promedio del conjunto están en líneas verdes con una correlación de 0.64.

Revelaron poca acerca de cuán eficaces eran. Para examinar la eficacia de la predicción, construimos algunas series cronológicas del número pronosticado de fuegos y las exhibimos con las observaciones (fig. 4). El número pronosticado de fuegos se realizó tomando la suma del área de la probabilidad de cada mapa pronosticado producido por el modelo C. El número de fuegos observados consistió simplemente de la suma de las celdas con fuego. El panel superior muestra el número total de fuegos para la totalidad del dominio evaluado desde enero de 1998 hasta diciembre de 2003. El panel inferior representa las series cronológicas anómalas para el mismo período con sus respectivas climatologías removidas. Cada suma estacional se realizó tomando la suma de 3 pronósticos mensuales consecutivos del mismo pronóstico, y se trazó en el centro de los tres meses. Tres posibles series cronológicas de pronósticos se podían hacer con desfases de pronóstico de 0, 1 y 2 semanas. Ya

que estos tres conjuntos de pronósticos se formularon con condiciones iniciales de 1 ó 2 semanas de diferencia, prácticamente formaron un pronóstico “de hombre pobre” de 3 miembros, y el promedio del conjunto se representó con la curva verde. Como muestra el panel superior, la observación revela ciclos anuales intensos para el número total de fuegos, con un pico alrededor de julio. También hubo una tendencia al incremento en los picos del verano. Los tres conjuntos de pronósticos, incluido el conjunto promedio siguieron bastante bien, en términos generales, el ciclo anual observado. Incluso reprodujeron la leve tendencia ascendente, como se observó. Sin embargo, la verdadera capacidad de pronosticar de este modelo híbrido solo se puede corroborar con el diagrama anómalo del panel inferior. Excepto por la alta anomalía positiva del verano del 2000, los tres pronósticos y el promedio del conjunto predijeron los picos y los valles del verano con correlaciones temporales que excedían el 95% de confiabilidad de las pruebas -t de Student (70 g.d.l.). Hubo incluso un pronóstico que en cierta forma captó la anomalía positiva extrema en el verano del 2000. Estos son pronósticos precisos y son obviamente mejores que los pronósticos hechos con climatología (modelo H) que hubieran resultado en un cero constante en el panel inferior.

Resumen y Discusión

Un método estadístico de calcular las probabilidades de incendios forestales de grandes proporciones se aplicó a los pronósticos de los índices de peligro de incendios mensuales a estacionales producidos por el modelo de predicción climática numérica de la ECPC. Específicamente, siguiendo a Preisler et ál. (2007), los índices de peligro de incendios pronosticados, FFWI, KBDI, ER, y R2M, se utilizaron como variables de insumo para el modelo probabilístico estadístico para estimar las probabilidades mensuales de los eventos de fuegos graves en la parte occidental de los EE.UU. Las probabilidades pronosticadas entonces se compararon con las frecuencias observadas de grandes eventos para poder evaluar la eficacia de este sistema de modelización híbrido dinámico-estadístico. El período de evaluación fue desde enero de 1988 hasta diciembre de 2003. A pesar del uso persistente de la temperatura de la superficie del mar y de las anomalías del hielo marítimo para el modelo del clima, es motivador ver que la predicción de los índices de peligro de incendio del modelo climático fue bastante útil en la generación de la intensidad de incendios forestales proyectada.

De este estudio preliminar, encontramos que era necesario prestar especial atención a los datos de los pronósticos para contrarrestar la tendencia al sesgo del modelo de predicción climática. Esto se hizo simplemente removiendo las diferencias entre el pronóstico y las climatologías de validación de los índices de peligro de

fuego pronosticados antes de alimentarlas al modelo de probabilidad. El proceso fue sencillo, pero se corrigió eficazmente el aparente sesgo seco y por lo tanto el sobrepronóstico de intensidad de fuego. Esto es especialmente cierto cuando se compara con los eventos de fuego observados. Las características estadísticas resultantes de la probabilidad de incendio pronosticada no solo se mejoraron en el conjunto de sesgo sin corregir, sino que también fueron superiores a usar la climatología de fuegos solamente. Por lo tanto, la variabilidad interanual de la frecuencia de incendios pronosticada se predijo bastante bien. Además, la predicción pareció ser particularmente útil si se toma en cuenta el pronóstico promedio conjunto.

Mientras que el pronóstico de intensidad de fuego sobre el oeste de los EE.UU. puede servir a los administradores de incendios para cuantificar los daños ocasionados por el fuego, una aplicación más práctica podría ser la capacidad para pronosticar la frecuencia de incendio mensual o estacional en una región, de manera probabilística. Un ejemplo de esto sería un pronóstico de intensidad de fuego en la zona jurídica de un centro de operaciones regionales del Centro Geográfico de Coordinación Aérea (GACC por sus siglas en inglés; <http://gacc.nifc.gov/>). Sin embargo, evaluar la eficiencia de un pronóstico en un área tan pequeña no es una tarea fácil si se utilizan los datos de los pronósticos que tenemos disponibles en la actualidad. Ya que en este estudio solo tenemos seis años de pronósticos y de análisis de validación, tuvimos que compensar la escasez de puntos temporales con la abundancia de puntos espaciales para que las estadísticas tuvieran sentido. Los estudios futuros deben abordar el uso de períodos más largos de datos de pronóstico climático (p.ej., Roads et ál. 2007) y de datos del fuego (p. ej., Westerling et ál. 2003) para examinar la capacidad de pronóstico de la severidad del fuego. Al utilizar dichos conjuntos de datos, no solo podríamos enfocar nuestro análisis en una región GACC más pequeña, sino que no tendríamos que limitarnos a dos tipos de fuego solamente, es decir, ausencia de fuego o fuegos grandes, como en el análisis de este estudio. En su lugar, se podría producir fácilmente un espectro de probabilidades (tamaños del fuego).

Los modelos de probabilidad, como el aquí descrito, no solo son prácticos para producir mapas de peligro de incendios; también son útiles para evaluar la capacidad de cada peligro de incendio al calcular o pronosticar la frecuencia de los pronósticos de los eventos de incendios forestales. Sin embargo, probablemente los índices del NFDRS se diseñaron originalmente para apoyar las tácticas de extinción de incendios a diario. Algunos de los índices, como el SC, el BI y el IC, son sensibles a las variaciones a corto plazo de los componentes atmosféricos, especialmente, la velocidad del viento. Estos índices, por lo tanto, pueden perder sus características de alta frecuencia cuando se toma un promedio a largo plazo (p. ej., mensual), como fue el caso de este estudio. Por lo tanto, en el futuro se necesita una reevaluación

extensiva de los índices que no fueron incluidos en Preysler et al (2007). Nosotros nos enfocaremos, en particular, en la mejor manera de acumular la información provista diariamente en estos índices sensibles al fuego en variables estacionales o mensuales.

Referencias

- Brillinger, D. R.; Preisler, H. K.; Benoit, J. W. 2003. **Risk assessment: a forest fire example.** In D. R. Goldstein Editors. Science and Statistics, Institute of Mathematical Statistics Lecture Notes. Monograph Series; 177-196.
- Brown, T. J.; Barnston, A.; Roads, J. O.; Martin, R.; Wolter, K. E.; 2003. **2003 Seasonal Consensus Climate Forecasts for Wildland Fire Management.** Experimental Long-Lead Forecasts Bulletin 12 (1); 6 p.
- Burgan, R. E. 1988. **1988 Revisions to the 1978 National Fire-Danger Rating Sandstem.** USDA Forest Service, Southeastern Forest Experiment Station Research paper SE-273; 39 p. (Asheville, NC).
- Chen, S. -C.; Roads, J. O.; Alpert, J. 1993. **Variability and predictability in an empirical and forced global model.** J. Atmos. Sci. 49; 443-463.
- Chen, S. -C.; Roads, J. O.; Juang, H. -M. H.; Kanamitsu, M. 1999. **Global to regional simulations of California wintertime precipitation.** J. Geophys. Res.-Atmos. 104(D24); 31517-31532.
- Chen, S. -C. 2001. **Model mismatch between global and regional simulation.** Geophys. Res. Lett. 29 (5); 4.1 – 4.4.
- Fosberg, M. A. 1978. **Weather in wildland fire management: the fire weather index.** Proceedings of the Conference on Sierra Nevada Meteorology, South Lake Tahoe, NV. p. 1-4.
- Fujioka, F.M.; Tsou, T. -H. 1985. **Weather in wildland fire management: the fire weather index.** Proceedings of the Conference on Sierra Nevada Meteorology, South Lake Tahoe, NV. p. 1-4.
- González-Cabán, A. 2005. **Economic impact of wildland fires.** Paper presented at the Southern California Academy of Sciences annual meeting, Loyola Marymount University, Los Angeles, CA, March 21, 2005.
- Hastie, T. J.; Tibshirani, R.; Friedman, J. 2001. **The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction.** Springer, New York. 533 p.
- Juang, H. -M. H.; Kanamitsu, M. 1994. **The NMC nested regional spectral model.** Mon. Wea. Rev. 122; 3-26.
- Juang, H. -M. H.; Hong, S.; Kanamitsu, M. 1997. **The NMC regional spectral model. An update.** Bull. Amer. Meteor. Soc. 78; 2125-2143.
- Kalnay, E. M. and coauthors 1996. **The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis project.** Bull. Amer. Meteor. Soc. 77; 437-471.
- NWCG Fire Weather Working Team; **National fire danger rating sandstem weather station standards.** Publication of the national Wildfire Coordinating Group, PMS 426-3; 30p. (http://www.fs.fed.us/raws/standards/NFDRS_final_revmaand05.pdf)
- Preisler, H. K.; Brillinger, D. R.; Burgan, R. E.; Benoit, J. W. 2004. **Probability based models for estimating wildfire risk.** International Journal of Wildland Fire 13; 133-142.
- Preisler, H. K.; Westerling, A. L. 2007. **Statistical model for forecasting monthly large wildfire events in Western United States.** Journal of Applied Meteorology and Climatology 46(7); 1020-1030.
- Roads, J. O.; Chen, S. -C.; Fujioka, F.; Kanamitsu, M.; Juang, H. -M. H. 1995. **Global to regional fire weather forecasts.** International Forest Fire News [BAHC] 17; 33-37.

- Roads, J. O.; Chen, S. -C.; Kanamitsu, M. 2003. **US regional climate simulations and seasonal forecasts.** J. Geophys. Res. -Atmos. 108 (D16); 8606; doi:10.1029/2002JD002232.
- Roads, J. O.; Fujioka, F.; Chen, S. -C.; Burgan, R. E. 2005. **Seasonal fire danger forecasts for the USA.** International Journal of Wildland Fire 14; 1-18.
- Roads, J. O.; Tripp P.; Juang H.; Wang J.; Fujioka F.; and Chen S. C. [In press]. **NCEP/ECPC Monthland to Seasonal US Fire Danger Forecasts.** International Journal of Wildland Fire.
- Shafran, A. 2006. **Risk externalities and the problem of wildfire risk.** J. Econom. Literature 44; 1-33.
- Westerling, A. L.; Gershunov, A.; Caandan, D. R. 2003. **Statistical Forecasts of the 2003 Western Wildfire Season Using Canonical Correlation Analysis.** Experimental Long-Lead Forecast Bulletin 12(1,2).

Los Incendios Forestales Recurrentes ¿Afectan la Demanda de Compradores de Vivienda en Áreas de Alto Riesgo? Un Análisis Hedónico de los Efectos a Corto y a Largo Plazo de los Incendios Forestales Recurrentes en los Precios de las Viviendas en el Sur de California¹

Julie M. Mueller², John B. Loomis³, y Armando González-Cabán⁴

Resumen

A diferencia de la mayoría de los estudios hedónicos, que analizan los efectos de un sólo evento, este trabajo analiza los efectos de fuegos forestales que ocurrieron con varios años de diferencia entre ellos, en una pequeña área geográfica. Encontramos que la recurrencia de los incendios forestales hace que disminuya el costo de las viviendas ubicadas cerca de los incendios. Pusimos a prueba y rechazamos la hipótesis de que la disminución en el precio de la vivienda después del primer incendio es igual a la disminución del precio de la vivienda después del segundo incendio. Después del primer incendio, el precio disminuye por un 10%, mientras que luego del segundo incendio, el precio de la vivienda disminuye por casi 23%, una diferencia estadística significativa.

Palabras clave: Efecto temporal de los incendios, impacto económico de los incendios forestales, modelos hedónicos de propiedad, riesgo de incendio, valoración de intangibles.

Introducción

La incidencia de desastres naturales aumenta la percepción de riesgo que tiene el público respecto a dichos eventos. Los medios de comunicaciones locales y

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril - 2 de mayo, 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Catedrática Auxiliar, Galen University, P.O. Box 177, San Ignacio, Distrito Cayo, Belice, Centroamérica, email: JMueller@GalenU.edu.bz

³ Catedrático, Departamento de Economía de Agricultura y Recursos, Colorado State University, Clark B-320, Fort Collins, CO, 80523, email: John.Loomis@colostate.edu

⁴ Economista Investigador, Departamento de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Laboratorio de Incendios Forestales; email: agonzalezcaban@fs.fed.us

nacionales cubren a fondo los terremotos, inundaciones, incendios y huracanes; los residentes de las comunidades cercanas se sienten expuestos a los riesgos de los desastres naturales después de que ocurren. La política pública con respecto a los desastres naturales debe tomar en consideración la percepción de riesgo del público. Si los compradores y vendedores reducen el valor de las viviendas en áreas de alto riesgo, dicha disminución en el valor se mostrará en una disminución en el valor de las viviendas. Al intervenir y dar ayuda financiera a las víctimas de los desastres naturales, el gobierno puede dar un subsidio a las personas que viven en áreas de alto riesgo.

La falta de información sobre el riesgo de desastres naturales también puede contribuir a que el público tenga una percepción errónea de la probabilidad de pérdidas a causa de los desastres naturales. Si un comprador tiene una visión equivocada del perfil de riesgo asociado con la compra de la casa, entonces hay un mal funcionamiento en el mercado de viviendas. Debido a que la información de los riesgos de los desastres naturales tiene buenas características públicas, pudiera ser necesaria la intervención del gobierno para proporcionar información y prevenir un mal funcionamiento del mercado.

Cada año los incendios forestales causan mil millones de dólares en pérdidas en Estados Unidos. Nuestra área de estudio es el sur de California, una región densamente poblada, propensa a fuegos debido a décadas de supresión de incendios. En 2003, el estado de California registró su peor temporada de incendios. Del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2003, hubo 14 incendios en 5 distritos del sur de California. Se perdieron veinticuatro vidas. Se quemaron más de 750,000 acres, y 3,710 viviendas fueron destruidas, causando una pérdida de miles de millones de dólares en seguros y costándole al gobierno federal, estatal y local millones de dólares en ayuda de emergencia. Es importante que los cuerpos locales, estatales y federales que formulan la política pública tengan medidas precisas de los daños causados por los incendios para que las políticas públicas puedan lidiar correctamente con problemas referentes a los fuegos, como la prevención y la ayuda en los desastres. A pesar de que los efectos inmediatos de los incendios forestales se han estimado en estudios previos, los efectos a largo plazo también deberían ser considerados a la hora de tomar decisiones. En este estudio, utilizamos el método hedónico de propiedad para analizar los efectos a corto y a largo plazo de la recurrencia de incendios en el valor de las viviendas en el distrito de Los Ángeles, para así entender cómo el público reacciona a los incendios. Particularmente, si un primer incendio tienen un efecto diferente a un segundo incendio en la demanda de vivienda y, por consiguiente, en el valor de las viviendas en áreas de alto riesgo.

El método hedónico de propiedad se usa comúnmente en la modelización de mercados de viviendas y con frecuencia se emplea para medir el valor de las

amenidades o no amenidades ambientales próximas a un hogar, entre ellas: espacio abierto (Irwin 2002), calidad de agua (Leggett y Bockstael 2000), transporte de desperdicios nucleares (Gawande y Jenkins-Smith 2001) y mantener un nivel adecuado de agua en los lagos (Loomis y Feldman 2003).⁵ Además, varios estudios utilizan modelos de propiedad hedónicos para estimar la voluntad marginal para pagar por reducir los riesgos de los desastres naturales. Por ejemplo, Bin y Polasky (2004) emplearon un modelo hedónico para calcular el efecto de las inundaciones en el valor de las viviendas. Encontraron que las casas localizadas en áreas inundables tienen un valor menor que las casas fuera de áreas inundables. Además, encontraron que la diferencia en precio aumenta luego de que un huracán causara inundaciones severas. Bin y Polasky concluyen que las inundaciones recientes provocan un incremento el riesgo percibido debido a inundaciones. Los resultados del estudio de Bin y Polasky indican que luego de un desastre natural, el incremento en la percepción de riesgo provoca una disminución en el valor de las viviendas localizadas en áreas de alto riesgo.

Estudios previos han encontrado que los compradores de viviendas tienen información poco precisa con respecto al riesgo de desastres naturales. Luego de no encontrar evidencia significativa de riesgo de inundaciones en un estudio hedónico, Chivers y Flores (2002) hicieron encuestas a dueños de viviendas en un área de alto riesgo de inundaciones para investigar la posibilidad de un mal funcionamiento del mercado a causa de la falta de información. Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de los compradores de viviendas no se enteraron del riesgo de inundaciones hasta después que hicieron la oferta. En otro estudio hedónico, Beron et ál. (1997) se encontró que el precio hedónico de una reducción en el riesgo de terremoto disminuyó luego de un terremoto fuerte al norte de California. Beron et ál. atribuyen la sorprendente disminución en el precio hedónico de riesgo a una percepción errónea del riesgo de terremoto. Ellos sostienen que los compradores de viviendas sobreestimaron el riesgo de daños a causa de terremotos y después de experimentar un terremoto, reevaluaron sus perfiles de riesgo. A pesar de que el precio hedónico del riesgo de terremoto se redujo después de un terremoto, el estudio de Beron et ál. indica un mal funcionamiento del mercado debido a información imperfecta. Por consiguiente, investigaciones previas sobre desastres naturales indican que la falta de información sobre desastres naturales puede producir un mal funcionamiento del mercado en el mercado de viviendas.

Investigaciones previas acerca del efecto de los incendios en el precio encuentran un impacto negativo inicial en el precio de las viviendas. En un reciente estudio, Loomis encontró que el precio de las casas en una comunidad no quemada, a

⁵ Véase Boyle and Kiel (2001) para un recuento abarcador de los estudios hedónicos sobre externalidades ambientales.

2 millas de un incendio forestal en Colorado, disminuyó un 15% luego del fuego (Loomis 2004). Además, un estudio a cargo de Price Waterhouse Coopers en Nuevo Méjico encontró que el precio de las viviendas en Los Álamos disminuyó de 3% a 11% luego del incendio de Los Álamos (Pricewaterhouse Coopers 2004). Estos dos estudios sobre incendios indagan sobre lo que le ocurre al precio de las viviendas inmediatamente después de un incendio, pero ninguno analiza el efecto a largo plazo de los incendios. Uno de los objetivos de nuestro estudio es llevar a cabo un análisis temporal amplio. Ambos estudios también valoran el efecto de un solo incendio en los precios de las casas. Otro de los objetivos de nuestro estudio es valorar el efecto de la recurrencia de incendios.

Especificación del modelo

Utilizamos el modelo hedónico de propiedad antes propuesto por Rosen (1974). La variable dependiente es el logaritmo del precio real de venta ajustado, utilizando el índice de precios de viviendas para los distritos de Los Ángeles, Riverside y Orange (1983 año base). Una especificación log-lineal permite que el efecto marginal de cada variable independiente pueda variar con el nivel de las variables independientes. De este modo, con nuestra especificación, los efectos marginales de las variables independientes en el precio de una vivienda dependen de las características de la vivienda.

Es necesaria una fecha de venta para cada vivienda para lidiar con los efectos de los incendios forestales en el precio de las viviendas. La fecha de venta registrada no es la fecha en la cual se toma la decisión de compra. Las ofertas por las viviendas se hacen de uno a dos meses antes de la fecha registrada de venta. Puesto que los compradores de viviendas están comprometidos con el precio ofrecido una vez hacen la oferta, el elemento temporal en nuestro modelo se representa con una fecha de decisión definida como 60 días antes de la fecha de venta registrada. Por ejemplo, si la fecha de una venta es el 30 de abril de 1998, la fecha de decisión es el 1 de marzo de 1998.⁶

Las variables independientes de interés son las variables de indicadores de incendios forestales y la razón de cambio en el precio de las viviendas después de cada incendio para las viviendas cercanas que se vendan después del incendio. Se incluyen controles para las características demográficas del vecindario y la estructura de la vivienda. El modelo general es el siguiente:

$$P_{it} = f(E_{it}, S_i, N_i, M_{it})$$

donde P_{it} : Monto de la venta en la fecha de decisión t , con monto de la venta convertido a precios constantes utilizando el índice anual de precios de viviendas

⁶ Nuestro ajuste temporal es similar al utilizado por Loomis y Feldman (2003)

para los distritos de Los Ángeles, Orange y Riverside (1983 año base).

La selección de variables independientes incluidas en la primera etapa de nuestro modelo hedónico de propiedad se basó en investigaciones previas, los datos disponibles y las características de los datos (es decir, las correlaciones). Incluir variables irrelevantes en una regresión OLS tiene como resultado errores estándar grandes en los estimados de los coeficientes, incrementando, por ende, la probabilidad de errores tipo II (no rechazar una hipótesis nula cuando es falsa). Además, incluir varias variables explicativas altamente colineales en una regresión puede resultar en estimados poco confiables de los parámetros. No incluir variables relevantes, sin embargo, podría viciar el estimado de los coeficientes (Taylor 2002). A continuación les presentamos las variables ambientales de interés que decidimos incluir en nuestra especificación empírica:

Después de un incendio: una variable indicadora que es igual a uno si la casa se vendió después y está localizada a 1.75 millas o menos de al menos 1 fuego

Después de dos incendios: una variable indicadora que es igual a uno si la casa se vendió después y está localizada a 1.75 millas o menos de por lo menos 2 fuegos

Días desde el primer incendio: cantidad de días desde el primer incendio, si la casa se vendió después y está localizada a 1.75 millas o menos de por lo menos 1 fuego

Días desde el segundo incendio: cantidad de días desde el segundo incendio, si la casa se vendió después y está localizada a 1.75 millas o menos de por lo menos 2 fuegos

Nuestra especificación empírica es la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Log (Monto Real de la Venta)} = & \beta_0 + \beta_1 * (\text{Después de un Incendio}) + \beta_2 * (\text{Después de Dos Incendios}) + \beta_3 * \\ & (\text{Días desde el Primer Incendio}) + \beta_4 * (\text{Días desde el Segundo Incendio}) + \beta_5 * \\ & (\text{Pies Cuadrados}) + \\ & \beta_6 * (\% \text{ Sin diploma de Secundaria}) + \beta_7 * (\text{Valor Medio del Ingreso Familiar}) \\ & + \beta_8 * (\text{Distancia a Tierras del Servicio Forestal}) + \beta_9 * (\text{Tasa de Desempleo}) + \\ & \beta_{10} * (\text{Elevación}) \end{aligned} \quad (1)$$

Queremos analizar los efectos tanto a corto como a largo plazo de los incendios en el precio de las viviendas. Las variables Después de un Incendio y Después de dos Incendios miden el efecto inicial del primer y segundo incendio en el valor de las viviendas, pero las variables Después del Incendio no miden los efectos a largo plazo en el valor de las viviendas. Incluir las variables de Días desde el Primer Incendio y Días desde el segundo permite que los precios de las casas cambien después del impacto inicial y también permite que la tasa de variación en precios de las viviendas

sea distinta después del primer y del segundo incendio. La distancia a tierras del Servicio Forestal representa la distancia a un espacio abierto a un terreno boscoso. La elevación del lote de una vivienda sirve como sustituto para el tipo de vegetación (las elevaciones altas tienen mayor vegetación inflamable). Las viviendas localizadas en elevaciones altas y cerca de bosques tienen un mayor riesgo de incendiarse. La distancia del centro de Los Ángeles se incluye en el modelo porque Los Ángeles es el centro de mayor de empleo en el área y las personas se trasladan a Los Ángeles para trabajar.

Había disponibles varias medidas de características de las viviendas. Por lo general, los pies cuadrados son el enfoque empleado con más frecuencia para controlar la estructura de la vivienda y, por consiguiente, fue la característica estructural que decidimos incluir. Las características del vecindario que comúnmente se incluyen en los modelos hedónicos son la calidad del distrito escolar y el ingreso familiar (Taylor 2002). Nuestros datos no cuentan con una medida directa de la calidad del distrito escolar, por lo cual se usó el porcentaje de personas sin diploma de cuarto año de escuela secundaria en una comunidad particular. Los vecindarios con un porcentaje alto de personas educadas por lo general tienen mejores escuelas. También se incluye el valor medio del ingreso familiar como representativo de cuán deseable es un vecindario. La tasa de desempleo de California se incluye en nuestro modelo para controlar las fluctuaciones que pudieran cambiar la demanda por viviendas.

Datos y metodología de muestreo

Varios conjuntos de información obtenidos de diversas fuentes se unieron para formar una base de datos que cuenta con la siguiente información: la fecha de venta del lote, la cantidad de la venta, localización, características demográficas, distancia a incendios y distancia a centros de empleo. Cada lote residencial es una residencia unifamiliar localizada a 1.75 millas o menos de un incendio. Todos los lotes se vendieron al menos una vez entre los años 1989 y 2003.⁷

Hubo sobre 54,000 residencias unifamiliares de las cuales tomar la muestra. Una vez eliminados los valores extremos, se estratificó la muestra según la distancia al incendio y la fecha de venta. Cada incendio se demarcó con una serie de anillos de un cuarto de milla, desde el centro del incendio hasta el último anillo, que está a 1.75 millas del centro del incendio. Se utilizó una meta de 25 casas para cada estrato de distancia y para cada año. Se tomaron muestras al azar de las viviendas cuando había más de 25 hogares para una distancia y una fecha de venta dadas.⁸

⁷ Sólo conocemos la fecha de la venta más reciente.

⁸ No hubo pérdida de viviendas a causa de incendios en nuestra área de fuego.

Figura 1—Mapa del Área del Incendio

Se escogieron para análisis los incendios ocurridos en los años 90 para asegurarnos de tener información suficiente luego de cada siniestro para analizar los efectos a largo plazo. Se seleccionó el distrito de Los Ángeles debido a que sucedieron numerosos incendios dentro del interfaz urbano forestal en el distrito durante los años 90. El área de estudio se compone de cinco incendios y abarca aproximadamente 5.25 millas. Ver la figura 1 para un mapa del área de incendio. Las áreas oscuras son nuestros perímetros de fuego. Las áreas sombreadas en gris representan anillos de 0.25 millas demarcados para cada perímetro de fuego. Las diminutas áreas grises representan lotes residenciales. Los incendios de Sylmar y Polk ocurrieron en un periodo de tres días y a solo pocas millas uno del otro, y para propósito de este análisis se les consideran como un solo incendio (fuego A). El incendio de Sierra ocurrió menos de 60 días después del siniestro de Placerita y a pocas millas de distancia. Para propósitos de este análisis, los incendios de Placerita y Sierra también se contarán como uno sólo (fuego C). El incendio de Towseley se interpretará como uno sólo (fuego B). Los tres incendios son de un tamaño comparable: el fuego A quemó 937 acres, el fuego B 818 acres y el fuego C, 977 acres.

En el área de estudio cada vivienda está localizada a 1.75 millas o menos de al menos uno de los incendios, pero pudo haberse vendido antes del siniestro más próximo. En nuestra muestra, se considera que una casa ha sufrido un incendio forestal si se vende después del mismo y se encuentra a 1.75 millas o menos del incendio. Es decir, la variable Después del primer incendio es igual a uno para el primer incendio después del cual la vivienda se vendió y del cual estaba a 1.75 millas de distancia o menos. Por el contrario, para las viviendas vendidas antes de que sucedieran incendios a 1.75 millas o menos de distancia, la variable Después de un incendio es igual a cero y se trata como grupo de control.

La variable ‘Días desde el primer incendio’ es igual al número de días desde el primer incendio para las viviendas en que ‘Después del primer incendio’ es igual a uno. ‘Después segundo incendio’ es igual a uno para el segundo siniestro para las viviendas que se vendieron después y que se encuentren a 1.75 millas o menos de dos incendios. La variable de ‘Días desde el segundo incendio’ es igual al número de días desde el segundo incendio para las casas con ‘Después del segundo incendio’ igual a uno. Por consiguiente, viviendas vendidas en diferentes fechas y localizadas en diferentes áreas tendrán valores diferentes para las variables de ‘Después del incendio’ y ‘Días desde el incendio’. Algunas viviendas están localizadas cerca de sólo uno de los tres incendios en nuestra área, algunas viviendas están cerca de sólo dos siniestros en nuestra área, y otras cerca de tres. Al permitir que diferentes incendios sean ‘el primero’ para diferentes viviendas, reducimos la probabilidad de sesgo en nuestros estimados por correlaciones espurias con otros eventos.⁹

Los datos sobre los lotes se obtuvieron del distrito de Los Ángeles a través de Nobel Systems.¹⁰ La información muestra la localización geográfica, la fecha de venta, el precio y las características estructurales de los lotes residenciales en el distrito de Los Ángeles. Las variables demográficas se asignaron a cada parcela utilizando software de Geolytics. Decidimos incluir en nuestros modelos el ingreso familiar medio (medido en dólares del 2000) y el porcentaje sin diploma de escuela secundaria. Ambas variables demográficas son sustitutas de la calidad general del vecindario. Incluir características demográficas en el modelo permite controlar las diferencias en precio de las viviendas a consecuencia de variaciones en la calidad del vecindario, permitiendo así una medida más certera de los efectos de los incendios en el precio de las viviendas. Se usó una aplicación de SIG para medir una serie de distancias diferentes para cada lote.¹¹ La información geográfica incluye la ‘Distancia al centro del fuego’ para todos los incendios (en kilómetros) y la ‘Distancia al límite

⁹ Debido al pequeño número de viviendas que experimentan un tercer incendio (sólo 34), no podemos analizar el efecto del tercer incendio.

¹⁰ Queremos agradecer a Shil Niyogi de Nobel Systems por su ayuda y al distrito de Los Ángeles por la información referente a los lotes.

¹¹ Agradecemos mucho a Nate Peterson, nuestro experto de SIG, por su contribución a este proyecto.

de los terrenos del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos'. La información del precio de las casas se deflacta utilizando el índice anual de precios de las viviendas para los distritos de Los Ángeles, Orange y Riverside.¹² Las tasas de desempleo anuales para el estado de California se obtuvieron de la página web del Bureau of Labor Statistics.¹³ También se incluyeron en el modelo las tasas hipotecarias anuales asociadas a la fecha de la decisión del comprador. La tabla 1 muestra el resumen estadístico de las variables incluidas en el modelo empírico final.

Tabla 1—Resumen de estadísticas

Nombre de la variable	# de Observaciones	Mediana	Error estándar
<i>Monto real de la venta (en dólares de 1983)</i>	2520	151,907.10	3,026.06
<i>Log del monto real de la venta</i>	2520	11.85	0.24
<i>Después de un incendio</i>	2520	0.73	0.01
<i>Después de dos incendios</i>	2520	0.50	0.01
<i>Días desde el primer incendio</i>	2520	1,450.00	28.90
<i>Días desde el segundo incendio</i>	2520	693.00	13.81
<i>Pies cuadrados</i>	2520	1,842.00	36.70
<i>% sin diploma de escuela secundaria</i>	2520	21.76	0.43
<i>Ingreso familiar medio (en miles del año 2000)</i>	2520	65.68	1.31
<i>Distancia a tierras del Servicio Forestal (kilómetros)</i>	2520	2.83	0.06
<i>Elevación (metros)</i>	2520	1,426.00	28.40
<i>Tasa de desempleo</i>	2520	6.77	0.13

Resultados

Los resultados de nuestros estimados se pueden apreciar en la tabla 2. El coeficiente de la variable de 'Después de un incendio' es negativo y estadísticamente significativo, lo que indica una baja en los precios de aproximadamente 9.71% después de un incendio. El coeficiente de la variable de 'Después de dos incendios' es también negativo y estadísticamente significativo, lo que indica una baja en los precios de un 22.68% adicional luego del segundo incendio. Los coeficientes de las variables 'Días desde el primer incendio' y 'Días desde el segundo incendio' son estadísticamente significativos, pero tienen diferentes signos.

¹² El índice anual de precios de las viviendas se obtuvo de la página web del Bureau of Labor Statistics (<http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate>) con la identificación de serie CUURA421SAH.

¹³ La página web es <http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate>, con la identificación de serie LAUST06000003.

Tabla 2—Resultados de la Regresión para una regresión OLS con log del precio deflactado de venta como variable dependiente. Los valores absolutos de las estadísticas *-t* se dan en paréntesis, *indica significación a nivel de 5%, **indica significación a nivel de 1%, y los errores reportados son errores estándar robustos.

	Resultados de la Regresión	Mediana de la Variable Independiente
<i>Después de un incendio</i>	-0.09706 (5.53)**	0.73
<i>Después de dos incendios</i>	-0.22681 (11.88)**	0.50
<i>Días desde el primer incendio</i>	-0.00004 (3.70)**	1451.00
<i>Días desde el Segundo incendio</i>	0.00024 (15.36)**	693.00
<i>Pies cuadrados</i>	0.00035 (38.44)**	1,842.00
<i>Ingreso familiar medio</i>	0.000963 (2.78)**	65.68
<i>% sin diploma de secundaria</i>	-0.00435 (7.75)**	21.76
<i>Distancia a tierras del Servicio Forestal</i>	0.00000565 (1.60)	2.83
<i>Elevación (metros)</i>	-0.00025 (5.72)**	1426.00
<i>Tasa de desempleo</i>	-0.02691 (6.82)**	6.77
<i>Constante</i>	11.85281 (128.67)**	
<i>Observaciones</i>	2520	
<i>R-cuadrado</i>	0.64	

El modelo estimado de la Ecuación 1 nos permite calcular los precios marginales implícitos para un primer y segundo incendio. Tenemos una especificación log-lineal, por consiguiente, el precio estimado implícito es una función del coeficiente estimado en la variable de ‘Después de incendio’ y el precio medio de la vivienda. Por lo tanto,

$$\text{Precio Marginal Implícito} = \hat{\beta} \cdot \bar{y} \quad (2)$$

Donde, $\hat{\beta}$ es el coeficiente estimado de la variable de ‘Después de un incendio’ y $\bar{y}$ es el precio medio de venta.

La tabla 3 muestra los efectos marginales y acumulativos de un incendio en el precio común de una vivienda de nuestra muestra. El precio medio a precios constantes para todos los años en nuestra muestra es de \$151,907. Por ende, el efecto marginal del primer incendio a 1.75 millas o menos es una disminución de \$14,744

en el precio de la vivienda. Un segundo incendio a 1.75 millas o menos causará una disminución adicional de \$34,453 en el precio de las viviendas. El efecto acumulativo de dos incendios en el valor de venta de una casa regular es de una reducción de \$49,198. Puesto que los coeficientes de las variables de ‘Después de incendio’ son ambos estadísticamente diferentes de cero, pusimos también a prueba la hipótesis nula de que los coeficientes de las variables de ‘Después de incendio’ son equivalentes. La prueba tuvo un valor P de 0.0001, lo que indica que rechazamos la hipótesis nula de que los coeficientes de las variables ‘Después de incendio’ son equivalentes. Llegamos a la conclusión de que el segundo incendio tiene un efecto inicial diferente al del primero.

Figura 2--Precio de venta pronosticado para una vivienda que sufre dos incendios

Tabla 3—Los efectos marginales y acumulativos del primer y segundo incendio

	Coefficiente estimado	Efecto Marginal	Efecto acumulativo
<i>Un incendio</i>	-0.0971	-\$14,744.59	-\$14,744.59
<i>Dos incendios</i>	-0.2268	-\$34,453.54	-\$49,198.13

Además, los coeficientes de las variables de ‘Días desde incendios’ son

estadísticamente diferentes de cero en nuestra regresión. Sin embargo, tienen diferentes signos. El primer incendio causa una baja inicial, seguida de una disminución en los precios de las viviendas, pero el segundo incendio causa una baja inicial seguida de un aumento en los precios de las viviendas. El periodo de tiempo exacto para que las viviendas se recuperen después de un segundo incendio depende del lapso entre el primer y segundo incendio. Hay que recordar que distintas casas pueden experimentar diferentes combinaciones de fuegos en nuestra área. La figura 2 muestra la trayectoria para una casa de precio promedio a lo largo del tiempo en las tres posibles combinaciones de incendios. Al precio de una vivienda le toma entre 5 a 7 años para restablecerse luego de un segundo incendio. El tiempo de recuperación parece razonable. En unos años se recupera la vegetación natural cerca de una vivienda. Además, si pasan algunos años sin fuegos, la población podría comenzar a olvidarse del riesgo de fuego.

Conclusiones

Un resultado sorprendente de nuestra estimación es que el segundo incendio causa una disminución inicial mayor en el precio de las viviendas que el primer incendio. Una explicación para la diferencia en los impactos es que un sólo incendio puede que no sea un estímulo suficiente para provocar que los dueños de residencias se muden, mientras que un segundo incendio causa que los propietarios más reacios al riesgo se muden a áreas menos propensas a incendios. El dueño de una vivienda puede pensar que el primer incendio será el único incendio cercano por un largo período de tiempo y, por consiguiente, se quedará en un área de alto riesgo después de un incendio. Sin embargo, el precio de las viviendas continúa disminuyendo después del primer incendio debido a la reducción en las amenidades naturales en los alrededores debido a daños causados por incendios. Entonces ocurre un segundo incendio, que causa mayor devastación y una actualización del riesgo de incendio percibido. Debido a que los dueños no esperaban otro incendio por un período largo de tiempo, el segundo incendio causa un golpe inicial más devastador que el primer siniestro. Como resultado del segundo incendio, los propietarios altamente reacios al riesgo podrían ser sustituidos por propietarios menos reacios al riesgo. Al llegar los nuevos propietarios, se comienza a recuperar el precio de las viviendas, lo que explica la recuperación subsiguiente del precio de las casas luego del segundo incendio. En otras palabras, se requiere más de un incendio para inducir una reacción permanente (una mudanza) en los compradores actuales.

Nuestros resultados indican que la demanda de viviendas cercanas a incendios disminuye inmediatamente después de cada siniestro y que la demanda se reduce más después de incendios repetidos. Esto significa que muchos compradores no quieren

vivir en áreas de incendios recurrentes y que quizás los compradores adquieran viviendas en áreas de alto riesgo sin estar plenamente conscientes del riesgo real de incendio. Por ende, quienes formulan la política pública podrían reducir las pérdidas por incendios creando mayor consciencia del riesgo de incendios mediante campañas informativas públicas. Una campaña de este tipo se inició en Colorado, donde se dieron a conocer mapas de riesgo de fuego, incluidas ‘zonas rojas’ designadas como de alto riesgo, en los periódicos locales y, a base de la investigación de Donovan et ál. (2007), parece que ha logrado cambiar el conocimiento que tienen los compradores sobre el riesgo de incendios.

Referencias

- Beron, Kurt J.; Murdoch, James C.; Thayer, Mark A. et. al. 1997. **An analysis of the housing market before and after the loma prieta earthquake.** Land Economics 73 (1):101-113.
- Bin, Okmyung;;Polasky, Stephen. 2004 **Effects of flood hazards on property values: evidence before and after hurricane Floyd.** Land Economics 80 (4):490-500.
- Boyle, Melissa A.; Kiel, Katherine A. 2001. **A survey of house price hedonic studies of the impact of environmental amenities.** Journal of Real Estate Literature 9(2):117-144.
- Chivers, James; Nicholas Flores. 2002. **Market failure in information: the National Flood Insurance Program.** Land Economics 78 (4):515-521.
- Donovan, G.; P. Champ; D. Butry. 2007. **The impact of wildfire risk on housing price: a case study from Colorado springs.** Land Economics 83 (2):217-233.
- Pricewaterhouse Coopers 2001. Federal Emergency Management Agency. **Post-fire residential property value in Los Alamos.**
- Gawande, K.; Jenkins-Smith, H. 2001. **Nuclear waste transport and residential property values: estimating the effects of perceived risks.** Journal of Environmental Economics and Management 42 (2):207-233.
- Irwin, Elena. 2002. The effects of open space on residential property values. Land Economics 78 (4):465-480.
- Leggett, C.; Bockstael, N. 2000. **Evidence of the effects of water quality on residential land prices.** Journal of Environmental Economics and Management 39 (2):121-144.
- Loomis, John B.; Feldman, M. **Estimating the benefits of maintaining adequate lake levels to homeowners using the hedonic property method.** Water Resources Research 39 (9): 1-6.
- Loomis, John B. **Do nearby forest fires cause a reduction in residential property values?** 2004. Journal of Forest Economics 10 (3) :149-157.
- Rosen, S.1974. **Hedonic prices and implicit market: product differentiation in pure competition.** Journal of Political Economy 82:34-55.
- Taylor, Laura. 2002. **The Hedonic method.** In: P. Champ, T. Brown, and K. Boyle editors. A Primer for Non-Market Valuation, AA Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 331-394.

El Costo del Fuego en Australia¹

B.S.W. Ashe², K.J. McAneney² y A.J. Pitman³

Resumen

El fuego, una amenaza constante en Australia, causa aproximadamente 100 muertes y más de 3,000 heridos al año. Una cantidad significativa de recursos se destinan a mitigar esta amenaza. En este estudio, el costo total de los fuegos en Australia en 2005 se estimó en AUD\$12,000 millones, que es un 1.3% del producto interno bruto (PIB). Al dividir este total en sus componentes, encontramos que el 56% se atribuye a “costos de previsión” del fuego, un 29% a “costos de respuesta” al fuego y 15% a “costos como consecuencia” del fuego. Este estimado demuestra que las inversiones en mitigación (85% de los costos totales) son 5 veces mayores que las consecuencias (15%). Esto genera sospechas sobre si la estrategia de inversión actual en Australia es eficiente y efectiva. Como un primer paso en la exploración de la eficiencia del sistema actual, se hizo un ejercicio estructurado de juicio experto. Un total de 26 expertos respondieron y los resultados sugieren que el sistema actual no es óptimo y que aumentar la inversión no tiene beneficios; sin embargo, podría haber un beneficio neto en la reducción de las inversiones en previsión y/o respuesta al fuego.

Palabras claves: Costos del fuego en Australia.

Introducción

En Australia, el fuego es una amenaza seria para la gente, la propiedad y el ambiente. Cada año hay aproximadamente 100 muertes y 3,000 heridos como resultado de incendios estructurales (Productivity Commission 2007). Durante el último siglo, la pérdida de residencias a causa de los incendios forestales alcanzó un promedio de 83 hogares al año (McAneney 2005). La varianza de año en año con respecto al promedio es grande, desde ningún hogar perdido en el 40% de los años, hasta 2,500 edificios en los fuegos forestales del Miércoles de Ceniza en Victoria (1983) (McAneney 2005), que además mataron a 75 personas (Bureau of Meteorology 1984). Otros incendios en Australia también han sido catastróficos: los fuegos de 1974-1975 en el Territorio del Norte destruyeron 117 millones de hectáreas (Australian Bureau of Statistics 1995); la explosión de gas de Longford le costó a la economía de Victoria un estimado de AUD\$1,300

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² Candidato doctoral, y Director, respectivamente, Risk Frontiers, Macquarie University, Sydney, Australia.

³ Director, Centre for Climate Change Research, University of New South Wales, Sydney, Australia.

millones (The Age 2002); el fuego del Childer Hostel en Queensland, mató a 15 personas y los incendios forestales de Canberra destruyeron 500 propiedades, mataron a 4 personas y costaron AUD\$300 millones (M^cLeod 2003).

Aunque se debate sobre los incendios en Australia, particularmente sobre los incendios forestales, pocas de estas discusiones se fundamenta en un conocimiento de su verdadero costo a la nación. De hecho, hasta donde sabemos, solamente se ha hecho un análisis del costo total a la economía nacional (Ashe et al. 2007). Este estudio estimó el costo total, con el 2003 como año base, en AUD \$8,500 millones al año.

En primer lugar, este estudio intenta revisar y actualizar los trabajos iniciales de Ashe et al. (2007) sobre el costo total de los incendios en Australia (con el 2005 como año base). Dese nuestro punto de vista, definir el sistema australiano es el primer paso necesario para producir un debate enriquecedor sobre todas las materias que pueden tener impacto en la prevalencia y severidad de los incendios. Mientras que los incendios pueden estimular la economía en algunos casos, y mientras que el efecto multiplicador de las actividades de recuperación, tales como la reconstrucción, pueden, en ocasiones, ser significativas, es útil enfocarse en los costos solamente. Estos son una medida de las pérdidas y gastos que, si se previniesen todos los fuegos, podrían invertirse en otros renglones de la economía. Los costos totales han sido divididos en tres componentes: costos de previsión del fuego, costos de respuesta al fuego y costos como consecuencia del fuego.

Tener un desglose de los costos del fuego es un prerrequisito esencial antes de examinar la eficacia en función de los costos de las estrategias alternas para asignar recursos a la previsión del fuego. Con esto en mente, este artículo también da una primera mirada a la asignación actual de recursos en Australia y su optimización. Debido a la complejidad de los problemas, las limitaciones de la información disponible y la ausencia de relaciones fuertes entre la previsión y respuesta y las consecuencias, para estimar el impacto de cambios hipotéticos en el sistema de inversión actual en previsión y respuesta se utilizó un método de juicio experto estructurado.

Definición del sistema - El costo del fuego en Australia

La primera tarea es definir el costo del fuego en Australia. Antes de hacerlo debemos considerar los estudios extranjeros que se han hecho con una visión similar. Los repasaremos brevemente.

El informe oficial del Reino Unido (Roy 1997) concluyó que el costo de los incendios en 1993 fue más de £4,500 millones o alrededor del 0.9% del producto interno bruto (PIB) de Inglaterra y Gales. Weiner (2001) ofreció estimados revisados

y, por primera vez, separó el costo promedio según las diferentes clases de incendios, la localización y el tipo de costo. El costo total de los incendios se estimó en £6,900 millones, y los incendios comerciales constituyeron más del 40% de esta cifra.

En Estados Unidos (EE.UU.), Hall (2004) exploró el costo total de los incendios basándose en el análisis de un programa de informes que lleva 10 años en función y que también sirvió de base a un número de hipótesis relacionadas con el costo de los incendios hechas por Roy (1997) para el Reino Unido. El costo de los incendios en EE.UU. (NFPA 2002) fue estimado entre \$187,000 y \$251,000 millones de dólares americanos o aproximadamente 2% del PIB.

El estudio más detallado surge de Canadá, donde Schaenman (1995) encontró que el costo de los incendios era de alrededor de CAN\$11,600 millones en 1991 (de nuevo, aproximadamente 2% del PIB). En Dinamarca, Moller (2001) determinó que el costo socioeconómico del fuego aproximaba el 1% del PIB.

El estudio más reciente de esta clase se llevó a cabo en Nueva Zelanda (BERL 2005) con el objetivo de cuantificar el alcance, escala e incidencia de los costos económicos relacionados al manejo de los riesgos del fuego. El costo total de los incendios se estimó en NZ\$1,000 millones al año o aproximadamente el 0.79% del PIB. Los costos mayores estuvieron asociados a las medidas de protección del fuego en edificios, el costo de los servicios de emergencia relacionados con los incendios, los daños del fuego a las propiedades y los costos de las lesiones que fueron consecuencia de los incendios.

Metodología

Los impactos del fuego son muchos y variados y una amplia gama de métodos podrían haber sido utilizados para categorizar los costos de sus componentes. Este estudio adopta la misma lógica de investigación que se usó en los estudios sobre el crimen en el Reino Unido (Brand 2000). Los costos se dividen en tres categorías:

- Costos de previsión– en su mayoría costos que se incurren en medidas de protección y prevención por o para el beneficio de las potenciales víctimas del fuego
- Costos como consecuencia – costos en los que se incurre como resultado del fuego y por la exposición de las propiedades al fuego, individuos, compañías privadas y la sociedad
- Costos de respuesta – los costos asociados a extinguir incendios y a limpiar luego de la extinción, costos que en su mayoría recaen en la sociedad.

Al informar sobre los estimados para los diferentes componentes del costo, es importante mantener en mente que, a pesar de que se basan en la mejor información y datos disponibles, hay muchas maneras de refinar los costos. Debido a la incertidumbre y a las variaciones estacionales de las pérdidas de hogares debido a los

incendios forestales, solamente se han usado los costos promedio. En otros casos hemos recurrido a una extrapolación de primer orden de las cifras extranjeras comparables luego de hacer los ajustes apropiados por las diferencias de población, cambios de moneda e inflación.

Las secciones siguientes describen los costos de las tres categorías.

Costos de previsión

Los costos de previsión se han dividido en siete componentes.

A1 La seguridad de los edificios contra el fuego

La reglamentación para la seguridad contra incendios en los edificios ayuda a proteger vidas, pero aumenta los costos de construcción. El costo se divide entre: (a) el costo de la reglamentación de construcción para edificios nuevos, domésticos y comerciales, y (b) el costo impuesto a los edificios existentes. Al último suelen referirse como reglamentación retrospectiva y práctica de actualización.

Este componente del costo también incluye la compra de equipos, tales como los de detección automática del fuego y los equipos de extinción portátiles, que no son necesariamente un requisito de las legislaciones de seguridad contra el fuego, al igual que el costo de los detectores de humo en hogares.

El costo de estas medidas puede ser descubierto en el momento de la construcción, cuando representa una porción identificable de los costos de construcción, o como parte del valor de alquiler del edificio (Roy, 1997). La investigación en el extranjero favorece el primer acercamiento: la Tabla 1 presenta los estimados de la proporción total de los costos de construcción que han sido atribuidos a la protección del fuego en algunos estudios.

Tabla 1—*La protección como porcentaje de los costos de construcción (Hall 2004, NFPA 2002, Schaeman 1995, Roy 2004)*

Ocupación	EE.UU.	EE.UU.	Canadá	RU	Escala
Residencial	2.5	2.5	4.9	0-2.5	0-5.0
Industrial	9.0	12.0	6.0	5.0	5.0-12.0
Comercial	9.0	12.0	6.0	5.0	5.0-12.0
Institucional	4.0	4.5	4.5	5.0	4.0-5.0
Otro	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0-5.0

La tabla también presenta las escalas de costo como que se deducen de estos cuatro estudios. Estas escalas pueden reflejar una gran cantidad de diferencias reales entre los países, tales como reglamentos y materiales de construcción y la composición general de la industria. Las diferencias también pueden reflejar

variaciones en los procesos de estimación adoptados.

El único estudio australiano en esta área fue emprendido por el Warren Centre de la Universidad de Sydney. El Warren Centre (1989) encontró que el costo de la protección contra incendios en los edificios australianos era el 3% del costo total de un bloque de apartamentos típico y un 6% de un edificio de oficinas común.

El Australia Construction Handbook (Rawlinsons 2006) es la autoridad con respecto a los costos de los componentes de construcción. La Tabla 2 provee un estimado de la proporción de los costos de las medidas de seguridad contra los incendios en los edificios australianos. La definición de servicios contra incendios en esta tabla cubre los aparatos que detectan y/o extinguen el fuego: sistemas de rociadores y otros sistemas de extinción automática, instalación de alarmas automáticas de fuego, equipo para apagar fuegos, instalación de bocas de incendios y carretes de mangueras. Las puertas de incendios y los ignífugos han sido excluidos y, para compensar, se ha añadido un 1% adicional.

Tabla 2—*Porcentaje de servicios contra incendios, puertas de incendios e ignífugos en los edificios australianos (Rawlinsons 2006)*

Tipo de edificio	Servicio de fuegos	Puertas de incendio	
		e ignífugos	Total
Administración	0.7-3.5	1.0	1.7-4.5
Bancos	0.7-2.5	1.0	1.7-3.5
Educación	0.4-0.7	1.0	1.4-1.7
Hospital/salud	0.5-2.5	1.0	1.5-3.5
Hoteles/moteles	0.4-4.3	1.0	1.4-5.3
Industrial	0.9-7.0	1.0	1.9-8.0
Oficinas	0.8-8.6	1.0	1.8-9.6
Estacionamientos	0.2-6.4	1.0	1.2-7.4
Recreación	0.2-0.6	1.0	1.2-1.6
Religioso	0.2-1.0	1.0	1.2-2.0
Residencial	0.0-2.4	1.0	1.0-3.4
Ventas	0.5-6.9	1.0	1.5-7.9

El valor total anual de la construcción residencial nueva en Australia en 2005 fue de AUD\$38,000 millones y la construcción no residencial (comercial) se estimó en AUD\$24,000 millones (ABS 2005). De la información disponible, se presume que el costo de la seguridad contra incendios en edificios residenciales sea ~2% del valor de la construcción (la mayor parte de la construcción residencial nueva la constituyen casas) y el 5% de la construcción comercial con la presunción de un punto medio en la escala de 1%-9% (Tabla 2).

Lo anterior se relaciona al costo de la seguridad contra los incendios en los edificios nuevos o renovados. Los cambios retrospectivos en el área de seguridad contra incendios en los edificios existentes son escasos en Australia y solo son probables luego de un evento importante de fuego. Para este estudio se asume una cifra anual de AUD\$20 millones.

Al combinar el costo de la reglamentación retrospectiva con el costo de la seguridad contra el fuego en las construcciones nuevas se estima en AUD\$1,740 millones para el 2005.

A2 Medidas de seguridad en las estructuras y en la infraestructura

Este componente incluye túneles, puentes, plantas eléctricas, carreteras, rieles, plantas de tratamiento de aguas, instalaciones de petróleo y gas, etc. Un ejemplo es que los requerimientos de presión de agua para la extinción de incendios son un factor principal en la determinación del tamaño de las tuberías principales de agua y para la determinación de las necesidades asociadas de bombeo. El costo de usar tuberías y bombas más grandes de las que serían necesarias para solamente proveer agua potable y sanitaria puede atribuirse a la protección del fuego.

El Departamento Australiano de Estadísticas valoró los costos de construcción de obra civil en Australia en 2005 en AUD\$37,000 mil millones (ABS 2005). En Canadá, Schaenman (1995) estimó que el costo de la seguridad contra incendios en estructuras e infraestructura iba desde 0.1% en las carreteras, 10% en las refinerías de petróleo hasta 20% en las plantas de tratamiento de agua. En EE.UU., Hall (2004) estimó la cifra entre 9% y 11% para estructuras similares. Dada la ausencia de estudios similares en Australia, una cifra media de 5% fue adoptada en este estudio. El costo de las medidas de seguridad contra el fuego en estructuras e infraestructura se estimó en AUD\$1,850 millones en el 2005.

A3 Educación y adiestramiento sobre seguridad contra incendios

Una variedad de actividades pueden ser clasificadas bajo educación y adiestramiento sobre seguridad contra incendios, por ejemplo: brigadas de incendios que inspeccionan ciertos tipos de propiedades para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad contra incendios, y empleados que pueden recibir adiestramientos sobre seguridad contra incendios como parte de los cursos que toman al comenzar a trabajar en un lugar nuevo, o adiestramientos sobre salud y seguridad.

Para el Reino Unido, Weiner (2001) estimó que el costo de la educación y adiestramientos sobre la seguridad contra incendios era de £40 millones. Se presume que la mayor parte de esta cifra se encuentra en el servicio contra incendios. Hemos

presumido que unos AUD\$20 millones se usan para cubrir los gastos de educación y adiestramiento sobre seguridad contra incendios que no corresponden a los organismos de servicio contra incendios.

A4 Administración de seguros

La administración de seguros representa una pérdida para la sociedad como resultado de los incendios e incluye las comisiones pagadas por agentes de seguros y el costo del establecimiento de políticas y la investigación y administración de reclamos. El pago de reclamos por pérdidas debidas a incendios se considera como una transferencia de riquezas entre las aseguradoras y los asegurados y no figura en los costos de los incendios de la nación.

Debido a la falta de datos de Australia, este estudio utilizó los costos de administración de seguros estimados en el Reino Unido (Roy 1997) y los ajustó para Australia según la población y el tipo de cambio. Esto equivale a una suma de AUD\$400 millones. Al convertir resultados canadienses equivalentes (Schaenman 1995), obtenemos una suma de AUD\$250 millones. En este estudio presumimos una cifra media de AUD\$325 millones.

A5 Seguridad contra el fuego en objetos de consumo

Cada avión, vehículo y tren de uso civil tiene algún elemento de seguridad contra incendios en su diseño y prácticamente todos los líquidos inflamables tienen que ser almacenados en envases especiales. Los calentadores tienen aperturas para prevenir que se calienten en exceso. Tales ejemplos de protecciones adicionales aumentan el costo de los objetos, un costo que es muy difícil de cuantificar ya que muchas de las añadiduras tienen más de una función: por ejemplo, la función de los cortacircuitos, ¿es prevenir los fuegos o las electrocuciones?

Ante la ausencia de datos de Australia, nuevamente nos vemos obligados a mirar al extranjero. Dada la gran proporción de bienes de consumo que son importados, estas cifras son importantes. El estudio canadiense (Schaenmann 1995) estimó el costo de la seguridad contra incendios de los bienes de consumo en CAN\$2,300 millones, una cifra equivalente a aproximadamente AUD\$1,700 millones en Australia, luego de hacer los ajustes para la población y el tipo de cambio. En EE.UU., Meade (1993) estimó que el costo de la seguridad contra incendios en los bienes de consumo podría ser tan alto como un 20% del costo total de los incendios, una cifra que equivaldría a aproximadamente AUD\$1,500 millones. Ambos estudios implican cifras notablemente similares para Australia y adoptamos una cifra media conservadora de AUD\$1,600 millones.

A6 Investigación sobre el fuego

Aunque los costos agregados de investigación sobre incendios no están disponibles para Australia, dos programas de investigación proveen una guía para estos costos. Al Fire Code Reform Centre se le proveyeron unos AUD\$5 millones en un periodo de 5 años y el Bushfire Cooperative Research Centre (2003) recibe aproximadamente AUD\$15 millones al año. También se hace trabajo de investigación en las universidades que no es financiado por el Bushfire Cooperative Research Centre. Dada esta información, el costo promedio de la investigación sobre el fuego en Australia se toma aquí como AUD\$20 millones al año.

A7 Mantenimiento de los equipos y medidas de seguridad contra incendios

La mayor parte del equipo de seguridad contra incendios requiere un mantenimiento continuo para mantener su efectividad. La cubierta más comprehensiva de este costo proviene de Canadá (Schaenmann 1995), donde se estimó que el costo del mantenimiento de las medidas de seguridad contra incendios era el 8% del costo anual de las medidas de seguridad contra incendios. Es importante notar que este estimado cubre solamente los sistemas integrados nuevos y no las generaciones previas de sistemas integrados. Al usar la cifra del 8% para Australia, (componente de costo A1 y A2) queda sugerido un costo de mantenimiento de AUD\$287 millones al año. Ya que esta cifra no incluye los sistemas incorporados previos, la consideramos baja. Consideremos, por ejemplo, que la adopción de la misma cantidad de medidas de seguridad contra incendios en un periodo de 5 años requeriría eventualmente un mantenimiento anual de aproximadamente AUD\$1,436 millones.

Rawlinsons (2006) estima que el mantenimiento de los sistemas de seguridad contra incendios cuesta 1% del valor de alquiler neto anual (cifra que incluye diversas cuotas, reparaciones y mantenimientos). En 2005, el valor de alquiler de los edificios no residenciales en Australia fue estimado en AUD\$200 dólares por metro cuadrado por año, lo que equivale un costo de mantenimiento de AUD\$2 millones al año.

Si presumimos que los requisitos australianos son similares a los de EE.UU., la información derivada del Commercial Building Energy Survey (Australian Building Codes Board 2006) puede utilizarse para estimar los requisitos totales de área cubierta. La encuesta sugiere que la necesidad promedio de área cubierta para propósitos comerciales es de 27.5m² per cápita, lo que da un total de 500 millones de metros cuadrados en el 2005. Esta cifra equivale a un costo nacional total de mantenimiento de AUD\$1,000 millones. Esta cifra no toma en consideración los

costos de mantenimiento de los equipos de seguridad contra el fuego y las medidas de seguridad en las estructuras y la infraestructura.

Al considerar los dos métodos independientes de estimar el costo de mantenimiento del equipo de seguridad contra incendios y las medidas de seguridad de los edificios, estructuras e infraestructura, adoptamos la cifra media de AUD\$1,200 millones.

Costo como consecuencia

Los costos como consecuencia del fuego han sido divididos en seis componentes.

C1 Costo de lesiones debidas al fuego

En 2005 hubo 110 muertes en el país (Productivity Commission 2007). La exposición al humo, al fuego y las llamas fue responsable de 86 muertes, y 21 muertes se debieron al uso intencional del fuego. A nivel nacional, el índice de muertes por fuego para los años del 2002-2004 fue de 6.4 por cada millón de personas, o aproximadamente 3,300 lesiones debidas al fuego al año.

Se ha dicho que es imposible dar un valor a las víctimas y especificar dicho valor sigue siendo controversial (Slayter 2001). Sin embargo, esos valores están implícitos en las decisiones que se toman a diario. Por ejemplo, una decisión política sobre si patrocinar un nuevo hospital o la prevención de incendios en áreas residenciales o en edificios públicos, asigna un valor, de manera implícita, a las posibles víctimas del fuego.

El sufrimiento físico y emocional de las víctimas también tiene un costo significativo y es difícil, pero no imposible, de cuantificar. Podemos, por ejemplo, derivar el costo del trauma a las víctimas de incidentes de incendio al considerar el valor que la sociedad le da a la prevención del incidente.

Hay tres estudios que han cuantificado el costo de las lesiones por fuego en Australia, una a nivel nacional (Moller 1998), una para el área de New South Wales (Potter-Forbes 2003) y una para Australia occidental (Hendrie 2005). Todos los estudios usan una metodología similar que suma los costos directos de los recursos del incidente, los costos indirectos asociados a la pérdida de ingresos y de productividad del hogar, y la reducción de la calidad de vida por lesiones, morbilidad y mortalidad. La Tabla 3 resume los resultados de cada estudio.

Tabla 3—Costo de lesiones debidas al fuego – Estudios australianos

Jurisdicción	Año base	Total
Nacional	1996	AUD\$330 millones
NSW	1999	AUD\$75 millones
AO	2003	AUD\$38 millones

Luego de convertir los estimados de NEW SOUTH WALES y AO en la Tabla 3 a valores nacionales equivalentes para 2005, con ajustes hechos por población y su crecimiento por estado, los estimados fluctúan entre los AUD\$300 millones y los AUD\$430 millones. Este estudio asume una cifra media de AUD\$370 millones.

C2 Pérdidas de propiedad

Uno de los costos más obvios del fuego es el costo de reparar o reemplazar las propiedades estropeadas. Para muchas personas, las pérdidas del fuego serán cubiertas por las compañías aseguradoras, pero los pagos del seguro solamente representan una transferencia de los pagos de las primas de los seguros de aquellos que no tienen pérdidas a aquellos que las tienen. Por esta razón los pagos de las aseguradoras no se incluyen en los costos del fuego. Sin embargo, la destrucción de la propiedad original sí es un costo para la sociedad.

Los ocupantes de los edificios podrían tener que mudarse en lo que se reparan los daños, las autoridades locales deben retirar los carros quemados y reparar la superficie de las carreteras. Estos son solo unos pocos de los costos posibles de limpiar después de un incendio. Los costos de limpieza se incluyen en este componente.

Todos los años, la Comisión de Productividad Australiana produce un “Informe sobre los servicios gubernamentales” (2007) en el que establece un perfil de las pérdidas promedio de dinero y propiedades a causa de incendios. Los incendios estructurales son aquellos que afectan hogares y otros edificios. A nivel nacional, las pérdidas totales de propiedades por incendios estructurales fueron de AUD\$40 por persona o aproximadamente AUD\$824 para Australia. Se presume que esta cifra considera otras pérdidas por fuego en las estructuras y la infraestructura, sin embargo, no incluye las pérdidas informadas por los servicios rurales contra incendios. Como la mayoría de las propiedades en Australia se encuentran en áreas cubiertas por el servicio urbano contra incendios, las pérdidas de propiedades se han incrementado en un 20% para incluir las pérdidas de propiedades rurales, lo que arroja un estimado de AUD\$990 millones.

C3 Pérdidas de negocios

El fuego puede traer como resultado una pérdida comercial significativa en los aspectos de producción, cuotas de mercado y fondos de comercio. Aún un fuego pequeño en las etapas cruciales de la producción puede significar pérdidas grandes para las compañías. Además, los incendios que tengan como resultado la clausura de las compañías pueden tener efectos significativos sobre los empleados. Sin embargo,

es poco frecuente que las pérdidas sean grandes para el país en su totalidad, pues las pérdidas de una compañía se compensan con las ganancias de otra. Un fuego en un supermercado local va a llevar a esos clientes a otro supermercado. En este caso particular, el único costo para la sociedad es el aumento del tiempo para llegar al otro supermercado. De la misma manera, una compañía que aumente sus ventas puede aumentar su empleomanía para poder cumplir con el aumento en la demanda; de esta manera, el efecto en las tasas de empleo se cancela. La única pérdida para el país por estos incendios se da en los casos en que las pérdidas no son compensadas por aumentos en la producción de otras compañías. Los competidores extranjeros podrían tener que suplir el déficit, o, en el caso de que los artículos sean únicos, la sociedad tendrá que continuar sin ellos hasta que las compañías afectadas por el fuego se recuperen o se encuentren productos sustitutos.

En Australia, es difícil conseguir información sobre las pérdidas de los negocios por los incendios. Debido a la falta de información, este estudio adoptó un estimado de las cifras del Reino Unido (£40 millones, Roy 1997), que equivale a aproximadamente AUD\$50 millones en Australia

C4 Costos ambientales

Los costos ambientales son causados por la contaminación de la atmósfera con los productos de combustión o del agua del subsuelo con los químicos que percolan de los incendios, muchas veces provenientes del agua con la que se apaga el fuego.

Los incendios, incluidos los forestales, producen un particulado fino que se convierte en una bruma atmosférica. Estas partículas pueden exacerbar las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, tales como la bronquitis, la pulmonía y el asma y, por lo tanto, aumentar los ingresos a los hospitales y las visitas a las salas de emergencia. El material particulado también se ha asociado a muertes. Un estudio que se hizo en el 2003 por el Departamento de Conservación y Ambiente de New South Wales (2005) estimó una cifra media de los costos a la salud debidos a la contaminación del aire en la región metropolitana de Greater Sydney de AUD\$893 per capita. Para este estudio, se presumió que los productos de la combustión de los incendios impactan a un 20% de población australiana anualmente y que los incendios accidentales contribuyen un 10% al particulado de incendios en la atmósfera. Esto arroja como resultado un estimado de AUD\$195 millones para el 2005. Se presume que en esta cifra se han incorporado otros costos ambientales como la contaminación química y por escorrentías.

C5 Costos culturales y del patrimonio nacional

Los incendios pueden destruir propiedades con valor cultural único. Son bienes que no se pueden reemplazar o reparar con facilidad y cuya pérdida tiene un costo mayor para la sociedad que lo que pueda costar su reparación o reemplazo. Un ejemplo reciente fue la pérdida del observatorio del monte Stromlo en los incendios de Canberra en el 2003 (The Age 2003).

No se tiene información sobre los costos culturales anuales debidos al fuego en Australia. En el Reino Unido, el incendio de 1992 del Palacio de Windsor es un ejemplo de pérdidas culturales por incendios. El renovar el Palacio de Windsor tomó 5 años y costó £37 millones (AUD\$100 millones) (Royal Windsor 2005). Los costos de la reconstrucción del observatorio del monte Stromlo después de los incendios forestales de Canberra en el 2003 se han estimado en AUD\$50 millones (The Age 2003). Para este estudio hemos usado una cifra anual de AUD\$100 millones, suponiendo que sucedan dos eventos como el de Stromlo al año.

C6 Distorsiones económicas mayores

Los incendios y, en particular, los incendios provocados, pueden afectar a las comunidades locales. Una cantidad grande de autos y de edificios quemados pueden desalentar el establecimiento de nuevos negocios y de nuevos residentes en el área. Hay muy poca información sobre estos costos para Australia. Asumimos una cifra nominal de AUD\$100 millones.

Costos de respuesta al fuego

Los costos de respuesta al fuego han sido divididos en cuatro componentes.

R1 Costos de los servicios de respuesta al fuego

Los servicios de respuesta al fuego efectúan una variedad de tareas, algunas de las cuales son requisitos legislativos. Estas incluyen:

- Responder a llamadas de emergencia; esto incluye las llamadas para servicios especiales y las falsas alarmas
- Llevar a cabo inspecciones para verificar el cumplimiento de la reglamentación establecida
- Proveerle a la comunidad consejos y educación sobre la seguridad contra los incendios

Los incidentes de servicios especiales (como responder a emergencias de inundaciones) no se han considerado como costos de los incendios. En contraste, el

costo de las falsas alarmas es un costo explícito del fuego; si no hubiese incendios, no habría falsas alarmas. Luego de la investigación de las llamadas de alarma, se ha encontrado que una porción significativa de todas las llamadas de ayuda son falsas alarmas. Sin embargo, las organizaciones de servicios contra el fuego están obligadas por ley a verificar todas las llamadas recibidas. No se puede clasificar ningún incidente como falso hasta que no sea investigado.

Las organizaciones de servicios contra el fuego son las agencias primarias que proveen manejo de emergencias en los incendios. Una gama de otras agencias también podrían estar involucradas en el manejo de los incendios, tales como los servicios de ambulancias y la policía. En el periodo de 2005-2006, a nivel nacional, 16,920 empleados a tiempo completo participaron directamente en la prestación de servicios en contra de incendios (Productivity Commission 2007) y se atendieron 537 incidentes de fuego por cada 100,000 personas (Productivity Commission 2007). Estos números han disminuido desde el periodo de 2002-2003. Aunque los incendios estructurales son menos comunes que los forestales o de espacios abiertos, representan una amenaza significativa.

El costo total de patrocinar los servicios contra el fuego en Australia, según el “Informe sobre los servicios gubernamentales” (2007) fue de AUD\$1,900 millones en el 2005 (se excluyen los fondos provistos para las agencias de manejo de las tierras). Hay que tomar en consideración que los servicios contra incendios en Australia también proveen servicios que no están relacionados con incendios. Las estadísticas de incendios de la brigada de incendios de New South Wales (2003) sugieren que un 70% de los esfuerzos de los servicios contra incendios están directamente relacionados con la seguridad contra incendios. Como resultado, estimamos AUD\$1,330 millones para este componente.

R2 Servicios de voluntarios

Miles de australianos son voluntarios en servicios contra incendios, particularmente en las brigadas contra incendios forestales y rurales. Esta es una contribución inmensa y un costo de oportunidad importante para la economía nacional.

La investigación sobre los incendios forestales (2004) del Consejo de Gobiernos Australianos (CGBA) examinó el impacto de los servicios contra incendios voluntarios. En 2005, 222,000 voluntarios contribuyeron millones de horas de ayuda para la comunidad australiana. La contribución gratuita de estos voluntarios es grande. Los estimados de Victoria valoran estas contribuciones en AUD\$460 millones por cada 58,000 voluntarios (Hourigan 2001). Al extrapolar esta cifra al nivel nacional, la contribución anual se acerca a los AUD\$2,000 millones.

R3 Respuesta de las brigadas de incendios privadas

Solamente las organizaciones particularmente grandes o remotas tienen sus propias brigadas de incendios. Las operaciones de petróleo, gas y minería son ejemplos de esto. La mayor parte de su personal sale de la organización y solamente una porción pequeña de su tiempo se usa en la protección contra incendios.

Los datos sobre los costos de estas brigadas son limitados. Para propósitos de este estudio, el costo de las brigadas de incendios privadas se calcula a nivel nacional en AUD\$100 millones al año, para incluir las importantes operaciones de minería en las regiones remotas de Australia.

R4 Costos de la justicia penal

Muchos fuegos tienen como consecuencia la intervención policíaca para controlar el tránsito y las muchedumbres. La policía también investiga los fuegos, en particular los intencionales. Los laboratorios de criminología detectan los acelerantes de ignición y proveen servicios de investigación. Estas oficinas investigan los fuegos de mayor importancia y exigen recursos significativos. Por ejemplo, New South Wales ha tenido por lo menos siete investigaciones sobre incendios forestales desde 1994.

Ante la ausencia de información explícita sobre este componente del costo hemos adoptado una cifra en conjunto de AUD\$50 millones al año.

Definición del sistema – Costo total de los incendios en Australia en 2005

La Tabla 4 resume los estimados de los componentes de los costos identificados anteriormente para establecer un costo nacional del fuego.

Tabla 4—Resumen de los componentes del costo

Componente del costo	Costo total (\$ millones)	% del total
Seguridad contra incendios en los edificios	1,740	14
Medidas de seguridad contra incendios en las estructuras e infraestructura	1,850	15
Educación y adiestramiento contra incendios	20	<1
Administración de seguros	325	3
Seguridad contra incendios en los bienes de consumo	1,600	13
Investigación sobre el fuego	20	<1

Mantenimiento de los equipos y medidas de seguridad contra incendios	1,200	10
Costos de previsión	6,735	56
Costo de lesiones debidas al fuego	370	3
Pérdida de propiedades	990	8
Pérdida de negocios	50	<1
Costos ambientales	195	2
Costos culturales y del patrimonio nacional	100	<1
Distorsiones económicas mayores	50	<1
Costos como consecuencia	1,755	15
Costos de los servicios de respuesta al fuego	1,330	11
Servicios contra incendios voluntarios	2,000	17
Respuestas de la brigadas contra incendios privadas	100	<1
Costos de la justicia penal	50	<1
Costos de respuesta	3,480	29
Costo total del fuego en Australia 2005	11,990	100

El costo total del fuego equivale a 1.3% del PIB de Australia. Para poner el costo del fuego en contexto, es útil compararlo con otros componentes de la economía australiana. El perfil estadístico más reciente de Australia de la OCDE en 2005 (2005) declara que Australia invierte 1.5% de su PIB en desarrollo, investigación y un 6% e educación. Entonces, es claro que el costo del fuego en Australia es significativo.

Optimización del sistema

Ahora que el sistema ha sido definido, la próxima tarea es considerar si la asignación de fondos en Australia es óptima. Dado que el sistema actual invierte 85% de AUD\$12,000 millones para manejar las consecuencias que equivalen a un 15%, es natural que nos preguntemos si el sistema actual es óptimo. A priori, esperaríamos que si se redujera la inversión en previsión y respuesta las consecuencias aumentarían, pero, ¿por cuánto? Y, ¿hay mejores maneras de darle prioridad a la inversión?

Para evaluar si el sistema actual es óptimo, sería necesario derivar relaciones entre la previsión, la respuesta y las consecuencias, y las interacciones entre los diversos componentes del costo. Esta tarea constituye un reto ya que estas relaciones son complejas y no necesariamente se comprenden. Como un primer paso, realizamos una sencilla recolección de opiniones de expertos. Ahora discutiremos este método.

Juicio experto estructurado

Solicitar el juicio de los expertos es un método de recolección de información que se usa cuando las técnicas de investigación tradicionales no son viables ni apropiadas (Otway 1992). Los juicios son inferencias o evaluaciones que van más allá de las declaraciones obvias de los hechos, los datos o las convenciones de una disciplina. Los juicios expertos siempre han tenido un papel significativo en la ciencia y la ingeniería. De manera cada vez mayor, estos juicios se reconocen como otro tipo de dato científico y se han desarrollado métodos para tratarlo de esa manera. Como cualquier medida científica, la adquisición, el uso y la validación de los datos de los juicios expertos debe proceder de una manera que pueda constatare siguiendo reglas rigurosas de metodología.

Proceso de solicitar el juicio experto

Para evaluar la viabilidad del juicio experto estructurado para esta investigación en particular, se llevó a cabo un ejercicio piloto. Se identificaron veinte expertos de los sectores profesionales e industriales pertinentes. Diez de los veinte expertos respondieron a la solicitud inicial. La evaluación del proyecto piloto inicial confirmó que el uso del juicio experto estructurado puede ayudar en la optimización de los sistemas.

Luego se invitaron a participar en el experimento a cuarenta expertos adicionales, de los cuales dieciséis respondieron, para un total de veintiséis respuestas. A todos los expertos se les garantizó el anonimato. Los expertos provenían de varios trasfondos que incluían servicios de protección contra incendios, profesiones en el área de ingeniería del fuego, administradores de instalaciones, y los sectores de las ciencias y de las aseguradoras.

A cada experto se le pidió que estimara el impacto de aumentar y disminuir las inversiones en la previsión y respuestas a las consecuencias del fuego. Además de la moda, se les pidió a los expertos que proveyeran estimados del mínimo y del máximo. La Figura 1 es la tabla que se les proveyó. La previsión se tomó como variable. También se les proveyó una tabla similar que tenía la respuesta como la variable.

Figura 1— Tabla provista a los expertos (costos de 2003)

Previsión como el parámetro variable

Respuesta (\$ miles de millones)	Previsión		Consecuencias*		
	(\$ miles de millones)	% actual	Mínimo	Moda	Máximo
			(límite inferior)		(límite superior)
2.5	0.5	11%			
2.5	1.5	33%			
2.5	2.5	56%			
2.5	3.5	78%			
2.5	4.5	100%	100	100	100
2.5	5.5	122%			
2.5	6.5	144%			
2.5	7.5	167%			
2.5	8.5	189%			

* 100 se refiere al sistema y asignación de fondos actuales

Además, a cada experto se le pidió que contestara las siguientes preguntas para evaluar su nivel de conocimiento en el área.

Tabla 5— Preguntas usadas para evaluar la pericia del experto

Preguntas

1. ¿Cuál es la proporción de las víctimas mortales reportadas que ocurren en edificios residenciales (casas, apartamentos, etc.)?
2. ¿Cuál es la proporción de las víctimas mortales reportadas que fueron causadas por acciones deliberadas?
3. Estime la proporción de fuegos que se controlan por sí solos antes de la llegada del servicio de control de incendios.
4. Estime la proporción de incendios reportados que tienen como resultado aproximadamente el 50% de las consecuencias del fuego (consecuencias económicas).
5. En términos del costo total del incendio, ¿qué proporción le corresponde a la previsión, respuesta y consecuencia?
6. Estime el % de los costos de construcción que tienen que ver con los requisitos obligatorios de seguridad en contra del fuego (previsión) en las oficinas.
7. ¿Cuál es la intensidad de los incendios forestales en la que se considera que la extinción (por tierra) probablemente fracasará?

A los expertos se les proporcionaron cuatro respuestas posibles a cada pregunta (una de las cuales era la contestación correcta). La puntuación de cada respuesta se otorgó según la cercanía a la respuesta correcta.

Solamente un experto obtuvo una puntuación menor de 50%, trece expertos obtuvieron una puntuación entre el 50% y el 75% y doce expertos obtuvieron una puntuación mayor al 75%.

Resultados

Como se esperaba, todos los expertos predijeron un aumento en las consecuencias si las inversiones en previsión y/o respuesta se reducían. También, si la inversión en previsión/o respuesta se aumentara, las consecuencias disminuirían.

Para evaluar si hay beneficios económicos que acompañen un aumento o una disminución en la inversión, introducimos el concepto de *beneficio neto*. El siguiente ejemplo explica el concepto. Si la inversión en respuesta se aumentara por \$100 millones y se redujeran las consecuencias por \$150 millones, inferiríamos un beneficio neto de \$50 millones. De la misma manera, si los expertos esperan que las consecuencias se reduzcan por \$20 millones, el resultado sería una pérdida neta de \$80 millones. La misma lógica se aplicó a una disminución en la inversión.

Las Figuras 2 y 3 ilustran el estimado (la moda) de todos los expertos junto con el beneficio neto de cero de un nivel de inversión dado (ilustrado con la línea gruesa). Este es el punto en el que los economistas serían indiferentes a un cambio en la inversión.

Todos los expertos estuvieron de acuerdo en que no hay beneficio neto al aumentar las inversiones en la previsión o respuesta al fuego (Figuras 2 y 3). En otras palabras, estos expertos creen que el sistema actual está saturado. Todos los expertos, menos uno, creen que habría un beneficio neto si se disminuye la inversión. Sin embargo, 4 expertos predijeron una pérdida neta si se redujera significativamente la inversión en previsión (<AUD\$4 mil millones). Esto representaría una disminución del 40% en la inversión en previsión. Nos sorprendió que solamente 4 expertos predijeran este resultado.

Figura 2— Juicios expertos sobre los resultados asociados a los cambios en la inversión en la prevención del fuego. La posición del beneficio neto cero está en la línea 1-1 que se muestra con la línea negra gruesa.

Figura 3—Juicios de los expertos sobre los resultados asociados a los cambios en la inversión en la respuesta al fuego. La posición del beneficio neto cero está en la línea 1-1 que se muestra con la línea negra gruesa.

Los resultados promedio en la Figura 4 sugieren que el sistema sufriría una pérdida neta como consecuencia de un aumento en la inversión, y un beneficio neto como consecuencia de una disminución en la inversión.

Figura 4—Mínimo, moda y máximo promedio de las opiniones provistas por los expertos

Las implicaciones de la Figura 4, suponiendo que los expertos, todos profesionales del fuego de una manera u otra, han comprendido exitosamente la sensibilidad del sistema a los cambios en las inversiones, son las siguientes. Si suponemos la anticipación modal y el costo total del sistema actual de AUD\$12,000 millones, entonces si la inversión en la previsión fuera a tener un aumento de AUD\$4,000 millones, por ejemplo, se anticipa que las consecuencias van a disminuir solamente por AUD\$500, lo que tendría como resultado una pérdida neta de AUD\$3,500 millones. Por otra parte, si la inversión en la previsión disminuyera unos AUD\$4,000 millones, se anticipa que las consecuencias aumentarían unos AUD\$2,000 millones, lo que disminuiría los costos totales por aproximadamente AUD\$10,000 millones, lo que da una ganancia neta de AUD\$2,000 millones. Desde luego, se predice que la disminución en la inversión aumentaría las consecuencias negativas, sin embargo, desde una perspectiva estrictamente económica, la reducción en la inversión sobrepasa el aumento en las consecuencias por aproximadamente AUD\$2,000 millones.

Los resultados del ejercicio también se evaluaron en relación con la pericia de los expertos en las respuestas a las preguntas de evaluación. Aunque la conclusión general no cambió, fue evidente que al aumentar la puntuación del experto (mientras más erudito era el experto), la relación se acercaba más a la posición neutral de costo-beneficio, es decir, ningún beneficio neto.

Conclusiones

Hemos definido un sistema y cuantificado el costo del fuego en Australia. Nuestro estimado es que el total del costo del fuego en Australia es aproximadamente AUD\$12,000 millones anuales o el 1.3% del PIB australiano. Los resultados también muestran que Australia invierte aproximadamente AUD\$10,200 millones (o el 85% del costo total del fuego) para manejar una pérdida de aproximadamente AUD\$1,755 millones (o el 15% del costo total del fuego). Un resultado que genera dudas sobre la efectividad y eficiencia de esta inversión de aproximadamente AUD\$580 por cada australiano. Los juicios expertos estructurados se han usado como un primer paso en la investigación de si el sistema actual está en una posición óptima en términos de inversión. Ninguno de los expertos que respondió las preguntas creyó que un aumento en la previsión o respuesta sería rentable. Más aún, la mayoría sugirió una disminución en la inversión en previsión y/o respuesta, que, aunque brinda un beneficio neto a Australia, estaría acompañado por un aumento en las consecuencias.

Reconocimientos

Agradecemos a los expertos que respondieron a nuestra solicitud.

Referencias

- Ashe, B.S.W, McAneney, K.J., Pitman, A.J. 2007. **The Cost of Fire in Australia**. Cost of Fire conference, Conferenceworld, 29 May 2007, Sydney, Australia.
- Australian Building Codes Board. 2006. **Regulation Impact Statement – BCA Energy Efficiency requirements for Class 5-9 buildings**. RIS 2006-2, Canberra, Australia.
- Australian Bureau of Statistics. 2005. **Year Book Australia**. Canberra, Australia.
- Australian Bureau of Statistics. 1995. **ABS Year Book Australia, (1301.0)**. ABS, Canberra, Australia.
- Blong, R. 2004. **Residential building damage and natural perils: Australian examples and issues**. Building Research and Information 32(5):379-390.
- Brand, S., Price, R. 2000. **The economics and social costs of crime**. Home Office Research Study No. 217, London Home office.
- Building Regulation Review Task Force. 1991. **Microeconomic Reform: Fire regulation**. National Building Fire Safety Systems Project of the Building Regulation Review Task Force, May 1991.
- Bureau of Meteorology. 1984. **Report on the meteorological aspects of the Ash Wednesday fires**. 16 February 1983. Australian Government Public Service. Canberra. 143pp.
- Bushfire Cooperative Research Centre. 2003. **The Bushfire CRC Officially Launched**. Media Release, 9 December 2003.
- Business and Economic Research Limited. 2005. **The cost of managing the risk of fire in New Zealand**. BERL ref#4278, Nay 2005.
- Council of Australian Governments. 2004. **National Inquiry on Bushfire Mitigation and Management**. 31 March 2004, Commonwealth of Australia.
- Department of Environment and Conservation, NSW. 2005. **Air Pollution Economics – Health Costs of Air Pollution in the Greater Sydney Metropolitan Region**. ISBN 1-74137-736-6, November 2005.
- Hall, J.R. Jr. 2004. **The total cost of fire in the United States**. National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA.
- Hendrie, D. 2005. **The Cost of Injury in Western Australia during 2003: An overview of Total and Health System Costs**. ISBN 0-9756937-6-x, Perth, Western Australia, Western Australia, Government.

- Hourigan, M. 2001. **The value of the volunteer contribution.** Consultants report to the Victorian Country Fire Authority – cited in the CFA submissions to the Economic Development Committee of the Parliament of Victoria.
- M^c Aneney, K.J. 2005. **Australian bushfire: Quantifying and pricing the risk.** In Proc. Of Workshop on Planning for Natural Hazards – how can we mitigate the impacts?. Wollongong University, 2-5 February, 2005.
- M^cLeod, R. 2003. **The inquiry into the Operational Response to the January 2003 Bushfires.** http://www.cmd.act.gov.au/mcleod_inquiry/report.htm.
- Meade, W. 1993. **A first pass at computing the cost of fire in modern society.** The Herndon Group, March 1993; prepared for Center for Fire Research, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland.
- Moller, J. 1998. **Estimated cost of injury by fire, flame and burns, Australia 1995-96.** National Injury Surveillance Unit, Flinders University of South Australia, <http://www.nisu.flinders.edu.au/pubs/injcost.burns.html/>.
- Moller, K. 2001. **The socio-economic costs of fire in Denmark.** Danish Emergency Management Agency, Birkerod, Denmark. ISBN 87-89121-90-2.
- National Fire Protection Association. 2002. **The high cost of fire in the United States.** NFPA Journal, May/June 2002, pp. 28.
- New South Wales Fire Brigade. 2003. **NSWFB Annual Statistical Report 2001/02 – Table 2 Total responses and primary incidents by region, region and station.** State Government of New South Wales, 2003.
- Otway, H, von Winterfeldt, D. 1992. **Expert Judgment in Risk Analysis and Management: Process, Context, and Pitfalls.** Risk Analysis, Vol. 12, No. 1, 1992.
- Organisation of Economic Co-operation and Development. 2005. **OECD statistical profile of Australia – 2005.**
- Potter-Forbes, M., Aisbett, C. 2003. **Injury costs: A valuation of the burden of injury in New South Wales 1998-1999.** NSW Injury Risk Management Centre, UNSW, ISBN 0-9580633-1-1.
- Productivity Commission. 2004. **Reform of Building Regulation – Research Study.** December 2004, Canberra, Australia.
- Productivity Commission. 2007. **Report on Government Services 2005,** Canberra, Australia.
- Rawlinsons. 2006. **Australian Construction Handbook 2006.** Edition 24, Rawlhouse Publishing Pty. Ltd, Perth, Western Australia, ISSN 0810-8064.

- Roy, D. 1997. **The cost of fires – A review of the information available.** Home Office Publications Unit, London. ISBN 1 85893 932 1.
- Royal Windsor.com. 2005. **The definitive Windsor castle guide.** <http://www.royal-windsor.com/winsorcastle.htm>.
- Schaenman, P., Stren, J., Bush, R. 1995. **Total Cost of Fire in Canada: An Initial Estimate.** National Research Council of Canada, February '995, ISBN 0-660-15949-X.
- Slayter, T. 2001. **Economic Costs of Natural Disasters in Australia.** Bureau of Transport Economics, Report 103, ISBN 0-642-45633-xs, Commonwealth of Australia.
- The Age. 2003. **Mount Stromlo to rise from the ashes.** 1 February 2003.
- The Age. 2002. **Coroner blames Esso for Longford disaster.** 15 November 2002, <http://www.theage.com.au/articles.2002/11/15/1037080898920.html?oneclick=true>.
- The Warren Centre for Advanced Engineering. 1989. **Fire Safety Engineering.** The University of Sydney, December 1989, ISBN 0-86758-403-3.
- Weiner, M. 2001. **The economic costs of fire.** Home Office Research Study 229, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, Department of Transport, Local Government and the Regions, London.

El Efecto de los Incendios Forestales sobre la Salud y la Economía: Revisión de la Bibliografía y Evaluación del Impacto¹

Ikuho Kochi,² John Loomis,³ Patricia Champ,⁴ y Geoffrey Donovan⁵

Resumen

Este estudio sintetiza la bibliografía sobre la salud y los efectos económicos relacionados con los incendios forestales y desarrolla una base para enfrentar los impactos de estos incendios sobre la salud y la economía. Repasaremos tres áreas de la bibliografía: los resultados claves para la salud, el impacto de los incendios forestales sobre la salud y la valoración de los efectos en la salud. Encontramos que los resultados clave para la salud son: la mortalidad, los días de actividad restringida (incluidos los días de trabajo perdidos), las hospitalizaciones, los síntomas respiratorios y los tratamientos sin supervisión médica. Nuestro estudio encontró resultados que no concuerdan entre los estudios epidemiológicos convencionales y aquellos que están relacionados al estudio del material particulado que surge de los incendios forestales. Resumimos los estimados recientes del costo, por unidad, de la mortalidad y la morbilidad y presentamos recomendaciones para los evaluadores.

Palabras clave: Estudios epidemiológicos, incendios forestales, material particulado, valoración del impacto en la salud.

Introducción

El riesgo potencial de la disminución de la calidad del aire durante los incendios forestales es una preocupación social seria. Muchos estudios documentan que los incendios forestales producen varios contaminantes del aire y muchas veces informan que la concentración ambiental de material particulado (MP) aumenta sustancialmente durante un incendio forestal. Los estudios epidemiológicos informan que el MP tiene un impacto significativo en la morbilidad y mortalidad. Esto sugiere que los incendios forestales pueden acarrear consigo riesgos considerables para la

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Investigador Post-doctoral, Department of Agricultural and Resource Economics, Colorado State University (e-mail: Ikuho.Kochi@colostate.edu)

³ Catedrático, Department of Agricultural and Resource Economics, Colorado State University (e-mail: John.Loomis@colostate.edu)

⁴ Economista, Rocky Mountain Research Station, U.S. Forest Service (e-mail: pchamp@fs.fed.us)

⁵ Investigador forestal, Portland Forestry Sciences Lab, U.S. Forest Service (e-mail: gdonovan@fs.fed.us)

salud. Evaluar el costo asociado a los daños a la salud que ocasionan los incendios forestales es crucial para determinar las políticas óptimas de manejo de incendios forestales. El calcular este costo económico supone varios pasos. Primero, el cambio en la calidad del aire debido al evento de fuego debe ser evaluado. Segundo, la relación entre los cambios en la calidad del aire y el impacto en la salud en las comunidades afectadas por los incendios forestales debe ser establecida para estimar el cambio total en la morbilidad y/o mortalidad debido a los incendios forestales. Tercero, el cambio estimado en la morbilidad y/o mortalidad debe ser medido en términos económicos. Cada aspecto del análisis económico requiere datos y procedimientos específicos.

Este estudio sintetiza la bibliografía sobre la salud y los efectos económicos relacionados con los incendios forestales y desarrolla una base para enfrentar los impactos de estos incendios sobre la salud y la economía. Nos enfocamos en tres asuntos: los resultados en la salud que habrán de evaluarse, si los estudios epidemiológicos de la contaminación del aire urbano se pueden aplicar a la evaluación de los daños a la salud por el humo de los incendios forestales, y en los descubrimientos recientes de los estudios de la valorización de la salud. Limitamos nuestra revisión de los estudios epidemiológicos a aquellos que tratan sobre el principal contaminante de los incendios forestales, el MP.

Cobertura de los resultados de la salud

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) enumera los posibles efectos en la salud de la exposición al MP (U.S.EPA 1999).⁵ Aunque los incendios forestales pueden tener como resultado una amplia gama de repercusiones sobre la salud, son pocos los estudios que examinan la distribución de los efectos de los incendios forestales en la salud. Anaman (2001) hizo una encuesta en una comunidad en Brunei, país que se encuentra en el sureste de Asia y que fue afectado por un incendio forestal grande que ocurrió en Indonesia entre 1997 y 1998 (de aquí en adelante le llamaremos a este evento la bruma del sureste asiático de 1997). Basándose en 102 hogares elegidos al azar, el autor encontró que en 2% de los hogares hubo que hospitalizar a un miembro del hogar y en 22.5% de los hogares algún miembro recibió cuidado ambulatorio debido a la bruma. De la muestra, un 6% informó que se trataron ellos mismos y 57% informó

⁵ El impacto potencial de la exposición al MP descrito en U.S.EPA (1999) incluye: mortalidad, bronquitis (crónica y aguda), casos nuevos de asma, hospitalizaciones relacionadas con problemas cardiorrespiratorios, visitas a las salas de emergencias, enfermedades del sistema respiratorio superior e inferior, síntomas respiratorios, días de actividad restringida, días de trabajo perdidos, estado de asma moderado o grave, mortalidad neonatal, cambios en la función pulmonar, enfermedades respiratorias crónicas, cambios morfológicos, alteraciones en el sistema inmunológico y cáncer.

que un miembro del hogar tuvo que ausentarse del trabajo o la escuela. No tenemos conocimiento de que se haya hecho una encuesta similar en Estados Unidos.

La *Tabla 1* resume los estudios anteriores que han evaluado el costo económico de los incendios forestales. Todas las tablas de este artículo están disponibles en: www.fs.fed.us/rm/value/puertoricowildfire.html. Ninguno de estos estudios cubre todos los efectos a la salud mencionados en el informe de 1999 de la EPA, sino que seleccionan los efectos en la salud según la información disponible. El estimado de los costos de los efectos en la salud debido al humo de los incendios forestales va desde \$0.26 millones a \$1,201 millones⁶, según el tamaño del fuego y los efectos en la salud que se tomen en consideración.

Los estudios que se resumieron en la *Tabla 1* indican que hay varios efectos en la salud. Uno de los efectos más importantes es la mortalidad. Rittsma et al. (2005) estiman que un incendio corto y de escala moderada en Canadá ocasionó 2.6 casos adicionales de mortalidad y costó \$11 millones. El costo de esta mortalidad constituye más del 90% de todos los costos relacionados con la salud atribuibles a este incendio particular. Ya que algunos de los estudios que figuran en la *Tabla 1* no incluyen el costo de la mortalidad, pueden subestimar sustancialmente este costo a la salud.

Los días de trabajo perdidos, los días de actividad restringida y los días de actividad restringida menor son responsables del 34% al 74% de los costos totales. Las hospitalizaciones, los síntomas respiratorios y los tratamientos auto recetados son parte de los costos más importantes a la salud. Si no es posible medir cada uno de los impactos en la salud asociados a los incendios forestales, por lo menos la mortalidad y estos impactos en la morbilidad deben ser evaluados.

Estudios epidemiológicos: contaminación del aire urbano versus el humo de los incendios forestales

Hay un número considerable de estudios relacionados con el impacto en la salud del MP. Sin embargo, la mayoría de los estudios evalúan el impacto de niveles persistentes, bajos o moderados de MP que surgen de las fuentes de contaminación urbanas, como la quema de combustible fósil (de ahora en adelante nos referiremos a estos estudios de MP como estudios convencionales de MP). Los incendios forestales suelen causar niveles altos de MP por un tiempo corto debido a la quema de la vegetación. Es importante determinar si hay diferencias en el impacto a la salud entre la exposición al MP debido a la contaminación urbana y la exposición a MP por los incendios forestales. Si no hay diferencias, entonces podemos usar la función dosis-

⁶ Todos los valores monetarios en este artículo fueron convertidos según el valor del dólar americano en el 2007 según el Índice de Precios de Consumo.

respuesta de los estudios convencionales de MP para estimar el nivel del daño a la salud por los incendios forestales.

Para examinar este asunto, en las próximas secciones compararemos los resultados de los estudios convencionales de MP con los estudios de los impactos en la salud de los incendios forestales. Ya que la bibliografía de estudios convencionales de MP es sustancial, vamos a usar principalmente la revisión bibliográfica de la EPA (U.S.EPA 2004) y la de Pope y Dockery (2006) como referencia para el impacto del MP en la mortalidad, admisiones a los hospitales y a salas de emergencia.

Estudios convencionales de MP

La *Tabla 2* resume las conclusiones a las que llegaron los estudios seleccionados sobre los efectos en la salud de la exposición a corto plazo a MP⁷ de los artículos de la EPA (U.S.EPA 2004) y el de Pope y Dockery (2006). Los estudios convencionales de MP suelen encontrar un impacto estadísticamente significativo de la exposición a corto plazo a MP sobre la mortalidad, las hospitalizaciones por razones cardiorrespiratorias y asma y las visitas a las salas de emergencia, aunque el impacto estimado es relativamente pequeño. El impacto en la salud está ligado a la edad y a la enfermedad. Por lo general, el impacto de la exposición a MP en las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio es mayor que el impacto en las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular. De las hospitalizaciones relacionadas con enfermedades del sistema respiratorio causadas por la exposición a MP, el asma y la pulmonía tienen un riesgo mayor que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El riesgo excesivo de ingresos a salas de emergencia relacionados con el asma también es significativo según aumentan los niveles de MP.

No hay muchos estudios que examinen la relación entre los días de actividad restringida y el nivel de MP. Ostro y Rothschild (1989) usan la información de la Encuesta Nacional de Salud, una encuesta continua del estado de la salud de la población de Estados Unidos recopilada por el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud. Ellos encontraron que un aumento en el MP de 1ug/m³ aumenta los días de actividad restringida (DAR)⁸ en un 1.58% y los días de menor restricción en la actividad (DMRA)⁹ en un 0.82% en una muestra de personas entre los 18 y 65 años de edad.

⁸ DAR se define como “cualquier día en el que un encuestado fue obligado a alterar su actividad normal e informó una condición respiratoria grave. Incluye los días de trabajo perdidos o de incapacidad al igual que restricciones menores” (p 239)

⁹ DMRA se define como “un día de actividad restringida que no tiene como consecuencia la pérdida de trabajo o la incapacidad y por lo tanto involucra condiciones menores y menores reducciones en el nivel diario de actividad” (p 239).

Estudios del impacto en la salud de los incendios forestales

Las *Tablas 3, 4 y 5* muestran los estudios epidemiológicos que examinan la asociación entre los eventos de incendios forestales y la mortalidad, las hospitalizaciones y las visitas a las salas de emergencia, respectivamente. Solamente incluimos los estudios que examinan la significación estadística de los resultados.¹⁰ En las tablas, los estudios se enumeran por el método de estimación utilizado y el orden del nivel máximo de MP documentado en el evento del incendio forestal (del mínimo al máximo). Mientras que los estudios de MP convencionales estudiados en este artículo usan el método de análisis de series cronológicas, los estudios de impacto de los incendios forestales sobre la salud usan el método de control histórico. El método de control histórico compara el total o nivel promedio del efecto en la salud durante el periodo del evento con un periodo control de duración similar.

Mientras que los estudios de MP convencionales encuentran un impacto positivo, estadísticamente significativo, en la mortalidad y morbilidad por la exposición, en periodos cortos, al MP, no todos los estudios de impacto en la salud de los incendios forestales encontraron impactos estadísticamente significativos. Entre los estudios de impacto en la mortalidad (*Tabla 3*), solamente 2 de los 6 estudios encontraron un aumento significativo en el nivel de la mortalidad durante un evento de incendio forestal.¹¹ En cuanto a los estudios de las hospitalizaciones (*Tabla 4*), mientras que los estudios que consideraron el impacto en las enfermedades respiratorias encontraron un impacto significativo, solamente 2 de los 6 estudios consideraron que los episodios de asma podrían atribuirse al evento del incendio forestal. Uno de los 2 estudios que consideraron los impactos en el sistema cardiovascular encontró un aumento significativo en las hospitalizaciones durante los eventos de incendios forestales. Entre los estudios de las visitas a las salas de emergencia (*Tabla 5*), 7 de los 13 estudios que consideraron los impactos relacionados con el asma, 9 de los 13 estudios que consideraron los impactos relacionados con el sistema respiratorio y ninguno de los 3 estudios que consideraron los efectos en el sistema cardiovascular encontraron un aumento significativo en las visitas a las salas de emergencia durante los eventos de incendios forestales.

Ya que muchos de los estudios sobre el impacto de los incendios forestales en la salud usan unidades diferentes para presentar el impacto de la exposición al humo de

¹⁰ Naeher et ál. (2007) también ofrecen una revisión exhaustiva de los estudios epidemiológicos sobre los incendios en la vegetación y sobre los incendios controlados en laboratorio del humo de la madera, el efecto en la salud de la quema de madera residencial, la toxicología y la naturaleza física y química del humo de la madera. Nuestro estudio amplía sus revisiones bibliográficas sobre mortalidad, hospitalizaciones, y visitas a las salas de emergencia al añadir estudios que no están incluidos y al añadir también la estructura analítica.

¹¹ Si en un mismo estudio el autor o los autores usan métodos de análisis diferentes, lugares diferentes de estudio o muestras diferentes (excepto para la categoría de edad) contamos el cálculo de los resultados como si proviniesen de estudios individuales.

los incendios forestales, sus resultados no suelen ser comparables con el impacto del MP de U.S.EPA (2004). Discutiremos brevemente los estudios que muestran resultados comparables.

Sastry (2002) estudió el impacto en la mortalidad de la bruma del sureste asiático de 1997 en la población de Malasia con el modelo de análisis de series cronológicas. El autor encontró una asociación estadísticamente significativa y positiva entre el MP y los niveles de mortalidad de los ancianos. La magnitud del impacto en la mortalidad es significativo solamente después de los días de mayor contaminación (MP diario = 200ug/m³). El incluir los días con niveles más bajos de MP debilita los resultados. Esto contrasta con el hecho de que los estudios convencionales de MP encuentran un impacto significativo con niveles menores de MP.

En general, tenemos muy poca evidencia sobre el efecto en la mortalidad de los eventos de incendios forestales. Kunji et ál. (2002) también informaron un efecto menor en la mortalidad del humo de los incendios forestales que el de la contaminación urbana. Kunji y otros informaron de 527 muertes durante la bruma del sureste asiático de 1997 en las áreas afectadas de Indonesia mientras que los estudios convencionales de MP que usan las pautas de la Organización Mundial de la Salud predijeron 15,000 muertes.

Johnston et ál. (2002) y Chen et ál. (2006) estudiaron el efecto de los eventos prolongados de incendios forestales en las visitas a las salas de emergencia en Australia. Ambos estudios encontraron un impacto mayor en la salud durante los periodos de incendios forestales que los que encontraron los estudios convencionales de MP. Sin embargo, Chen et ál. (2006) también encontraron un riesgo relativamente alto del MP en los periodos en los que no hubo incendios forestales, lo que indica un posible efecto mayor en Australia en comparación con los Estados Unidos. Cançado et ál. (2006) estudian el efecto de un fuego en un cañaveral sobre los ingresos en hospitales y encuentran un impacto significativo en los niños y los ancianos. Chen et ál. (2006) y Cançado et ál. también encontraron un riesgo mayor durante los periodos de incendios que durante los periodos sin incendios.

Los estudios que se basaron en las hospitalizaciones y las visitas a las salas de emergencia suministraron evidencia desigual sobre el riesgo a la salud a consecuencia de los incendios forestales. Varios estudios no encontraron un efecto significativo en la salud, mientras que otros sugieren un mayor peligro del humo de los incendios forestales. Por último, Sastry (2002) y Johnston et ál. (2002) encontraron un impacto no lineal de la exposición al MP proveniente de los incendios forestales en las que los efectos en la salud fueron significativos solamente cuando el MP alcanzaba ciertos niveles.

Diferencias entre los estudios convencionales de MP y los estudios del MP proveniente de los incendios forestales

Vedal y Dutton (2006) y otros investigadores discuten las razones potenciales para las incongruencias entre los estudios de MP convencionales y los estudios del MP proveniente de los incendios forestales. Las siguientes cinco explicaciones pueden tener particular importancia: 1) la selección del modelo estadístico, 2) la composición química, 3) la no linealidad de la función dosis-respuesta del MP, 4) el comportamiento de evasión y 5) la percepción de los riesgos para la salud. Discutiremos cada explicación brevemente.

La primera explicación para la falta de concordancia entre los resultados de los estudios convencionales de MP y los estudios del MP proveniente de los incendios forestales es el uso de métodos estadísticos diferentes. Los estudios convencionales de MP suelen usar el método de análisis de series cronológicas con un periodo de observación largo. Una muestra amplia le permite al investigador detectar un pequeño impacto en la salud de una exposición corta al MP¹². El método de control histórico, muchas veces utilizado en los estudios del impacto en la salud de los incendios forestales, compara el total o el promedio de los resultados en la salud durante los periodos de estudio y los periodos control. Cuando los resultados en la salud muestran una pequeña variación en un lapso de tiempo es difícil determinar un impacto pequeño en la salud con este método. De hecho, ninguno de los estudios de control histórico que evaluaron el impacto en la mortalidad de las hospitalizaciones por asma tuvo resultados significativos, posiblemente por la falta de poder estadístico.

Aún con el modelo de análisis de series cronológicas, el estudio del impacto de los incendios forestales en la salud supone un reto. Los eventos de incendios forestales suelen ser cortos y es difícil estudiar por separado el impacto en la salud de los eventos de incendios forestales con el modelo de análisis de series cronológicas debido al pequeño número de observaciones de interés. Los estudios que encuentran un aumento significativo en la mortalidad y las hospitalizaciones durante los periodos de los incendios forestales tienden a usar periodos de observación largos (Sasthy usa de 13 a 33 días afectados por el humo y Chen et ál. usan 452).

La segunda explicación es que hay una diferencia entre la composición química de la contaminación del aire urbano y el humo de los incendios forestales. Vedal y Dutton (2006) exponen que la quema de combustible fósil suele contener partículas tóxicas, como metal, por ejemplo, y, por lo tanto, puede ser más peligrosa que la quema de vegetación. Sin embargo, Mar et ál. (2000) no encontraron diferencias

¹² Ver también Vedal y Dutton (2006) para la discusión de sesgos potenciales en modelos convencionales de MP con el análisis de series cronológicas.

significativas entre el impacto en la salud del MP de combustible fósil y el de la quema de vegetación. La diferencia que encontraron es que el efecto en la mortalidad de la quema de vegetación tiene un impacto a un plazo mayor de tiempo.¹³

La tercera explicación es la posible no linealidad de la función dosis-respuesta del MP. Los incendios forestales causan un nivel alto de MP en un tiempo corto mientras que la contaminación del aire urbano causa niveles persistentes, bajos o moderados de MP. La EPA (2004) concluyó que la función dosis-respuesta del MP es lineal en los niveles bajos o moderados. Sin embargo, la forma funcional sigue siendo incierta para la exposición a altos niveles de MP. Como indican varios estudios del impacto en la salud a consecuencia de los incendios forestales, es posible que tengamos una función dosis-respuesta no lineal en niveles altos de exposición al MP. Si es este el caso, el aplicar la función dosis-respuesta de niveles bajos o moderados de exposición al MP para estimar el impacto en la salud de exposiciones a niveles altos de MP crearía un sesgo sustancial en los resultados.

La cuarta explicación es la posibilidad de comportamiento de evasión entre los residentes de las áreas afectadas por el humo en un evento de incendio forestal. Los estudios encontraron que los individuos, particularmente aquellos que son sensibles a la contaminación del aire, toman medidas de evasión cuando los niveles de contaminación en el aire son altos (Bresnahan et ál. 1997, Künzli et ál. 2007). Ya que los eventos de incendios forestales grandes reciben mucha publicidad por los medios y/o el gobierno y el humo es visible, las personas pueden tomar medidas para evitar la exposición a la contaminación del aire más de lo usual. Si las personas toman más medidas de evasión durante los eventos de incendios forestales que cuando no los hay, la exposición al MP es menor y por lo tanto los impactos en la salud son menores en niveles dados de MP exterior.¹⁴

La quinta razón es la posibilidad de diferencias en la percepción de los riesgos a la salud de la contaminación del aire urbano y de los riesgos a la salud que presentan los eventos de incendios forestales. Lipsett et ál. (1994) encontraron que las personas sin evidencia física de enfermedad visitaron las salas de emergencias aproximadamente cuatro veces más de lo usual durante un evento grande de incendio urbano. Este hallazgo indica que la percepción de la seriedad de una enfermedad aumenta dramáticamente durante un evento de fuego grande. Este factor no afecta el

¹³ Un asunto relacionado es la diferencia en el tamaño de las partículas de la contaminación del aire urbano y el humo de los incendios forestales. El humo de los incendios forestales está principalmente formado por partículas finas que miden menos de 2.5 micrómetros de diámetro (Ward, 1999). Algunos estudios sugieren que estas partículas finas son más peligrosas que las partículas más gruesas (2.5-10 micrómetros de diámetro) (U.S.EPA 2004). Si este fuese el caso, y la contaminación del aire urbano tiene una mayor proporción de partículas gruesas que el humo de los incendios forestales, el humo de los incendios forestales sería más peligroso que la contaminación del aire urbano.

¹⁴ Ver también Vedal y Dutton (2006) para la discusión de la efectividad de los comportamientos de evasión durante los eventos de incendios forestales.

nivel de la mortalidad y probablemente tampoco afecte la cantidad de hospitalizaciones. Sin embargo, otros impactos relativamente menores en la salud, como las visitas a las salas de emergencias y los síntomas percibidos de enfermedades cardiorrespiratorias pueden afectarse sustancialmente por la sobrestimación del riesgo a la salud de los incendios forestales.

Investigaciones futuras

Quedan muchas dudas sobre los riesgos a la salud que presenta el humo de los incendios forestales. Muchos estudios sobre la mortalidad y varios de los estudios sobre las hospitalizaciones y las visitas a las salas de emergencia no encuentran un impacto significativo en la salud, aunque los estudios de MP convencionales predicen impactos significativos. Cuando se encuentran resultados significativos en los estudios del impacto en la salud de los incendios forestales, los resultados no concuerdan con los de los estudios convencionales de MP.

El nivel del impacto del MP en la salud sería afectado no solamente por los niveles de MP si no también por las características de la población afectada y el diseño del estudio. La comparación estricta entre los resultados de estudios de MP convencionales previos y los estudios del impacto en la salud de los incendios forestales se dificulta por la diferencia entre las muestras de la población y los diseños de los estudios. Los estudios futuros deberían evaluar el impacto en la salud ocasionado por el humo de los incendios forestales y la contaminación del aire urbano con el mismo diseño de estudio y con las mismas muestras. Tales estudios han sido publicados por Chen et ál. (2006) y Cançado et ál. (2006) con muestras australianas y brasileñas, pero no se han hecho tales estudios con una muestra de los Estados Unidos. El estudiar el impacto en la salud que tienen los incendios forestales grandes y frecuentes (o repetidos) cerca de áreas urbanas podría ser la clave para obtener resultados significativos, ya que es posible que la variación en el impacto en la salud no sea lo suficientemente amplia durante los incendios cortos o pequeños.

El usar el modelo de análisis de series cronológicas es el acercamiento preferible para evaluar el impacto en la salud a consecuencia de los incendios forestales. Es más probable que este modelo detecte cambios significativos a menor escala en la salud durante el periodo del incendio forestal que el método de control histórico. El modelo de series cronológicas puede probar diferentes hipótesis sobre cuáles de los cinco factores a los que nos referimos anteriormente tiene un papel fundamental en las diferencias observadas en el impacto en la salud del humo de los incendios forestales y la contaminación del aire urbano. Otro beneficio de usar el análisis de series cronológicas es que la función dosis-respuesta obtenida a través de este método se puede usar fácilmente para evaluar el impacto en la salud de diferentes eventos de incendios forestales. Sin embargo, este método requiere un mínimo de observaciones

de un “día de incendio forestal” que puede dificultar su aplicación.

Otro estudio potencialmente útil sería un análisis de metaregresión que use varios estudios de los impactos en la salud de los incendios forestales. El impacto en la salud total estimado de los incendios forestales sería la variable dependiente y los niveles de MP exterior y otros contaminantes, las características de las poblaciones afectadas y las clases de combustibles serían las variables independientes. Este acercamiento les permitiría a los investigadores estimar el impacto en la salud de los incendios forestales futuros luego de hacer los ajustes requeridos por las características de las poblaciones afectadas y las clases de combustibles. Para obtener un buen modelo de metaregresión necesitamos acumular más estudios del impacto en la salud de los incendios forestales en América del Norte con una presentación sistemática del impacto en la salud.

El encuestar comunidades sobre su experiencia con síntomas cardiorrespiratorios y los comportamientos de evasión durante un evento de incendio forestal, al igual que la percepción de los riesgos asociados con los incendios forestales, nos ayudará a estimar el impacto potencial en términos de síntomas cardiorrespiratorios y días de actividad restringida, y a mejorar nuestra comprensión de la potencial disparidad de los impactos en la salud del humo de los incendios forestales y de la contaminación del aire urbano.

Evaluación económica

El daño a la salud por los eventos de incendios forestales le causa costos directos e indirectos a la sociedad. Freeman (2003) divide los costos asociados al daño en la salud en cuatro categorías: 1. costos médicos, 2. costos laborales, 3. costos de aversión y 4. pérdida de utilidad (incomodidad, sufrimiento). Del punto de vista de la eficiencia económica, el costo total asociado con los daños a la salud debería calcularse por lo que el individuo estaría dispuesto a pagar para evitar esos daños a la salud. La EPA usa la bibliografía de valoración de la salud para enumerar los posibles costos por unidad de los efectos en la salud, como se muestra en la *Tabla 6*. En esta sección repasaremos la bibliografía más reciente de valoración de la salud y examinaremos si la lista de la EPA debería ser modificada.

Valoración de la mortalidad

El valor monetario de prevenir la mortalidad se mide como el valor de una vida estadística (VVE). El VVE es igual a la cantidad que la sociedad está dispuesta a pagar para salvar la vida de un desconocido. Viscusi (1992) ofrece un examen comprehensivo de la bibliografía sobre el tema del VVE. La EPA (1999) usa el valor

promedio de los 26 estimados del VVE seleccionados por Viscusi, \$7.6 millones, para evaluar el beneficio en la mortalidad del control de la contaminación del aire. De los 26 estimados del VVE, 21 están basados en información del mercado laboral y 5 están basados en estudios de encuestas. Luego, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos actualizó el VVE en \$6.8 millones basándose solamente en los estudios del mercado laboral (U.S.EPA 2005).

Los estudios recientes han encontrado que los estudios del mercado laboral utilizados en el análisis de la EPA (1999, 2005) probablemente sobreestimaron el VVE actual debido a especificaciones erróneas en el modelo. Kniesner et ál. (2006) y Kochi (2006) corrigieron el sesgo y calculan un VVE revisado de \$5.4 millones y \$2 millones respectivamente. Otros estudios recientes encontraron que el VVE no depende de la edad, sino de la salud de la población de Estados Unidos (Alberini et ál. 2004). El VVE promedio estimado por Alberini et ál. (2004) está entre \$0.87 y \$5.99 millones para la población de los Estados Unidos.

En conclusión, estos estudios recientes sugieren que una escala posible para el VVE es de entre \$1 a \$6 millones con un ajuste para la porción de la población con problemas de la salud previos.

Valoración de la morbilidad

La valoración de la morbilidad es más complicada que la valoración de la mortalidad, por la diferencia en los posibles impactos en la salud y sus diferentes niveles de duración y severidad. Un examen detallado de los métodos de valoración de la morbilidad se encuentra en Tolley et ál. (1994) y Dickie y Gerking (2002). La EPA (1999) fija el costo por unidad de la morbilidad estimada basándose en el método de costo de la enfermedad (CE) o el método de valoración contingente (VC). El CE estima solamente los gastos directos asociados con las enfermedades como, por ejemplo, los costos médicos y la pérdida de salario asociada a las enfermedades. El método VC mide la disponibilidad a pagar (DAP) de las personas para prevenir la ocurrencia hipotética de una enfermedad.

La EPA (1999) usa \$10,000 o \$15,000 como el costo relacionado con las hospitalizaciones por síntomas cardiorrespiratorios basándose en el CE convencional que incluye los costos médicos directos y la pérdida de trabajo durante la hospitalización. Un estudio reciente de Chestnut et ál. (2006) encontró que el tiempo que pierden los pacientes de enfermedades cardiorrespiratorias durante el periodo de recuperación en el hogar es cinco veces más largo que el tiempo que pierden durante las hospitalizaciones. Al añadir los valores de CE incurridos durante el periodo de recuperación, la disminución de la producción en el hogar y los costos asociados con los cuidadores incrementa los estimados convencionales de CE de un 9 a un 10 por

ciento.¹⁵

Las necesidades estimadas de CE necesitan ser convertidas a DAP. Una proporción común de DAP/CE es de 2 a 3.¹⁶ En un evento de hospitalización, la mayoría de los gastos médicos son pagados por las aseguradoras y algunos pacientes tienen días de enfermedad. La conversión a DAP debe basarse en los desembolsos del paciente relacionados con la hospitalización y no basados en los gastos de terceras personas. Por lo tanto, las medidas económicas de la hospitalización deberían ser la suma del CE y la DAP individual, según sugirieron Chestnut et ál. (2006).

Estos problemas también aplican al estimado de los costos de las visitas a las salas de emergencias. La EPA (1999) usa la medida convencional de CE. Esta medida excluye los gastos asociados con los cuidadores, los costos incurridos durante el periodo de recuperación y la reducción en la utilidad del paciente. Ya que ningún estudio ha evaluado esta parte del costo de las visitas a las salas de emergencia, el resultado de Chestnut et ál. (2006) puede ser utilizado para obtener los valores completos de CE. Además, las medidas de CE deberían convertirse a DAP.

Dickie y Gerking (2002) enumeran los estudios seleccionados que estiman la DAP para prevenir síntomas cardiorrespiratorios graves con el método VC. La *Tabla 7* modifica la lista de Dickie y Gerking al incluir estudios y estimados un poco diferentes. Como fuera señalado por Dickie y Gerking (2002), los valores de CE que utiliza la EPA (1999) suelen ser menores que los valores estimados más recientes. Por ejemplo, la EPA estima \$75 por cada caso agudo de bronquitis. Dickie y Messman (2001) calculan la DAP para prevenir un caso grave de bronquitis de 6 días¹⁷ en \$201 (valor de la mediana) y Navrud (2001)¹⁸ estima que la DAP para reducir un caso agudo de bronquitis de 14 días es de \$82 (valor de la media). La media de la DAP para reducir un ataque de asma que emplea la EPA es de \$50. Navrud (2001) informa que la media de DAP para reducir un ataque de asma es de \$236.

La EPA emplea \$28 como la DAP para evitar síntomas respiratorios agudos por día, mientras que Dickie y Messman (2004) lo estiman en \$90. La EPA usa \$8 como la DAP de evitar un día de falta de aliento, presión en el pecho o respiración

¹⁵ El CE por hospitalización también depende de la edad del paciente y de la categoría de la enfermedad. Los ancianos (mayores de 65 años) tienen CE más bajos que los pacientes más jóvenes por el menor valor de los días de trabajo perdidos.

¹⁶ Hrudey et ál. (2004) sugirieron el uso de la relación DAP/CE de 2 a 3 para calcular el beneficio del control de la contaminación del aire en Canadá. Hon (1999) y Ruitenbeek (1999) usan una relación de DAP/CE de 2.

¹⁷ Los autores encontraron que, en la muestra, los síntomas agudos de la bronquitis duran un promedio de 7 días.

¹⁸ Navrud (2001) usa muestras de Noruega. Los autores advierten que los cálculos de este estudio pueden subestimar la DAP para la población de los Estados Unidos debido a las diferencias en los sistemas de cuidado de la salud.

sibilante. Dickie y Messman (2004) reportan que la media de la DAP para evitar 6 días de falta de respiración y presión en el pecho es de \$130 (\$22 diarios) y de \$101 (\$16.8 diarios), respectivamente. Navrud (2001) la estimó en \$39 (valor de la media) y \$15 (valor de la mediana) para evitar un día de falta de aliento.

No se sabe con certeza por qué los estudios más recientes tienen un estimado mayor de la DAP que los anteriores. Sin embargo, los estudios recientes han incorporado adelantos metodológicos de la evaluación de la morbilidad y se les debe dar más peso en la determinación del valor de la morbilidad para evaluar las políticas relacionadas con la salud. Por lo tanto, la lista de los valores de morbilidad de la EPA debe actualizarse para que refleje estos nuevos descubrimientos. Quizás la mejor manera de incorporar los resultados de diferentes estudios es estimar un modelo de metaregresión con los estudios existentes de valoración de la morbilidad. El modelo de metaregresión les permitiría a los investigadores obtener la DAP para cada resultado de morbilidad según su severidad y duración, luego de tomar en consideración las diferencias en diseño de los estudios existentes de validación (Van Houtven et ál. 2006).

Finalmente, Dickie y Messman (2002) y Navrud (2001) encontraron que la DAP para prevenir la morbilidad de los niños es sustancialmente mayor que la de los adultos. Esto indica la importancia de valorar el impacto de la morbilidad de los adultos y de los niños por separado.

Recomendaciones

En este artículo revisamos tres factores importantes del análisis económico del impacto de los incendios forestales en la salud: los impactos claves en la salud, la asociación del humo de los incendios forestales con el impacto en la salud y la valoración de los efectos en la salud. Encontramos que los impactos claves en la salud son la mortalidad, los días de actividad restringida (incluidos los días de trabajo perdidos), las hospitalizaciones, los síntomas respiratorios y el tratamiento sin supervisión médica. Nuestro examen de la bibliografía de los estudios epidemiológicos convencionales de MP y del MP relacionado con los incendios forestales plantea la importante pregunta de si los resultados de los estudios epidemiológicos convencionales de MP pueden ser utilizados para evaluar el impacto en la salud a consecuencia de los incendios forestales.

Por el momento, no recomendamos la aplicación de los estudios epidemiológicos convencionales de MP a la evaluación del impacto en la mortalidad ocasionado por los incendios forestales. Aunque los estudios epidemiológicos convencionales de MP suelen mostrar aumentos en la mortalidad estadísticamente significativos asociados con exposiciones a corto plazo a MP, la mayoría de los

estudios del MP de los incendios forestales no halló resultados similares. El usar solamente los resultados epidemiológicos convencionales podría sobrestimar sustancialmente el costo de la mortalidad asociado con un evento de incendio forestal.

Ya que la mortalidad se asocia a un costo social muy grande, la estimación del impacto de la mortalidad debido a los eventos de incendios forestales requiere extrema precaución. Si la escala del incendio forestal es relativamente pequeña y corta, los evaluadores podrían querer presumir que no hay impacto en la mortalidad por el humo del incendio forestal a la vez que notan que hay una subestimación potencial del costo al excluir el impacto en la mortalidad o llevar a cabo un estudio epidemiológico original. Recomendamos el uso del estimado del VVE de \$1 a \$6 millones para evaluar el costo social de la mortalidad, si alguno.

Para estimar los cambios de los impactos claves en la morbilidad de los eventos de incendios forestales, los evaluadores podrían querer usar, por el momento, los resultados de los estudios epidemiológicos convencionales de MP o llevar a cabo estudios epidemiológicos nuevos. No tenemos estudios que evalúen el impacto de los incendios forestales en los días de actividad restringida en los Estados Unidos. Tenemos algunos estudios de las hospitalizaciones y muy pocos estudios sobre los síntomas cardiorrespiratorios (que no se discutieron en este artículo) en relación con los eventos de incendios forestales. Sin embargo, es difícil concluir que existe una asociación general entre el evento de un incendio forestal y su impacto en la morbilidad debido a las limitaciones en los diseños de los estudios estudiados. Es importante recordar que el impacto en la salud de la contaminación del aire urbano y el de los eventos de incendios forestales puede ser diferente y que el análisis del impacto en la morbilidad basado en los estudios convencionales de MP todavía está sujeto a esta incertidumbre.

Recomendamos el uso del costo por unidad de las hospitalizaciones y de los síntomas cardiorrespiratorios que reflejen los descubrimientos recientes con énfasis en los estudios en los Estados Unidos. Las hospitalizaciones deben basarse en la totalidad de los gastos médicos y pérdida de días de trabajo durante la hospitalización y el periodo de recuperación. Para convertir los valores de CE a DAP, los evaluadores podrían usar proporciones de 2 a 3 DAP/CE. Los evaluadores podrían usar los valores por unidad de los síntomas respiratorios estimados en Dickie y Messman (2004) cuando estén disponibles. Este estudio calcula valores por unidad exhaustivos de los síntomas respiratorios con un método de valoración de la salud mejorado y que usa una muestra amplia de la población de los Estados Unidos. Los evaluadores también podrían llevar a cabo un análisis de metaregresión basándose en los estudio de morbilidad previos para determinar el valor apropiado según la severidad y duración de los síntomas luego de controlar para las diferencias en el

diseño del estudio. Ya que el impacto en la salud y los costos relacionados con la salud han de ser diferentes entre los niños y los adultos, los evaluadores deberían llevar a cabo estudios separados del impacto en la salud en los adultos y en los niños.

Referencias

- Alberini, A.; Cropper, M.; Krupnick, A.; Simon, N.B. 2004. Does the value of a statistical life vary with age and health status? Evidence from the US and Canada. *Journal of Environmental Economics and Management*. 48: 769-792.
- Anaman, K.A. 2001. Urban householder's assessment of the causes, responses, and economic impact of the 1998 haze-related air pollution episode in Brunei Darussalam. *ASEAN Economic Bulletin* 18(2): 193-205.
- Bresnahan, B.W.; Dickie, M.; Gerking, S. 1997. **Averting behavior and urban air pollution. *Land Economics***. 73(3): 340-357.
- Cançado, J.E.D.; Saldiva, P.H.N.; Pereira, L.A.A.; Lara, L.B.L.S.; Artaxo, P.; Martinelli, L.A.; Arbex, M.A.; Zanobetti, A.; Braga, A.L.F. 2006. **The impact of sugar cane-burning emissions on the respiratory system of children and the elderly.** *Environmental Health Perspectives*. 114(5): 725-729.
- Chen, L.; Verrall, K.; Tong, S. 2006. **Air particulate pollution due to bushfires and respiratory hospital admissions in Brisbane, Australia.** *International Journal of Environmental Health Research*. 16(3): 181-191.
- Chestnut, L.G.; Thayer, M.A.; Lazo, J. K.; Eeden, S.K.V.D. 2006. **The Economic Value of Preventing Respiratory and Cardiovascular Hospitalization.** *Contemporary Economic Policy*. 24(1): 127-143.
- Dickie, M.; Gerking, S. 2002. Willingness to pay for reduced morbidity. Unpublished manuscript prepared for the workshop, "Economic valuation of health for environmental policy: assessing alternative approaches"; 2002 March 18-19; Orlando, FL.
- Dickie, M.; Messman, V.L. 2004. **Parental altruism and the value of avoiding acute illness: Are kids worth more than parents?.** *Journal of Environmental Economics and Management*. 48: 1146-1174.
- Freeman, A.M. III. 2003. **The measurements of environmental and resource values: Theory and methods.** RFF Press.; 420p.
- Hrudey, S.E.; Adamowicz, V.; Dales, R.; Hale, B.A.; Krupnick, A.J.; Lippman, M., McConnell, J.; Renzi, P. 2004. **Report of expert panel to review the socio-economic models and related components supporting the development of Canada-wide**

- standards (CWS) for particulate matter (PM) and ozone to The Royal Society of Canada.** Journal of Toxicology and Environmental Health. Part B. 7: 147-266.
- Hon, P.M.L. 1999. **Singapore.** In: Glover, D.; Jessup, T., editor. The cost of catastrophe. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies; 51-85.
- Johnston, F.H.; Kavanagh, A.M.; Bowman, D.M.J.S.; Scott, R.K. 2002. **Exposure to bushfire smoke and asthma: an ecological study.** The Medical Journal of Australia. 176: 535-538.
- Kniesner, T.J.; Viscusi, W.K.; Woock, C.; Ziliak, J.P. 2006. Pinning down the Value of Statistical Life. Manuscrito inédito.
- Kochi, I. 2006. **Essays on the value of a statistical life.** Atlanta, GA: Georgia State University; 161p. Disertación doctoral.
- Kunji, O.; Kanagawa, S.; Yajima, I.; Hisamatsu, Y. 2002. **The 1997 Haze disaster in Indonesia: Its air quality and health effects.** Archives of Environmental Health. 57(1): 16-22.
- Künzli, N.; Avol, E.; Wu, J.; Gauderman, W.J.; Rappaport, E.; Millstein, J.; Bennion, J.; McConnell, R.; Gilliland, F.D.; Berhane, F.; Lurmann, F.; Winner, A.; Peters, J.M. 2006. **Health effects of the 2003 Southern California wildfires on children.** American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 174(11): 1221-1228.
- Lipsett, M.; Waller, K.; Shusterman, D.; Thollaug, S.; Brunner, W. 1994. **The respiratory health impact of a large Urban Fire.** American Journal of Public Health. 84(3): 434-438.
- Naeher, L.P.; Brauer, M.; Lipsett, M.; Zelikoff, J.T.; Simpson, C.D.; Koenig, J.Q.; Smith, K.R. 2007. **Woodsmoke health effects: A review.** Inhalation Toxicology. 19: 67-106.
- Mar, T.F.; Norris, G.A.; Koenig, J.Q.; Larson, T.V. 2000. **Associations between air pollution and mortality in Phoenix, 1995-1997.** Environmental Health Perspectives. 108: 347-353.
- Navrud, S. (2001). **Valuing health impacts from air pollution in Europe.** Environmental and Resource Economics. 20: 305-326.
- Ostro, B.D.; Rothschild, S. 1989. **Air pollution and acute respiratory morbidity: An observational study of multiple pollutants.** Environmental Research. 50: 238-247.
- Pope III, C.A.; Dockery, D.W. 2006. **Health effects of fine particulate air pollution: Lines that connect.** Journal of the Air & Waste Management Association. 56: 709-742.
- Rittmaster, R.; Adamowicz, W.L.; Amiro, B.; Pelletier, R.T. 2006. **Economic analysis of health effects from forest fires.** Canadian Journal of Forest Research. 36: 1-38.

- Ruitenbeek, J. 1999. **Indonesia**. In: Glover, D.; Jessup, T., editor. The cost of catastrophe. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies; 86-129.
- Sastry, N. 2002. **Forest fires, air Pollution, and mortality in Southeast Asia**. Demography. 39(1): 1-23.
- Smith, M.A.; Jalaludin, B.; Byles, J.E.; Lim, L.; Leeder, S.R. 1996. **Asthma presentations to emergency departments in western Sydney during the January 1994 bushfires**. International Journal of Epidemiology. 25(6):1227-1236.
- Tolley, G.S.; Kenkel, D.; Fabian, R. 1994. **Valuing health for policy: An economic approach**. University of Chicago.; 422p.
- U.S. Environmental Protection Agency. 1999. **The benefits and costs of the Clean Air Act 1990 to 2010**. Washington D.C.: USEPA.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2004. **Air quality criteria for particulate matter**. Washington D.C.: U.S.EPA.
- U.S. Environmental Protection Agency. 2005. **Regulatory impact analysis for the final Clean Air Interstate Rule**. Washington D.C.: U.S.EPA.
- Van Houtven, G.; Powers, J.; Jessup, A.; & Yang, J.C. 2006. **Valuing avoided morbidity using meta-regression analysis: What can health status measures and QALYs tell us about WTP?**. Health Economics. 15: 775-795.
- Vedal, S.; Dutton, S.J. 2006. **Wildfire air pollution and daily mortality in a large urban area**. Environmental Research. 102: 29-35.
- Viscusi, W.K. 1992. **Fatal tradeoffs: Public and private responsibilities for risk**. New York: Oxford University Press.; 306p.
- Ward, D.E. 1999. **Smoke from wildland fires**. In: Back ground paper for Health Guidelines for Vegetation Fire Events; 1998 October 6-9; Lima. Peru; WHO; 70-85.

El Desarrollo de una Base Probabilística en Apoyo a las Decisiones sobre el Manejo de Incendios Forestales¹

Yu Wei, Douglas Rideout²

Resumen

Esta investigación desarrolló un enfoque probabilístico como base a los procesos de toma de decisiones contra incendios en lo relativo a dónde llevar a cabo tratamientos preventivos del combustible y al manejo apropiado de incendios. Mediante simulaciones de incendios se pueden generar datos sobre el comportamiento espacial del fuego, tales como su dirección de propagación y su distribución según probabilidades relativas. Se usaron gráficos dirigidos para representar la dirección de propagación potencial de incendios entre localidades. En conjunto con otras cuestiones relacionadas con las pérdidas y ganancias provocadas por incendios, quienes toman las decisiones pueden usar este enfoque para decidir dónde reducir combustibles y analizar las ventajas y desventajas que ofrece cada método alternativo para el manejo de incendios. Independientemente de los incendios particulares, el tratamiento de combustibles se centrará en la previsión de pérdidas al nivel del terreno o en los posibles beneficios que los incendios suponen para el paisaje. Al ocurrir un incendio, se pueden analizar los efectos específicos del mismo a lo largo del tiempo, para determinar las estrategias de manejo adecuadas.

Palabras clave: Manejo de incendios, probabilidad, SIG.

Descripción del problema

La Política Federal para el Manejo de Incendios Forestales y la Revisión Programática (de 1995), así como la Política Federal Interagencial para el Manejo de Incendios sentaron las pautas para el desarrollo e implementación de una respuesta de manejo apropiada (RMA) que permitiera la consideración del manejo de incendios de manera que se protegieran aquellos recursos valiosos que corrían riesgo de daños, y que facilitara el papel natural del fuego en los ecosistemas, para mitigar el aumento del riesgo de incendios favorecidos por acumulaciones continuas de combustible. Los nuevos retos y oportunidades en el manejo de incendios han propiciado esfuerzos

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Catedrático Asociado y Catedrático, respectivamente, en el Departamento de Manejo de Bosques, Pastizales y Cuencas Hidrográficas de Colorado State University en Fort Collins, CO 80523.

crecientes que incluyen el desarrollo de nuevas herramientas de análisis y apoyo, capaces de integrar información espacio-temporal con el fin de proveer análisis de las ventajas y desventajas, basándose en costos y beneficios, a las unidades de planificación para casos de incendio.

A menudo, el manejo estratégico de incendios se lleva a cabo en el contexto del manejo de riesgo de incendios futuros cuya incidencia, intensidad y tamaño se ignoran. Aunque los incendios futuros son inciertos, es posible estimar su probabilidad, ubicación y nivel de intensidad mediante métodos establecidos para el cálculo de probabilidades y técnicas para la creación de modelos. Este sistema de apoyo en la toma de decisiones se desarrolló a partir de la creación, el análisis, y la manipulación estratégica de mapas explícitos que incluían distribuciones según la probabilidad y la intensidad de los incendios, y las expectativas en términos de pérdidas y ganancias. Se usó la simulación del comportamiento del fuego, basada en incendios reales, para generar información útil durante la planificación estratégica, pero el objetivo principal de nuestra investigación no es el manejo de incendios particulares.

Funciones básicas de la modelización

Este modelo fue diseñado con el objetivo primordial de ayudar a los manejadores de incendios a decidir qué lugares son apropiados para programar quemas prescritas o controladas, con el fin de reducir estratégicamente futuras pérdidas por fuego. También fue necesario planificar una ubicación para el tratamiento de combustibles y el uso del fuego, a fin de promover los beneficios de los incendios. Para lograr la integración de las pérdidas y los beneficios de los incendios, fue necesario desarrollar un sistema de evaluaciones económicamente fiable, incorporado a este sistema de modelos. Puesto que las decisiones tomadas probablemente tengan efectos a largo plazo sobre la distribución del riesgo de incendios en el terreno, este sistema también debe estar diseñado para brindar apoyo en el análisis de las desventajas, vistas en un marco temporal y según las distintas estrategias para el manejo de incendios.

A menudo, el manejo de incendios forestales requiere la toma de decisiones rápidas. En muchos casos, si hay que hacer concesiones al elegir entre la supresión y la utilización de un incendio, la opción más segura será la de “supresión total”, puesto que la extinción del fuego es inmediata, mientras que los beneficios de un incendio son futuros. Para estimular el uso de incendios como manera de reducir el riesgo de incendios futuros, diseñamos este sistema, que permite el análisis previo (o el concepto de “cuaderno de estrategias”) mediante la provisión de información exhaustiva sobre las probabilidades de incendio, las pérdidas potenciales y los beneficios derivables en un marco espacio-temporal.

El manejo de incendios y los análisis relacionados son complicados debido a la existencia de muchos factores determinantes, tales como las condiciones meteorológicas, el desarrollo de las condiciones del combustible, los costos y los beneficios asociados con la supresión de incendios y los programas para el manejo de combustibles. El desarrollo reciente de un sistema de información geográfica (SIG) y de programados para la creación de modelos de investigación operativa, nos proveen una oportunidad única para desarrollar una interfaz fácil de usar, que integre información y que también demuestre los resultados de manera que los manejadores y el público puedan visualizar las decisiones acerca del control de incendios y sus consecuencias.

Interfaz Gráfica para Usuarios

Diseñamos una interfaz gráfica para usuarios (IGU) usando VisualBasic.net. A través de esta IGU, los manejadores de incendios pueden llevar a cabo diferentes tipos de análisis con facilidad. El marco de la IGU principal incluye un mapa en el cual se aprecia información básica de los límites de cada unidad para el control de incendios, del nivel del terreno y de la cuadrícula sobre la que este sistema hará análisis futuros. Esta interfaz para usuarios también resume los cambios en los costos y beneficios esperados de cada incendio, según la decisión que se tome en cuanto al tratamiento de combustible o el pronóstico de área impactada por el fuego.

Figura 1 – La Interfaz Gráfica para Usuarios (IGU) usada en esta modelización.

El modelo también ofrece opciones a los usuarios para que determinen el contexto en que se toman las decisiones de manejo de incendios. A través de dos

formularios (fig. 2), los manejadores eligen distintas combinaciones de condiciones meteorológicas, duraciones de incendios predefinidas e información sobre beneficios y pérdidas.

Los usuarios también pueden indicar expectativas de períodos sin incendios. Los riesgos de ignición pueden tener una distribución uniforme en el terreno, o pueden redistribuirse mediante consulta a un registro histórico de igniciones. Los manejadores también tienen la opción de elegir el número de celdas de la cuadrícula en las que llevar a cabo el programa de reducción de combustibles. Investigaciones previas en el Parque Nacional de las Secuoyas han ayudado a clasificar el terreno según las prioridades en que deben llevarse a cabo los programas de reducción de combustibles. La prioridad en la reducción de combustible se clasificó en siete categorías, desde la más baja hasta la más alta, de las cuales „7’ es la más alta. Añadimos una opción que descarta aquellas celdas que los manejadores de la zona no consideren de mayor prioridad al implementar el programa de reducción de combustibles, de manera que los manejadores también tengan la oportunidad de incorporar esta información. Esta función les provee a los manejadores la flexibilidad de elegir hasta qué grado desean que sus decisiones estén fundamentadas en análisis previos realizados por la unidad para el control de incendios.

Tanto los beneficios como las pérdidas resultantes de incendios en cada celda fueron determinados según las variables cualitativas protegidas en cada una. Estas variables incluyen la Interfaz Urbano-Forestal (IUF), inquietudes sociales, el bosque, el bosque de secuoyas, y la zona natural silvestre. En cada celda, los beneficios de los incendios se determinaron siguiendo el criterio del uso del fuego para recuperar los tipos de vegetación deseados o simplemente para mantener los tipos de vegetación existentes. Los manejadores pueden escoger los beneficios y las pérdidas asociados con cada variable cualitativa, según distintos niveles de intensidad, antes de aplicar el modelo.

frmGeneralInputs - Fire Management

Fire Behavior Parameters

Wind Direction (degree)	225
Wind Speed (mile/hour)	11
Fire Duration Assumption (hr)	1
Flame Length For High Intensity Fire for Suppression (m)	2

Risk Assumptions

Ignition assumption in fuel treatment:

☐ Uniform 0.010

☒ Redistribute according to Historic Data

Base Line Average Fire Risk 0.050

Fuel Treatment Drainage

☒ AllFMUs

☐ NorthFork

☐ Marble Fork

☐ Middle Fork

☐ East Fork

Treatment Options

# of Cells To Be Treated	6
Solver Solution Time (Sec)	120
Fuel treatment priority <= than	4

will not be treated

Save the parameters

frmGeneralInputs - Loss and benefit

Units of fire losses per cell

	High intensity	Mid-Low intensity
WUI	1	1
Sequoia	0.75	0.75
Social	0.7	0.70
Forest	0.4	0.35
Wilderness	0.2	0.10

Units of fire benefits per cell

	High intensity	Mid-Low intensity
Maintenance	0.5	0.50
Restoration	0.3	0.20

Save the parameters

Figura 2 – (a) y (b) Previsión del comportamiento del fuego y cálculo de pérdidas y beneficios

Resultados preliminares

El desarrollo reciente de modelos del comportamiento del fuego tales como FlamMap (Finney 2006), permite simular miles de incendios en un terreno mediante la consideración de factores como la dirección y velocidad del viento, el tipo y la humedad del combustible, declives, orientación y elevaciones del terreno, etc. Usamos simulación directa para calcular la probabilidad de quema relativa en cada celda de la cuadrícula, según los datos provistos por los usuarios. Por ejemplo, basándonos en el supuesto de que el viento sopla desde el suroeste (dirección del viento a 225 grados), con una velocidad de 11 millas por hora, humedad de combustible moderada, podemos simular 18000 incendios en las cuatro Unidades para el Control de Incendios, y crear un mapa de la probabilidad relativa de incendios (fig. 3) para cada celda representada en FlamMap. La elección del período para simulación de incendios se considera parte del proceso de perfeccionamiento del modelo y para ello resulta de utilidad contar con información de las decisiones de los manejadores de incendios de la zona. Luego de generar un mapa con la distribución de la probabilidad relativa de incendios, basado en el registro histórico de períodos sin incendios, lo convertimos en un mapa absoluto de distribución de probabilidad de incendios.

Figura 3 – Probabilidad relativa de quemas reportada por FlamMap en la zona estudiada, con una expectativa de vientos del suroeste, a velocidad de 11 millas por hora. Se simularon 18,000 incendios en el terreno para crear los mapas.

También usamos un modelo de comportamiento del fuego para determinar las principales direcciones de propagación del fuego en cada celda del terreno estudiado. La dirección de propagación del fuego puede usarse para identificar las conexiones espaciales entre celdas adyacentes. Si usamos como base la conexión entre estas celdas, podemos hacer gráficos dirigidos de sus relaciones espaciales, siguiendo las principales direcciones de propagación del fuego en cada una de ellas. Este gráfico dirigido se usará como base para interconectar las diferentes cuadrículas a través de un modelo de programación de números enteros (Wei y otros, en imprenta).

Tanto las ganancias como las pérdidas, actuales y futuras, de un incendio, son consideraciones importantes que incorporamos a nuestro sistema de apoyo en la toma de decisiones. Un diagrama reciente de sucesión de combustible en el Parque Nacional de las Secuoyas fue usado para crear la trayectoria de sucesiones por cada tipo de combustible a lo largo de un período de cuarenta años. Junto al cambio del tipo de combustible y de su distribución en el terreno, también pueden cambiar los elementos asociados con el comportamiento del fuego, como la intensidad y la tasa de propagación, lo cual puede afectar la distribución de las probabilidades de

incendio y requerir que los manejadores elijan estrategias diferentes para el control de los mismos.

Con recursos de supresión, las asignaciones de espacio del programa de reducción de combustibles tendrán un papel importante en la fragmentación del complejo de combustibles y, por tanto, aumentarán las probabilidades de que la supresión sea efectiva (Finney 2001). La quema prescrita constituye el acercamiento al que se recurre con mayor frecuencia en la reducción de combustibles peligrosos. La utilidad primaria de este sistema de apoyo en la toma de decisiones sobre el manejo de incendios es ayudar a los manejadores a identificar los mejores lugares para la reducción de combustible, con el fin de minimizar las pérdidas potenciales causadas por incendios en el terreno. La figura 4a muestra un conjunto de seis celdas, propuestas por el modelo, donde programar tratamientos preventivos de combustibles a fin de romper efectivamente el complejo de combustibles. Una vez seleccionadas las celdas para el tratamiento de combustibles, los resultados del modelo pueden combinarse con otras capas del mapa para un mejor entendimiento de la lógica detrás de las opciones representadas en el modelo. La figura 4b muestra todas las ubicaciones propuestas para el tratamiento de combustibles dentro de los límites de la interfaz urbano-forestal; cuatro de las seis celdas propuestas se encuentran alrededor de localidades donde hay secuoyas gigantes. Este tipo de análisis posterior le provee a los manejadores más información sobre la lógica que el modelo usó para proponer la ubicación del programa de reducción y tratamiento preventivo de combustibles.

Figura 4— (a) Áreas seleccionadas por el modelo para la quema prescrita. El fondo de (a) es el mapa de elevación. Las zonas oscuras en las cuatro Unidades para el Control de Incendios representan las elevaciones menores. En (b), integramos la ubicación sugerida por el modelo para el tratamiento de combustibles con otras capas del Sistema de Información Geográfica, que incluyen la existencia de una

interfaz urbano-forestal, el bosque de secuoyas, inquietudes sociales y el bosque comercial, con el fin de realizar otros análisis. (b) Indica, a los manejadores de incendios, el raciocinio en la elección de localidades para el tratamiento de combustibles.

Usualmente, cada incendio genera pérdidas de recursos y aporta beneficios ecológicos. Puesto que cada incendio consume combustibles acumulados en el pasado, también altera las distribuciones de combustible en el terreno y, por tanto, influye en las distribuciones de riesgo de incendios en el presente y en el futuro. Las pérdidas y ganancias directas, actuales y futuras, de un incendio particular, así como sus demás efectos a largo plazo, son importantes en la toma de decisiones sobre el manejo de incendios. Es difícil predecir con exactitud el impacto de los incendios, dado que el fuego puede propagarse de muchas maneras y adquirir tamaños diversos. Este sistema es capaz de prever un conjunto de áreas con potencial de impacto en cada incendio y de considerar las áreas impactadas como potenciales cortafuegos que afectarían la acumulación futura de riesgo de incendios.

Figura 5 – Las celdas rojas en (a) muestran la ubicación actual de los incendios. En (b), las celdas naranja presentan un potencial de incendio que fluctúa entre 0.5 y 1; las celdas amarillas presentan un potencial de incendio de entre 0.25 y 0.5; las celdas verdes tienen una probabilidad de incendio de menos de 0.25.

Según el análisis de las posibilidades de impacto de cada incendio, podemos calcular los beneficios y las pérdidas asociadas según escenarios diferentes y estimar el papel que cada incendio jugaría en la reducción de la acumulación de combustibles y en la mitigación del riesgo de incendios futuros. Si el impacto deseado con que asociamos cada incendio pudiera identificarse mediante análisis de ventajas y

desventajas a lo largo del tiempo, también podría usarse para sugerir esfuerzos en la supresión de incendios.

Discusión y Conclusión

Desarrollamos un sistema probabilístico en apoyo a la toma de decisiones sobre el manejo de incendios con el fin de lograr tres tipos de análisis sobre respuestas de manejo apropiadas que asociamos con la ubicación de los tratamientos preventivos de combustibles, el pronóstico del impacto de incendios y los análisis de pérdidas y beneficios.

Dónde se lleva a cabo la reducción de combustibles se considera importante para el cambio del comportamiento del fuego, la manipulación de las distribuciones de riesgo de incendio y la prevención de grandes fuegos catastróficos. Uno de los objetivos primarios de este sistema de apoyo en la toma de decisiones es sugerir cuáles son los lugares adecuados para la reducción de combustible o para el uso del fuego. Los resultados preliminares de las pruebas demuestran que el sistema de modelos es capaz de generar sugerencias lógicas acerca de la ubicación de los tratamientos preventivos de combustibles. Dónde se realiza la reducción de combustibles puede ser determinado por muchos factores interrelacionados. Definimos algunos de estos factores mediante indicaciones de los usuarios, que incluían condiciones meteorológicas, el cálculo de la duración de los incendios y las pérdidas y beneficios por fuego en cada celda. Esto les provee a los manejadores la flexibilidad para determinar el ambiente específico en que se toman las decisiones.

Incluimos la previsión de impactos potenciales alternativos de incendios particulares mediante el rastreo topográfico de la probabilidad de incendios. Esto nos permitió analizar la manera en que incendios particulares influyen en las distribuciones de riesgo de incendios actuales y futuros en un mismo marco de probabilidad de incendios. No obstante, la simulación de incendios basada en eventos particulares no es el objetivo principal de esta investigación; usamos los impactos basados en modelos de probabilidades para generar pautas a nivel estratégico en apoyo a las decisiones sobre el manejo de incendios.

Las expectativas de las condiciones del tiempo, de los parámetros de comportamiento del fuego, y de las pérdidas y beneficios derivados, pueden ser indicadas por los usuarios y cada una tiene impactos significativos en los modelos producidos y en las decisiones sugeridas. No obstante, estas expectativas son factores estocásticos, en vez de insumos fijos en el modelo. El desarrollo futuro de este sistema requerirá el mejoramiento de la estructura del modelo para que incluya sistemáticamente esos factores estocásticos en el proceso de toma de decisiones.

Reconocimientos

Los autores se han beneficiado de los comentarios y sugerencias de Jeff Manley, subdirector del Fire Program Planning del Servicio de Parques Nacionales; Tom Nichols, Subjefe del Fire and Aviation Management Division del Servicio de Parques Nacionales, National Interagency Fire Center; y de Stephen Botti, ex director del Fire Program del Servicio de Parques Nacionales.

Referencias

- Finney, M.A. 2001. **Design of regular landscape fuel treatment patterns for modifying fire growth and behavior.** For. Sci. 47:219-228.
- Finney M.A. 2006. **FlamMap 3.0.** Missoula, MT: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory
- USDA/USDI (1995). **Federal Wildland Fire Management Policy & Program Review,** USDA Forest Service, USDI Bureau of Land Management, USDI National Park Service, USDI Fish and Wildlife Service, USDI Bureau of Indian Affairs. Boise, Idaho, National Interagency Fire Center.
- Wei, Y, Rideout, D.B., Kirsch, A, (in press), **An optimization model for locating fuel treatments across a landscape to reduce expected fire losses,** Can. J. For. Res.

Un Modelo Logit Mixto de las Preferencias de los Propietarios para Reducir el Riesgo de Incendios Forestales¹

Thomas P. Holmes², John Loomis³ y Armando González-Cabán⁴

Resumen

Quienes viven en zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) corren mayor riesgo de sufrir grandes pérdidas de vida y propiedad a causa de incendios forestales. En las últimas décadas, la visión prevaleciente ha sido que el riesgo de incendios en zonas rurales es exógeno a las actividades de los propietarios. En respuesta a los fuegos catastróficos ocurridos en los últimos años en zonas de IUF, los acercamientos más recientes a la prevención y el manejo de incendios han destacado las actividades que los propietarios y los miembros de las comunidades pueden realizar para reducir el riesgo de incendios forestales. Entre estas actividades se encuentran la reducción de materiales combustibles mediante el aclareo sistemático, la quema controlada de bosques aledaños a las comunidades, así como la creación de cortafuegos alrededor de los hogares. La promoción de actividades de reducción del riesgo por parte de la comunidad y los propietarios representa una nueva dirección en la prevención y el manejo de incendios forestales. Desarrollamos una encuesta para estudiar el valor que le atribuyen los residentes de la Florida a los programas (públicos y privados) de reducción de incendios. Se trabajó con una muestra aleatoria para evaluar las diferencias potenciales en las preferencias de personas que viven en zonas de bajo, mediano y alto riesgo de incendios. Además, se diseñó un experimento que permitió a los encuestados escoger entre programas para la reducción de incendios que variaban en los siguientes renglones: riesgo de incendio forestal, pérdida económica y costo del programa. La encuesta se llevó cabo por vía telefónica y por medio del correo. Los resultados muestran que quienes viven en comunidades consideradas de alto riesgo de incendio estaban dispuestos a pagar un recargo sustancial por programas públicos de mitigación de incendios, pero estaban poco dispuestos a pagar por programas de reducción de combustible en sus propios hogares. La preferencia con

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes; Carolina, Puerto Rico, del 29 de abril - 2 de mayo de 2008.

² Guarda forestal investigador, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Southern Research Station, Forestry Sciences Laboratory, Box 12254, Research Triangle Park, NC 27709; correo electrónico: tholmes@fs.fed.us.

³ Catedrático, Departamento de Economía de Agricultura y Recursos, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523; correo electrónico: john.loomis@colostate.edu.

⁴ Economista investigador, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Pacific Southwest Research Station, Forest Fire Laboratory, 4955 Canyon Crest Drive, Riverside, CA 92507; correo electrónico: agonzalezcaban@fs.fed.us.

respecto a los riesgos se relaciona con las características demográficas de los encuestados. Los propietarios en riesgo son más propensos a tomar decisiones riesgosas con relación a los programas de mitigación de incendios. Los resultados sugieren que los hogares de bajos ingresos, los hogares que no están asegurados y los hogares de afroamericanos que viven en zonas de IUF podrían ser buenos candidatos para prestación de ayuda.

Introducción

Los incendios forestales suponen un riesgo de pérdidas catastróficas de vida y propiedad para quienes viven en zonas de interfaz urbano-forestal (IUF). La severidad creciente y el aumento en la frecuencia de los incendios forestales en zonas residenciales de los Estados Unidos ha llevado a que los manejadores de incendios y quienes se encargan de las políticas públicas destaquen el papel que desempeñan los dueños de casas y las actividades comunitarias de mitigación en la reducción de los riesgos asociados con incendios forestales. Las actividades de mitigación incluyen la reducción de combustibles mediante aclareo sistemático y la quema controlada de bosques aledaños a las comunidades, así como la creación de cortafuegos alrededor de los hogares. En algunas localidades, la reducción de combustibles está siendo subsidiada mediante programas federales de costo compartido.

La promoción de actividades para la reducción de riesgo entre los propietarios y por parte de las comunidades representa una dirección nueva en la prevención y el manejo de incendios forestales. Sin embargo, se sabe poco de la eficacia de estos acercamientos y sobre el grado en que estos propietarios y comunidades estén dispuestos a invertir su tiempo, esfuerzo y dinero en programas de reducción de riesgos. Más aún, los programas de reducción de riesgos, de base comunitaria, representan el bien común más débil, dado que cada miembro de una comunidad tiene “un cierto poder de veto que afecta el alcance del logro colectivo” (Hirshleifer 1983, p. 373). Del mismo modo en que la fuerza de una cadena depende de su eslabón más débil, y de la misma manera en que la protección de un sistema de diques depende del que tenga menor altura, la provisión total de protección contra incendios se ve comprometida por los dueños de terrenos boscosos que no toman medidas de protección contra incendios y aumentan, por lo tanto, el riesgo que corren otros propietarios en su comunidad. El entendimiento de los factores económicos que influyen en las decisiones sobre inversión en actividades de reducción de riesgo de incendios forestales ayudará a identificar los obstáculos que enfrenta la mitigación eficiente y efectiva de incendios en zonas de IUF.

En esta ponencia, estudiamos las preferencias de los propietarios y su disposición a pagar (WTP, por sus siglas en inglés) por programas (privados y públicos) de reducción de incendios forestales en la Florida, mediante el uso de una

encuesta basada en atributos. Tras la introducción, hacemos un examen de la bibliografía económica que ha empleado métodos de declaración de preferencias a la hora de estimar la disposición de los propietarios a pagar por la reducción del riesgo de pérdidas catastróficas de propiedad privada, incluidas las resultantes de incendios forestales. Luego, presentamos los métodos de selección de muestras de la encuesta, seguido de una descripción del modelo empírico usado para analizar las preferencias de los propietarios con respecto a la mitigación de incendios forestales. La ponencia continúa con una presentación de los resultados empíricos y un apartado de conclusiones.

Examen de la bibliografía

El riesgo de que un incendio forestal dañe o destruya una residencia ubicada en una zona de IUF es muy bajo. Sin embargo, es de gran importancia para el propietario.⁵ Los eventos de riesgo bajo y consecuencias graves (LRHC, por sus siglas en inglés) suponen problemas para la teoría del beneficio esperado (EU, por sus siglas en inglés). Morgenstern (1979), uno de los primeros en diseñar la teoría del beneficio esperado, ya lo reconocía:

... es necesario señalar que el dominio de nuestros axiomas sobre la teoría del beneficio también es restricto... Por ejemplo, las probabilidades usadas deben encontrarse dentro de márgenes plausibles y no llegar a cifras como 0.01 o incluso a menos de 0.001, para ser entonces comparadas con otras igualmente pequeñas como 0.02, etc. (Morgenstern 1979, p. 178).

En un metaanálisis de 23 conjuntos de datos, Harless y Camerer (1994) nos presentan un examen para medir la conformidad con las opciones reales en la teoría del beneficio esperado. Sus resultados confirman que aquellas decisiones tomadas en circunstancias de poco riesgo no son congruentes con las predicciones de la teoría del beneficio esperado, y sugieren que “la ponderación no lineal de pequeñas probabilidades tiene importancia empírica a la hora de explicar el comportamiento de elección” (p. 1285).

La incapacidad de la teoría del beneficio esperado para explicar y predecir decisiones económicas en eventos relacionados con el riesgo de incendios forestales que enfrentan los propietarios de las zonas de IUF, sugiere que la gente reacciona de formas que no se comprenden bien. Camerer y Kunreuther (1989) mostraron que, cuando el nivel de riesgo es bajo, las decisiones de la gente se rigen por reglas ad

⁵ En bosques templados, los disturbios naturales (como incendios, epidemias de insectos y tormentas de viento) afectan un promedio de alrededor del 1% del terreno de los bosques al año, porcentaje que fluctúa entre un 0.5% y 2% y que incluye una gama de ecosistemas (Runkle 1985).

hoc. Hay quienes tienden a negar el riesgo por completo, creyendo que no les puede suceder a ellos. Otros tienden a sobrestimar o exagerar el riesgo. Ambos tipos de respuesta han sido identificados en investigaciones sobre la percepción del riesgo de incendios luego de que ocurriera algún incendio real.⁶

McClelland y otros (1993) observaron respuestas de comportamiento similares en casos de poco riesgo y consecuencias graves, en un experimento sobre economía realizado en laboratorio, con una muestra de estudiantes universitarios a quienes se les pidió que pujaran el precio de cierto número de pólizas de seguro que, aunque caras, protegerían sus bienes en caso de eventos catastróficos. Las ofertas se acercaron al valor esperado, excepto en casos de poca probabilidad (0.01), en los que se observó una distribución bimodal de los valores. Estos resultados son congruentes con la idea de que hay quienes tienden a ignorar el riesgo cuando es bajo, mientras que otros se preocupan en exceso.

Por su parte, Ganderton y otros (2000) usaron métodos económicos experimentales para investigar acerca de las decisiones de compra de seguros en casos de riesgo de eventos catastróficos. La hipótesis de los autores fue que la distribución bimodal de valores hallada por McClelland, Schulze y Coursey (1993), podría atribuirse a una dualidad en los puntos de enfoque. Es decir, que al enfrentar casos de poco riesgo y graves consecuencias, las personas tienden a concentrarse en la probabilidad de que el evento ocurrirá, y tenderán a no hacerle caso a eventos de riesgo menor si las probabilidades de que ocurran no pasan de cierto nivel. Hay otras personas que se enfocan en la magnitud de las pérdidas potenciales y deciden que vale la pena evitar las consecuencias aunque les cueste mucho dinero. Los datos de este experimento fueron analizados mediante un modelo logit binario (la compra, o no compra, de seguros). Hallamos que los sujetos respondían más a la variación en las probabilidades de pérdida que a la variación en la cantidad de las mismas. También se encontró que no eran capaces de identificar una distribución bimodal de valores (tal vez porque se concentraban primordialmente en las probabilidades de pérdida y no en la cantidad de las mismas).

Los economistas han usado métodos de valoración contingente para estimar la disposición a pagar por medidas que reducen los riesgos asociados con incendios forestales. Winter y Fried (2001) preguntaron a unidades familiares cuánto estarían dispuestas a aumentar sus impuestos sobre la propiedad a cambio de una reducción

⁶ Por ejemplo, Cortner y otros (1990) encontraron que un grupo de propietarios encuestados en una comunidad de California que había sufrido el impacto reciente de un incendio, percibían menor riesgo de incendios futuros que otros propietarios de comunidades que aún no habían sido sufridos un incendio. Abt (1990), por el contrario, informa que un grupo de propietarios de Palm Coast, Florida, creía que los incendios eran la mayor amenaza que enfrentaba su comunidad luego de haber sufrido el impacto de uno.

del 50% en las probabilidades de sufrir un incendio. En promedio, las unidades familiares estaban dispuestas a pagar \$57 anuales. Talberth y otros (2006) llevaron a cabo un estudio con método de valoración contingente en el que calcularon la disposición a pagar por reducciones de riesgo de incendio en terrenos privados, en los vecindarios y en terrenos públicos. La cantidad que la gente estaba dispuesta a pagar era mayor cuando se trataba de proteger la casa propia (\$240), seguida de la protección de otras casas en el vecindario (\$95) y, finalmente, la protección de bosques en terrenos públicos (\$64). Loomis y González Cabán (2008) evaluaron la disposición a pagar por reducciones en el riesgo de incendio en zonas de IUF en tres estados: Montana, Florida y California. Los resultados estadísticos sugieren que las unidades familiares tienen una disposición a pagar sustancial si se trata de quemaduras prescritas o programas mecánicos de reducción de combustibles, que disminuyan la cantidad de acres afectados por incendios en sus respectivos estados en, al menos, un 25%. En particular, el promedio de la cantidad que estuvieron dispuestos a pagar en California fluctuó entre \$400-\$500, entre \$250-\$400 en la Florida, y entre \$190-\$300 en Montana.

Métodos empíricos

Se diseñó una encuesta a partir del examen de la bibliografía para estimar la disposición de los propietarios a pagar por programas de reducción de riesgos de pérdida económica e incendios (por separado). El estudio fue diseñado para probar la hipótesis de que las preferencias de los propietarios en cuanto a los riesgos y las pérdidas son heterogéneas. Específicamente, pusimos a prueba la hipótesis de que las preferencias relacionadas con el riesgo y las consecuencias económicas asociadas con los programas de mitigación de incendios reflejan actitudes subyacentes en torno al manejo de riesgos, y que algunas personas evitan el riesgo, mientras que otras son más arriesgadas. Esta distribución de las preferencias resulta congruente con una distribución bimodal de los parámetros de preferencia en casos de poco riesgo y consecuencias graves.

La teoría sobre preferencias de riesgo, que se basa en la teoría del beneficio esperado, generalmente categoriza a quienes toman decisiones como reacios, de actitud neutral ante el riesgo, o arriesgados. Para clarificar estos conceptos, consideremos el caso de una lotería que ofrece probabilidades iguales de ganar \$100 o nada. Se considera reacia a una persona que acepte un pago seguro de menos de \$50 sin tener que jugar a esta lotería. El arriesgado es quien aceptaría el pago seguro, pero sólo si fuera mayor de \$50. Si el jugador se muestra indiferente ante las opciones de jugar a la lotería o aceptar los \$50 seguros, entonces se considera de actitud neutral.

Barsky y otros (1997) especularon que las actitudes ante el riesgo podrían ser bastante heterogéneas en la población y diseñaron una serie de preguntas teóricas sobre el beneficio, para identificar las actitudes individuales ante el riesgo a partir de las respuestas a una serie de preferencias sobre apuestas relacionadas con el sueldo devengado. Más aún, Barsky y otros vincularon las declaraciones sobre preferencias de riesgo con el comportamiento observado. Nosotros usamos una versión simplificada de la serie de preguntas sobre preferencias de riesgo que usaron Barsky y sus coautores para aislar a los encuestados más arriesgados. Luego probamos si los encuestados arriesgados tenían parámetros de preferencias estadísticamente distintos en cuanto a riesgos y pérdidas por incendio, en comparación con los encuestados que se consideran reacios al riesgo. La identificación de preferencias estructuralmente distintas con respecto a los programas de reducción del riesgo de incendios constituye una prueba de los hallazgos de McClelland y otros (1993) en torno a la idea de que la disposición a pagar por reducción de riesgos tiene una distribución bimodal.

Particularmente, los encuestados fueron considerados tolerantes al riesgo según su respuesta a la siguiente pregunta sobre beneficio esperado:

Supongamos que usted es el único proveedor en su familia y que tiene un buen empleo que les garantiza, a usted y a los suyos, ingresos todos los años de su vida. Surge una oportunidad de cambiar ese empleo por uno nuevo, igual de interesante. Este nuevo empleo podría mejorar (con 50% de probabilidad de duplicar) o podría empeorar (con 50% de probabilidad de reducir a la mitad) el ingreso familiar. ¿Aceptaría el trabajo nuevo?

1. SÍ 2. NO

Según las definiciones expuestas anteriormente, un encuestado es considerado arriesgado si responde que SÍ a esta pregunta, porque

$$\frac{1}{2}U(2c) + \frac{1}{2}U(0.5c) > U(c) \quad (1)$$

donde U es una función de beneficio y c es el flujo de ingreso actual.

Una de las dificultades asociadas con la valoración de preferencias de riesgo heterogéneas, a las que ya aludimos, es el hecho de que el riesgo de que un hogar sufra daños o sea destruido por un incendio forestal es muy bajo. Afortunadamente, los economistas han desarrollado métodos para estudiar la disposición a pagar por la reducción del riesgo de mortalidad en lugares donde dicho riesgo es muy bajo. Nos referimos específicamente a la investigación de Krupnick y otros (2002), quienes desarrollaron un formato de valoración contingente para estudiar el impacto del

estado de salud y de la edad en la disposición a pagar por reducir el riesgo de mortalidad. Ellos usaron un método visual innovador para comunicar el riesgo básico de muerte (en el orden de 10^{-3}) así como cambios del nivel de riesgo (en el orden de 10^{-4}) mediante una cuadrícula rectangular de 1,000 casillas blancas y rojas que representaban el buen estado de salud y la muerte, respectivamente. Modificamos este formato al plantear una situación en que el riesgo de daños por incendio al hogar se representaba en un entramado de 1,000 cuadros donde el riesgo de sufrir daños se representaba con el color rojo y la probabilidad de salir ileso se representaba con el color blanco. También simplificamos la conceptualización del riesgo de daños por incendio al hogar, para lo que solicitamos que los encuestados consideraran el riesgo que implicaban varios programas de reducción de riesgo de incendios que estarían operando durante los próximos diez años. Este acercamiento (Figura 1) se usó para presentarles a los encuestados el verdadero riesgo de que sus hogares sufran daños debido a un incendio forestal durante la próxima década.

Nuestro diseño experimental estableció variaciones en el riesgo de daños a la propiedad privada en un período de diez años y en cinco niveles que iban desde 1-5%, siendo 5% el riesgo básico asociado con la ausencia de inversiones en programas de reducción de riesgos. Los daños por incendio se presentaron en términos de pérdidas económicas a tono con el valor real de las propiedades (por ejemplo, casas, automóviles, árboles de jardín), y las cantidades en dólares variaron desde \$10,000 hasta \$100,000. El experimento incluyó dos tipos de programas de reducción de incendios: (1) un programa público, y (2) uno privado. El programa público incluía tres actividades para el manejo de vegetación y la reducción de combustibles en la comunidad donde residía el encuestado (quema prescrita, tratamiento mecánico y herbicida), y sería financiado mediante un aumento en los impuestos. El programa privado aumentaba el espacio protegible en la propiedad del encuestado mediante técnicas de manejo de vegetación, como la remoción de árboles cercanos a la residencia. El costo de estos programas fluctuaba entre \$25 y \$1,000 en el caso del programa público, y entre \$50 y \$1,000 en el caso del privado.

Figura 1— Cuadrículas representativas del riesgo de incendios forestales

(1) CUADRÍCULA SUPERIOR: Riesgo anual

El diagrama de la izquierda muestra una manera de ilustrar el Promedio Anual de Probabilidad de daños al hogar por incendios forestales. La “cuadrícula de probabilidades” muestra un vecindario de 1000 casas, cada una representada por un cuadro. Los cuadros blancos representan casas que no han sufrido daños por incendios y los rojos representan casas afectadas por incendios. Esta incidencia anual se considera típica o promedio en un vecindario. Para una mejor idea de este nivel de probabilidad, cierre los ojos y coloque la punta de un bolígrafo en la cuadrícula. Si toca un cuadro rojo, significa que su hogar podría sufrir daños por incendio.

(2) CUADRÍCULA INFERIOR: Riesgo en 10 años

La probabilidad de que una casa sufra daños por incendios en una década es aproximadamente 10 veces mayor que la probabilidad de que sufra daños en un solo año. Aquí se muestra el Promedio de Probabilidad de Daños en una Década, en el mismo vecindario. Los cuadros rojos representan casas afectadas a lo largo de diez años y los blancos representan las que no sufrieron daños.

Para la construcción de los conjuntos de opciones se usó un diseño experimental completamente aleatorio (Holmes y Adamowicz 2003). La Figura 2 muestra un ejemplo de pregunta de selección múltiple usada en el cuestionario. Una opción representativa del statu quo fue provista en cada escenario de selección. A cada encuestado se le presentó una serie de tres preguntas de selección múltiple.

Figura 2— Ejemplo de pregunta de selección múltiple

Pregunta 20	Respuesta #1	Respuesta #2	Respuesta #3
	Programa de Prevención Público	Programa de Prevención Privado	Inacción
Probabilidad de que su casa sufra daños en los próximos diez años	40 en 1,000 (4%)	10 en 1,000 (1%)	50 en 1,000 (5%)
Daños a la propiedad	\$40,000	\$80,000	\$100,000
Expectativa de pérdida en 10 años = probabilidad x daño	\$160 en 10 años	\$800 en 10 años	\$5,000 en 10 años
Pago único por un programa de diez años	\$300	\$100	\$0
Yo seleccionaría: (Marque un encasillado)	☐	☐	☐

Para investigar la importancia de la heterogeneidad en las preferencias declaradas según los programas de prevención de incendios forestales, empleamos un modelo logit mixto (o sea, de parámetros aleatorios). El modelo logit mixto (ML, por sus siglas en inglés) es una forma generalizada del logit estándar multinomio (MNL, por sus siglas en inglés) que permite variaciones aleatorias en el renglón de preferencias, patrones de sustitución sin restricciones, así como correlaciones entre elementos inobservados (Train 2002). El modelo logit mixto puede justificarse mediante una función de beneficio

$$U_{nj} = \sum_{k=1}^K \beta_{nk} x_{jnk} + \varepsilon_{jn} \quad (2)$$

donde x_{jnk} es un vector de K número de variables explicativas observadas por el analista para la alternativa j y para el encuestado n, β_{nk} es un vector de los parámetros de preferencia, y ε_{jn} es una variable estocástica inobservada, independiente y de distribución idéntica (IID) a la que se le otorgan valores extremos del tipo I entre los encuestados y las respuestas. Dado que la suposición de una variable independiente y

de distribución idéntica es restrictiva al no permitir la correlación de los componentes de error en las opciones, dicha restricción puede atenuarse mediante la introducción de elementos estocásticos adicionales a la función de beneficio, mediante β_n . Estos componentes posibilitan los parámetros de preferencia para que x_{jnk} número de variables explicativas sean heterogéneas y guarden correlación en la muestra. Específicamente,

$$\beta_{nk} = \beta_k + \Delta z_{nk} + \Gamma v_{nk} \quad (3)$$

donde β_k es el valor medio del parámetro de preferencia k , z_{nk} es un vector de datos demográficos (o de otro tipo) observados en el encuestado n , v_{nk} es una variable aleatoria con una media de cero y varianza igual a uno, Δ es un vector de parámetros que provee un estimado de cómo los datos observados z cambian la media de la distribución del parámetro de preferencias, y Γ es una matriz triangular inferior que provee un estimado de la desviación estándar del parámetro de preferencia a través de la muestra y de la correlación que guarda con otros parámetros de preferencia.

Las probabilidades en el modelo logit mixto son promedios ponderados de la fórmula logit estándar, evaluada para valores de β , y las ponderaciones son determinadas por la función de densidad $f(\beta)$. Sea P_{ni} la probabilidad de que un individuo n escoja la alternativa j del conjunto J , de manera que

$$P_{ni} = \int L_{ni}(\beta) f(\beta) d\beta \quad (4)$$

where

$$L_{ni}(\beta) = \frac{e^{V_{nj}(\beta)}}{\sum_{j=1}^J e^{V_{nj}(\beta)}} \quad (5)$$

y $V_{nj}(\beta)$ sea la porción del beneficio observada (Train 2002). El nombre del modelo nos llega de la bibliografía estadística, donde se llama función mixta al promedio ponderado de varias funciones.

La función $f(\beta)$ puede simularse mediante selecciones aleatorias de varias formas funcionales. Para el análisis que presentamos en esta ponencia, usamos 500 selecciones Halton (inteligentes) de la distribución normal para calcular Γ para los parámetros aleatorios asociados con las variables de riesgo y de pérdida. Más aún, creamos una variable ficticia utilizando respuestas a una pregunta sobre actitud ante el riesgo. En el caso de las variables de riesgo y pérdida, la influencia que la actitud ante el riesgo tuvo sobre la media de los parámetros de preferencia se evaluó estimando Δ . En este análisis, el estimado de variable de costo de programas de reducción de riesgos que sirvió de parámetro, se trató como un elemento no fortuito. Especificamos las constantes de alternativas específicas para los programas (públicos y privados) de mitigación de incendios. Dado que el valor de estos programas varía según las evaluaciones subjetivas que los encuestados hicieron del riesgo de incendio

que corrían sus comunidades, creamos una variable ficticia para identificar a aquellos encuestados que indicaran que su casa ubicaba en una zona de alto riesgo (en contraposición a una de riesgo bajo o medio). Esta variable luego interactúa con las constantes de alternativas específicas para crear otras dos variables nuevas (*público-alto riesgo*, *privado-alto riesgo*).

Muestreo de la encuesta

Se seleccionó una muestra aleatoria estratificada de hogares en la Florida. Se estratificó según la creencia de que las personas que viven en zonas de alto riesgo (a sufrir daños por incendio) serían más conscientes y se interesarían más por los programas de mitigación de incendios. La muestra se estratificó para que hubiera mayor representación de las zonas en que había riesgo alto o moderado de incendios. El esquema de ponderación utilizado fue de 1-2-3, o sea, que por cada hogar de comunidades de poco riesgo (según lo define la Agencia para el Manejo de Incendios del Estado de la Florida), había dos hogares de comunidades donde el riesgo era moderado y tres hogares de comunidades donde el riesgo era alto. Los hogares fueron escogidos mediante un sistema de discado telefónico aleatorio, y se grabó información básica durante la llamada inicial. Luego, aquellos jefes de familia que se mostraron dispuestos a participar de la encuesta recibirían el folleto con las preguntas por correo. En un período de dos semanas tras haber recibido las preguntas, se les hacía una segunda llamada y un entrevistador registraba las respuestas. En esta etapa de la investigación se completaron 395 entrevistas.

Resultados empíricos

Las respuestas a la pregunta citada sobre apostar el sueldo de una vida, indican que cerca del 21 por ciento de la muestra prefería arriesgarse. La Tabla 1 muestra las actitudes en torno al riesgo, divididas en categorías demográficas. Se llevaron a cabo pruebas para medir la independencia mediante el uso de la estadística χ^2 . Los resultados de estas pruebas mostraron que las unidades familiares de bajos ingresos y que no tenían seguro eran las más arriesgadas. Dado que hubo poca información sobre hogares de familias afroamericanas e hispanas, no pudimos llevar a cabo un análisis estadístico completo sobre la influencia de la raza y la etnicidad en el factor de tolerancia al riesgo.⁷ No obstante, los resultados de la Tabla 1 indican que las preferencias de riesgo son heterogéneas a lo largo y ancho de la población, una conclusión parecida a la de Barsky y otros (1997).

⁷ La muestra incluyó 18 hogares afroamericanos y 9 hispanos. Una interpretación convincente de los datos sugiere que los hogares afroamericanos corren mayores riesgos, mientras que los hogares hispanos evitan el riesgo. Esta hipótesis requiere pruebas más rigurosas y específicas.

Los resultados de los modelos logit multinomio y mixto se informan en la Tabla 1. Según lo esperado, el parámetro de costo estimado, el riesgo y las variables de pérdida fueron negativos y estadísticamente significativos para el modelo logit multinomio. Nuestros resultados sugieren que, en promedio, los encuestados preferían aquellos programas de reducción de riesgos que evitaran tanto el riesgo de incendios forestales como la posibilidad de pérdidas económicas.

Los precios implícitos (estimados marginales de la disposición a pagar) se calcularon dividiendo el parámetro estimado de un atributo por el valor absoluto del parámetro estimado del costo. Mediante esta fórmula, el precio implícito de una reducción de 1% en el riesgo de que una residencia privada en la Florida sufra daños por incendio, y tomando en cuenta los parámetros estimados en el modelo logit multinomio, es de \$146.25. Recordemos que se trata de un pago único para un programa que reduciría el riesgo en casos de incendio durante 10 años y que el riesgo normal es de 5%. Por lo tanto, el costo anual implícito es de apenas \$14.63 por una reducción de un 1% del riesgo habitual. Las unidades familiares estarían dispuestas a pagar cerca de \$36.58 por una reducción de un 50% en el riesgo de incendios forestales (de un 5% a un 2.5%). Esto es menor que, pero similar a, el estimado anual de disposición a pagar (\$57) por una reducción de un 50% del riesgo en caso de incendios forestales en el estado de Michigan, según los hallazgos de Winter y Fried (2001).

El costo implícito de la reducción de daños en el modelo logit multinomio es de apenas \$7.50 por \$1,000 en pérdidas. ¿Es esto razonable? La prima de seguro para un hogar en la Florida es, en promedio, de \$786 anuales y el precio promedio de una casa era de \$170,800 en 2004. Los propietarios pagaban cerca de \$4.60 por cada \$1,000 del valor de su propiedad. Dado que el costo implícito en nuestro estimado corresponde a un programa de 10 años, la disposición a pagar en un año por una reducción de \$1000 sería de unos \$0.75. Por supuesto, los hogares corren otros riesgos aparte de los incendios forestales (como huracanes y fuegos domésticos), de manera que podríamos esperar que la disposición a pagar por una reducción de riesgos sería menor que el total de la disposición a pagar por una reducción de daños que considere todas las fuentes de daño y riesgo posibles.

Tabla 1— *Perfiles de riesgo, según categorías demográficas*

Variable	Reacios al riesgo (%)	Tolerantes al riesgo (%)
Hogar asegurado***		
No	33	67
Sí	82	18
Ingreso del hogar***		
\$22,500-\$37,499	50	50
\$37,500-\$67,499	67	33
\$67,500-\$82,499	71	29
> \$83,000	88	12
Raza (NA)		
afroamericanos	0	100
No afroamericanos	80	20
Etnicidad (NA)		
hispanos	100	0
No hispanos	76	24

Valores de χ^2 cuadrado para pruebas de independencia:

* denota significación en el nivel 0.10, ** denota significación en el nivel 0.05,

*** denota significación en el nivel 0.01. NA indica que la prueba de χ^2 cuadrado no era aplicable por falta de información en algunos renglones.

El signo y la significación estadística de los parámetros estimados de las constantes de atributos específicos en el modelo logit multinomial indican que, en aquellas comunidades consideradas de riesgo bajo o moderado por los propios residentes, los encuestados preferían no tomar medidas en vez de acogerse a un programa (público o privado) de reducción de riesgos en caso de incendio. No obstante, los estimados de parámetros indican que aquellos hogares ubicados en zonas alto riesgo, según la consideración de los propios residentes, preferían un programa público en vez del statu quo, pero se mostraban neutrales en cuanto a la posibilidad de preferir un programa privado. El promedio de disposición a pagar por un programa público de 10 años para reducir riesgos en casos de incendio, para residentes que creen vivir en zonas de alto riesgo, y si mantenemos constantes los niveles de otros atributos, fue de \$550. Esta “prima” en el valor es similar, aunque un poco mayor, en comparación con la disposición a pagar registrada en el estudio de valoración contingente discutido anteriormente en el caso de los hogares en la Florida (Loomis y González Cabán 2008).

Un examen de los estimados de parámetros para el modelo logit mixto (Tabla 2) muestra que los estimados de parámetros para las variables de riesgo y pérdida son

heterogéneas en toda la muestra, según lo indican los estimados de parámetros, estadísticamente significativos, para las desviaciones estándar de estos mismos parámetros. Aunque los estimados de los valores medios de los parámetros de estas variables son negativas y significativos en términos estadísticos (lo cual es congruente con el modelo logit multinomio), la dispersión amplia estimada del parámetro de riesgo indica que una proporción sustancial de los encuestados eran tolerantes al riesgo. Los estimados del parámetro Δ muestran que los encuestados identificados como arriesgados, según la preferencia declarada ante la pregunta sobre la apuesta del sueldo de una vida, escogían las opciones más arriesgadas en cuanto a los programas de reducción de riesgo en casos de incendio forestal. De este modo, las respuestas a la pregunta sobre actitudes ante el riesgo fueron congruentes con las preferencias de los propietarios en cuanto a las desventajas en términos de riesgo y pérdida en la reducción de incendios.

Tabla 2— *Parámetros de preferencia en modelos logit multinomio y mixto para programas de reducción de riesgo en casos de incendios forestales*

Variable	Modelo logit multinomio	Modelo logit mixto (media)	Modelo logit mixto (desviación estándar)
riesgo (%)	-0.117*** (0.033)	-0.138*** (0.045)	0.335** (0.136)
Riesgo _{temeridad} (%)	--	0.203** (0.084)	--
pérdida (\$1,000)	-0.006*** (0.002)	-0.004** (0.002)	0.009 (0.006)
Pérdida _{temeridad} (\$1,000)	--	-0.006* (0.003)	--
costo	-0.0008*** (0.0001)	-0.0008*** (0.0001)	--
programa_ público	-0.28** (0.13)	-0.074 (0.17)	--
programa_ privado	-0.45*** (0.14)	-0.26 (0.18)	--
público_alto_riesgo	0.72*** (0.22)	0.83*** (0.27)	--
privado_bajo_riesgo	0.45* (0.24)	0.55* (0.29)	--
N	395	395	--
pseudo-R ²	0.042	0.056	--

Nota: el error estándar se indica entre paréntesis. * indica significación en el nivel 0.10, ** indica significación en el nivel 0.05, *** indica significación en el nivel 0.01.

La identificación de propietarios arriesgados en la muestra induce a una distribución bimodal en las preferencias de riesgo — lo cual es congruente con los resultados registrados por McClelland y otros (1993) — y a una distribución bimodal de las preferencias en cuanto a las pérdidas económicas. Las desventajas en términos de riesgo y pérdida que mostraron los encuestados menos arriesgados fueron muy distintas de las desventajas que expresaron los encuestados más arriesgados. Claramente, el modelo logit mixto provee una descripción más completa de las preferencias de los propietarios en cuanto al riesgo, en comparación con el modelo logit multinomio.

Conclusiones

Los estimados de la disposición a pagar por reducciones de riesgo y por pérdidas económicas resultantes de incendios forestales fueron calculados a partir de un experimento mediante encuesta y se encontró que eran bastante congruentes con la disposición a pagar en los estimados derivados de estudios de valoración contingente y en estimados de primas de seguro para el hogar. Los residentes de comunidades que son consideradas de alto riesgo estaban dispuestos a pagar recargos sustanciales por programas públicos de mitigación de incendios, pero su disposición a pagar era menor cuando se trataba de actividades de reducción de combustibles en el hogar. Esta dicotomía puede deberse al impacto visual de los programas de reducción de materiales combustibles cercanos al hogar.

En el campo de la economía, una encuesta puede utilizarse para identificar aquellos segmentos de la población que viven en terrenos propensos a incendiarse y que podrían no estar dispuestos a apoyar programas de reducción de riesgos en casos de incendio forestal debido a sus preferencias de riesgo. Nuestro análisis reveló que cerca del 20% de los encuestados eran arriesgados, mientras que el 80% evitaba el riesgo. Encontramos que las preferencias de riesgo guardan relación con el perfil demográfico, y que los propietarios arriesgados tenían más probabilidades de tomar decisiones más atrevidas en cuanto a programas de mitigación de incendios. Estos hogares podrían ser el eslabón débil en la cadena de implementación de programas de protección contra incendios. En consecuencia, nuestros resultados sugieren que se debe llevar a cabo un esfuerzo especial para brindar ayuda a aquellos segmentos de la población que puedan estar reacios a participar de programas de reducción de incendios, con miras a fortalecer los eslabones más débiles en la cadena de prestación de servicios de protección. Nuestros resultados también sugieren que los hogares de bajos ingresos, los hogares que no están asegurados y los hogares de afroamericanos en zonas de interfaz urbano-forestal, serían buenos candidatos para recibir ayuda.

Referencias

- Abt, R., M. Kuypers, and J. Whitson. 1990. Perceptions of fire danger and wildland/urban policies after wildfire. In, *Fire and the Environment: Ecological and Cultural Perspectives, Proceedings of an International Symposium*. (eds. S. Nodvin, and T. Waldrop). Asheville, NC: Southeastern Forest Experiment Station. Pp. 257-259.
- Barsky, R.B., F.T. Juster, M.S. Kimball, and M.D. Shapiro. 1997. Preference parameters and behavioral heterogeneity: An experimental approach in the health and retirement study. *Quarterly Journal of Economics* 112(2): 537-579.
- Camerer, C. F., and H. Kunreuther. 1989. Decision processes for low probability events: policy implications. *Journal of Policy Analysis and Management* 8: 565-592.
- Cortner, H., P. Gardner, J. G. Taylor. 1990. Fire hazard at the urban-wildland interface: what the public expects. *Environmental Management* 14(1): 57-62.
- Ganderton, P. T., D. S. Brookshire, M. McKee, S. Stewart, and H. Thurston. 2000. Buying insurance for disaster-type risks: experimental evidence. *Journal of Risk and Uncertainty* 20: 271-289.
- Harless, D. W. and C. F. Camerer. 1994. The predictive utility of generalized expected utility theories. *Econometrica* 62: 1251-1289.
- Hirshleifer, J. 1983. From weakest-link to best-shot: The voluntary provision of public goods. *Public Choice* 41:371-386.
- Holmes, T.P. and W. Adamowicz. 2003. Attribute-based methods. In, *A Primer on Non-market Valuation* (P. Champ, K. Boyle, and T. Brown, eds.). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Krupnick, A., A. Alberini, M. Cropper, N. Simon, B. O'Brien, R. Goeree, M. Heintzelman. 2002. Age, health and the willingness to pay for mortality risk reductions: a contingent valuation survey of Ontario residents. *Journal of Risk and Uncertainty* 24: 161-186.
- Loomis, J. and A. González-Cabán. 2008. Contingent valuation of fuel hazard reduction treatments. In, *The Economics of Forest Disturbances: Wildfires, Storms, and Invasive Species*, (T. Holmes, J. Prestemon, and K. Abt, eds.). Dordrecht, The Netherlands: Springer-Verlag.
- McClelland, G. H., W. D. Schulze, and D. L. Coursey. 1993. Insurance for low-probability hazards: a bimodal response to unlikely events. *Journal of Risk and Uncertainty* 7: 95-116.
- Morgenstern, O. 1979. Some reflections on utility theory. In, *The Expected Utility Hypothesis and the Allais Paradox*, (eds. M. Allais and O. Hagen). Dordrecht: D. Reidel.
- Runkle, J. R. 1985. Disturbance regimes in temperate forests. In, *The Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics* (eds. S. T. A. Pickett and P. S. White). San Diego: Academic Press, Inc.
- Talberth, J., R. Berrens, M. McKee and M. Jones. 2006. Averting and Insurance Decisions in Wildland-Urban Interface: Implications of Survey and Experimental Data for Wildfire Risk Reduction Policy. *Contemporary Economic Policy* 24(2): 203-223.
- Train, K.E. 2002. *Discrete Choice Methods with Simulation*. Cambridge University Press.
- Winter, G. and J. Fried. 2001. Estimating contingent values for protection from wildland fire using a two-stage decision framework. *Forest Science* 47(3): 349-360.

El Método de Modelo de Elección para Valorar un Programa de Prevención de Incendios en Cataluña (España)¹

Robert Mavsar^{2, 3} y Verónica Farreras^{2, 4}

Resumen

En Cataluña, los incendios forestales tienen importantes repercusiones ambientales, económicas y sociales. Debido a algunas temporadas de fuego extremas durante la pasada década, los problemas de los incendios forestales han acaparado gran atención en los medios de comunicación y entre quienes forjan la política pública, lo que ha llevado a una mayor preocupación de los ciudadanos. En este estudio, calculamos el efecto de bienestar de poner en vigor un programa de medidas adicionales de prevención de incendios forestales. El programa propuesto disminuiría el área promedio de bosques incendiados por año y la severidad de los incendios, la que se mide por la mortalidad de árboles. Se aplicó el método de elección contingente para obtener el valor umbral de dos atributos impactados por los incendios (el área incendiada y los árboles muertos). Además, los encuestados también pudieron seleccionar el tipo de prevención preferido, eligiendo si la mayor parte del trabajo debía hacerse mediante quemas prescritas o mediante la reducción mecánica de combustibles. Las implicaciones de este estudio pueden ser de interés para quienes deciden la política pública, como base para la toma de decisiones sobre programas de prevención de incendios que tomen en cuenta las preferencias sociales.

Palabras clave: Bosques, Cataluña, método de elección contingente, programa de prevención de incendios, quema prescrita, reducción mecánica de combustibles, valoración social.

Introducción

Cataluña está al noreste de la Península Ibérica. La mayor parte de Cataluña tiene un clima mediterráneo, los inviernos son fríos y húmedos, y los veranos; secos y calientes (Piñol et ál., 1998). Además, aproximadamente el 61% de Cataluña está

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril –2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Pg. Lluís Companys 23, E- 08010 Barcelona, España

³ EFIMED, Pg. Lluís Companys 23, E- 08010 Barcelona, España

⁴ Departamento de Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra, España

cubierto de bosques y matorrales. Los bosques, que ocupan casi el 38% del territorio, se componen principalmente de diferentes pinos (*Pinus halepensis*, *P. sylvestris*, *P. nigra*) y robles (*Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Q. humilis*) (González 2006).

Como en otras partes de la región mediterránea, una de las principales preocupaciones ambientales es la incidencia de devastadores incendios forestales en verano que pueden causar serios daños ecológicos y económicos. La cantidad de incendios forestales y de área afectada varía considerablemente de año en año (ver EFFIS 2006). Sin embargo, parece que en la última década la frecuencia de los incendios desastrosos ha aumentado. Los factores que han causado este efecto son varios: cambios en las condiciones climatológicas (Piñol et ál., 1998), el abandono de las áreas rurales, la expansión rápida de especies fácilmente inflamables, el crecimiento del turismo y el desarrollo de áreas extensas de interfaz urbano forestal (Xanthopolus et ál., 2006). Por lo tanto, el problema de los incendios forestales atrae cada vez más atención por el aumento en el interés del público.

Las autoridades intentan trabajar con este problema mediante el rediseño de políticas⁵ y el aumento de los recursos económicos, con la intención de aumentar la eficiencia de la extinción de incendios y la reducción de los daños. Por ejemplo, en 2006 el gobierno español aumentó el presupuesto para la prevención y extinción en un 10% en comparación con el año anterior (MMA 2006, MMA2007). Sin embargo, estos medios económicos son todavía pocos en comparación con los daños que causan los incendios forestales. Según el informe anual español sobre los incendios forestales de 2005, los daños totales causados por incendios costaron aproximadamente 505 millones de €, mientras que el dinero presupuestado para ese mismo año fue de solamente 63,5 millones de €⁶ (MMA 2006). ¿Valdrá la pena invertir más dinero? ¿Apoyará la sociedad esa inversión adicional?

Otra interrogante es cómo invertir el dinero para controlar el problema de los incendios forestales. La mayoría de los países mediterráneos respondieron al problema del aumento en los incendios forestales con el aumento en los potenciales de extinción. En España, por ejemplo, en 2005, alrededor del 70% del presupuesto mencionado anteriormente se destinó a medidas de extinción. Tal acercamiento podría ayudar a reducir el área incendiada en una temporada de incendios leve, pero podría, por la acumulación de materiales combustibles, llevar a eventos de fuego devastadores en temporadas más difíciles (Xanthopolus et ál., 2006). Por lo tanto, más esfuerzos deben ser dirigidos hacia las medidas de reducción de materiales combustibles. Hay varios métodos de reducción de materiales combustibles. Se pueden clasificar, en términos generales, en reducción mecánica de la biomasa y quema prescrita. La reducción mecánica de combustibles se usa con frecuencia en el

⁵ En España, por ejemplo (BOE 2005).

⁶ Esta cantidad no incluye los presupuestos de las regiones autónomas.

sur de Europa, mientras que la quema prescrita se conoce menos. En España, por ejemplo, la quema prescrita está regulada y se aplica solamente en algunas regiones (Andalucía), mientras que en otras se comienza a utilizar (Cataluña) o, incluso, está completamente prohibida (Madrid) (Xanthopolus et ál., 2006).

Algunas de las razones por las que la quema prescrita no es un acercamiento usual a la reducción de combustible en el Mediterráneo son las limitaciones legales, la experiencia de su aplicación, las restricciones importantes del manejo del humo, los problemas de responsabilidad y la seguridad (Xanthopolus et ál., 2006). Además, la mayoría de las campañas de prevención se han basado en el paradigma de que en el bosque, todo incendio es malo y peligroso. Por lo tanto, a los encargados del control de incendios les preocupa que el uso del fuego para manejar el combustible pueda crear confusión o hasta protestas del público. ¿Aceptará la sociedad mediterránea la aplicación de la quema prescrita como un método de prevención?

Para contestar las preguntas anteriores se deberán explorar las preferencias sociales en relación con la inversión en las medidas de prevención de los incendios forestales y sobre el uso de diferentes métodos de reducción de combustible.

Hasta donde sabemos, solamente Riera y Mogas (2004) llevaron a cabo un estudio en la región del Mediterráneo que exploró el valor social de un programa que redujera el riesgo de los incendios. Ellos aplicaron un método de referéndum puro para evaluar, desde el punto de vista social, la aceptación de un programa propuesto que redujera en un 50% el riesgo de los incendios forestales en Cataluña. Su estudio mostró que el 63% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar el costo adicional estimado de 6 € anuales por persona para financiar el programa.

Por lo tanto, se decidió hacer un estudio que explorase (i) si el público estaría dispuesto a contribuir dinero adicional para apoyar un programa que redujese los daños causados por los incendios forestales y (ii) si la sociedad tiene alguna preferencia con respecto a la manera de implementar el programa. El estudio se llevó a cabo en Cataluña, España.

Los métodos económicos, tales como los experimentos de elección, el método de elección contingente y la valoración hedónica, entre otros, fueron diseñados para evaluar el valor social o el atractivo de cierto bien o servicio (Manisfield y Pattanayak 2007). En este estudio, se utilizó el método de elección contingente como método de valoración.

La próxima sección de este artículo describe el estudio de caso. La sección tres resume los resultados principales, con una discusión de los mismos en la última parte del artículo.

Metodología

Método de análisis conjunto

Pueden emplearse varios métodos de análisis conjunto para obtener las preferencias con respecto a los bienes ambientales. Durante las últimas décadas, se han desarrollado métodos de análisis basados en atributos (Louviere et ál. 2000 y Hanley et ál. 2001). Los tres acercamientos más populares son: (i) método de categorización contingente, (ii) método de clasificación contingente y (iii) método de elección contingente. Estos métodos de valoración son congruentes con la teoría económica del bienestar (Unsworth y Bishop 1994, Holmes y Adamowicz 2003, Louviere et ál. 2000 y Bennett y Blamey 2001).

En este estudio, se aplicó el método de elección contingente. Este método requiere que los encuestados comparen simultáneamente dos o más alternativas de un grupo de selecciones y que escojan la alternativa que prefieren. Esta elección simula el comportamiento del mercado; es como escoger una marca de café de entre las marcas, con diferentes atributos, que están disponibles. Las alternativas disponibles están descritas en un cuestionario que detalla los atributos que deben tomarse en consideración, los cambios en los niveles de cantidad o calidad que podrían ocurrir y un pago propuesto. Este pago puede verse como una contribución para obtener un cambio deseado o evitar uno indeseable. De esta manera, más de un atributo de un bien se toma en consideración a la vez.

El método de elección contingente se basa en el modelo de maximización de utilidad aleatoria (RUM, por sus siglas en inglés) (McFadden, 1973). Este modelo presume que la utilidad del individuo es la suma de componentes sistemáticos (v) y aleatorios (ε) y que puede expresarse de la siguiente manera:

$$(1) U_i = v(x_i, p_i; \beta) + \varepsilon_i$$

donde U_j es la utilidad verdadera e indirecta, que no puede accederse por la observación directa, asociada con la alternativa j , x_i es el vector de los atributos asociados con la alternativa j , y ε_j es un término de error aleatorio con una media de cero. El término de error representa las influencias que afectan las elecciones del individuo, que son conocidas por él, pero que son desconocidas para el investigador.

La probabilidad (P) de que un individuo escoja la alternativa j de un grupo de selecciones que contenga alternativas en competencia puede expresarse de la siguiente manera:

$$(2) P(j|C) = P(U_j > U_k) = P(v_j + \varepsilon_j > v_k + \varepsilon_k), \forall j \neq k \in C$$

donde C contiene todas las alternativas del grupo de selecciones. La mayoría de

las veces las probabilidades de las elecciones se estiman con el modelo logit condicional (McFadden, 1973). El modelo de regresión entonces se calcula mediante una aproximación de probabilidad máxima (Hensher y Johnson 1981).

Escenario de la encuesta

Antes de preguntar a los encuestados sobre sus alternativas preferidas, el contexto de elección o escenario debe ser explicado. En este estudio, el escenario de la encuesta explicaba que debido al abandono de la tierra y a los cambios en el uso de los bosques, la propagación e intensidad de los incendios forestales en Cataluña podría aumentar en el futuro. Por lo tanto, el gobierno regional propone la implementación de medidas adicionales de prevención de incendios forestales que disminuirían la propagación y severidad de los incendios forestales en Cataluña. El escenario también explicaba que se implementarían actividades adicionales de prevención de disminución de combustibles. Esta reducción se alcanzaría con la aplicación de diferentes métodos: (i) quema prescrita y (ii) reducción mecánica de combustibles.

Se usó la propagación e intensidad de los incendios forestales para describir sus efectos y la aplicación de medidas de prevención. Se seleccionaron estos indicadores ya que la velocidad con la que se propaga un incendio y su intensidad son las dos características principales del comportamiento de los incendios y su predicción es crucial para la efectividad del control de los mismos y la aplicación de medidas de prevención (Martins Fernandes 2001). Sin embargo, para propósitos de este estudio, estos indicadores tenían que ser expresados en términos que el público general pudiese entender.

Se decidió que la mortalidad de los árboles era un indicador apropiado para expresar la intensidad del fuego ya que puede relacionarse con la intensidad del incendio (González et ál., 2007). Cuando se probó con los grupos focales y en entrevistas personales se encontró que la mortalidad de los árboles era un indicador que los participantes entendían bien. Según González et ál. (2007), la mortalidad de los árboles en incendios pasados en Cataluña fue de aproximadamente 45%. Este valor se utilizó para caracterizar la situación que podría ocurrir en 10 años si no se implementan medidas adicionales de prevención.

En el caso de la propagación del fuego, se decidió emplear el promedio de área del bosque afectada cada año a causa de los incendios. Este indicador ya había sido utilizado por Riera y Mogas (1994) en su estudio. Ellos encontraron que era apropiado y bien comprendido por los encuestados. Para estimar el punto de partida, se estimó el promedio de área incendiada de bosque por año en Cataluña. Según las estadísticas de incendios para el periodo de 1968-2006, el número promedio de hectáreas afectadas anualmente es de 11,000 o 1% del área total de bosque en Cataluña (GENCAT 2007). La mortalidad actual de los árboles se usó para presentar

la situación que podría ocurrir dentro de 10 años si no se toman medidas adicionales de prevención. Para no sobrestimar la situación futura, se decidió usar estimados conservadores del desarrollo de ambos atributos por los próximos 10 años.

Grupos de selecciones

Un experimento de elección contingente se compone de varios grupos de selecciones, cada uno con dos o más alternativas. Las alternativas están representadas por un grupo de atributos y cada atributo puede estar en uno de varios niveles. En este estudio, se usaron tres atributos: (i) área de bosque incendiada; (ii) mortalidad de los árboles y (iii) pago anual para financiar las medidas de prevención de incendios.

Cada atributo tenía cuatro niveles, como se ve en la Tabla 1. Para el *statu quo* se presumió que no se aplicarían medidas adicionales de prevención. Por lo tanto, los niveles de área incendiada y la mortalidad de los árboles se mantuvieron como en la situación actual. Para el caso de la aplicación de medidas adicionales de prevención, los niveles de área incendiada y la mortalidad de los árboles se calcularon según las simulaciones llevadas a cabo en otros estudios (González, 2006) y según opiniones de expertos. Cuando se probaron en los grupos focales, se encontró que los niveles de los atributos parecían ser realistas y plausibles. Los niveles de pago se determinaron a través de entrevistas personales y grupos focales en los que los encuestados indicaron la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar en diferentes escenarios; el costo del *statu quo* fue cero.

Tabla 1. Los tres atributos y niveles usados en el ejercicio de elección contingente.

Atributo	Descripción	Nivel
Área de bosques incendiada	El promedio anual de área incendiada en 10 años será de	10 hectáreas de 1000 (<i>statu quo</i>)
		7 hectáreas de 1000
		6 hectáreas de 1000
		5 hectáreas de 1000
Árboles muertos	El porcentaje promedio de árboles muertos en los bosques a causa de incendios en 10 años será de	45 árboles muertos de 100 (<i>statu quo</i>)
		30 árboles muertos de 100
		25 árboles muertos de 100
		20 árboles muertos de 100
Pago	El pago por persona requerido para implementar un programa adicional de prevención de incendios es de	0 euros (<i>statu quo</i>)
		15 euros
		30 euros
		50 euros

Figura 1 –Ejemplo de un grupo de selecciones presentado a los encuestados en la encuesta de elección contingente.

Which of the following alternatives do you prefer?

Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3
<p>Without additional prevention</p>	<p>Additional prevention mostly by prescribed burning</p>	<p>Additional prevention mostly by physical fuel reduction</p>
<p>Annual Payment 0 €</p>	<p>Annual Payment 30 €</p>	<p>Annual Payment 15 €</p>
<p>10 hectares burned per 1000</p>	<p>7 hectares burned per 1000</p>	<p>5 hectares burned per 1000</p>
<p>45 dead trees per 100</p>	<p>20 dead trees per 100</p>	<p>30 dead trees per 100</p>

Cada combinación de niveles de atributos constituye una alternativa. Había 27 (3^4) combinaciones posibles o alternativas, sin incluir el *statu quo*. Las alternativas fueron agrupadas aleatoriamente en bloques de 2+1 (*statu quo*). Cada bloque compuesto por tres alternativas incluía (i) la alternativa del *statu quo*, (ii) la alternativa en la que la mayoría de las medidas de prevención adicionales se llevarían a cabo a través de la quema prescrita y (iii) la alternativa en la que la mayoría de las medidas adicionales de prevención se implementaría a través de la reducción mecánica de combustibles. Los tres grupos de selecciones diferentes se le presentaron a cada encuestado y se le pidió que seleccionara la alternativa que preferían en cada grupo de selecciones. La Figura 1 es un ejemplo de un grupo de selecciones usual.

Aplicación y cuestionario

La población estudiada estuvo compuesta por un grupo de 200 miembros de la población general de Cataluña. Los estratos siguieron la estructura de edad y género de la población, según la información del año 2006 (INE, 2007). Las entrevistas se llevaron a cabo en persona, en las casas de los encuestados en junio de 2007. La selección de los encuestados se llevo a cabo según un procedimiento aleatorio de establecimiento de rutas para seleccionar los hogares y luego, según las cuotas de edad y género para seleccionar los individuos particulares en el hogar.

La primera parte del cuestionario se dedicó a la presentación de los atributos a ser evaluados, la manera de pago y sus consecuencias. La parte central contenía los ejercicios de selección y algunas preguntas explicativas. La última parte estaba

diseñada para recolectar información socioeconómica de los encuestados.

La introducción al cuestionario informaba sobre el área incendiada promedio y la mortalidad actual de los árboles causada por incendios forestales en Cataluña. También mostraba la variación esperada de estos atributos en los próximos 10 años si se mantenían las tendencias actuales y no se tomaban medidas adicionales. Luego, el cuestionario informaba que al implementar medidas preventivas adicionales, los niveles futuros de propagación de incendios y los niveles de intensidad de los mismos podrían ser modificados. Para cada atributo se ofrecieron tres alternativas de diferentes niveles además del *statu quo* (Tabla 1). Para familiarizar más aún a los individuos con los posibles niveles de cambio, se les pidió que seleccionaran el nivel que prefiriesen, sin considerar su costo. De esta manera se determinaría si un atributo se considera bueno o malo y si las elecciones posteriores eran congruentes. En la última parte de la introducción se presentaron los métodos de prevención, la quema prescrita y la reducción mecánica de combustibles.

En la parte central del cuestionario se introducía el componente monetario. Se dijo que el gobierno catalán consideraba la implementación de un programa adicional de prevención de incendios forestales. Los logros de este programa dependerían de la cantidad de dinero que se le asignara. Se les dijo a los participantes que la cantidad de recursos dependería de sus respuestas al cuestionario. Si, en promedio, la población estaba dispuesta a contribuir una cantidad de dinero al programa, los pagos se recogerían anualmente y por tiempo indefinido y el dinero se le daría a una fundación que se crearía con este propósito.

Entonces, se le presentaba a los encuestados los grupos de selecciones y se les pedía que seleccionaran las alternativas que preferían. Al final de esta parte, también había algunas preguntas explicativas.

Finalmente, el cuestionario preguntaba sobre las características socioeconómicas de los encuestados.

El cuestionario se administró en papel y fue leído por el entrevistador. Para explicar y presentar mejor algunos de los temas, se le mostraron a los entrevistados fotos y gráficas en tarjetas separadas. El tiempo promedio de la encuesta fue de 15 minutos.

Manejo de la información

El análisis de regresión se llevó a cabo usando el programa NLOGIT 3.0 (Green 2005) y SPSS versión 15.0 (SPSS 2006).

Resultados

Un total de 207 cuestionarios se usaron en el análisis. Sin embargo, antes de llegar a

la discusión de los resultados principales debe notarse que 52 encuestados (25%) siempre seleccionaron la opción del *statu quo*. La mayoría de los que seleccionaron esta alternativa lo hicieron a manera de protesta ya que pensaban que no deberían pagar por lo que en su opinión debería ser financiado por el gobierno. Estas —*respuestas en protesta*— se omitieron del análisis. Solamente se incluyeron las respuestas positivas y los ceros genuinos.

Los resultados de los tres diferentes modelos estimados por el análisis de regresión se presentan en la Tabla 2. En todos ellos los signos de los coeficientes estimados fueron los esperados y la mayoría de las variables son estadísticamente significativas con un nivel de confianza de 99%.

Tabla 2—*Resultados del análisis de regresión*

Atributo	Modelo I	Modelo II	Modelo III
Área incendiada	-0.361*** [0.071]	-0.361*** [0.071]	-0.361*** [0.071]
Mortalidad de los árboles	-0.334*** [0.079]	-0.334*** [0.079]	-0.334*** [0.079]
Pago anual	-0.422*** [0.074]	-0.422*** [0.074]	-0.422*** [0.074]
ASCSQ	-	-1.462*** [0.393]	-2.087*** [0.489]
ASCPB	1.462*** [0.393]	-	-
ASCPR	1.725*** [0.353]	0.266** [0.112]	-0.345 [0.310]
NOPB			0.507** [0.243]
Log L	- 377.99	-377.99	-375.771
Adj. Pseudo R ²	0.266	0.266	0.271

(1) El error estándar en paréntesis (2) ** denota un nivel de significación de un 5%; *** Denota significación al nivel de 1%

Nota: el valor pseudo-R² en las funciones MNL es similar a R² en el análisis convencional, con la excepción de que la significación ocurre en niveles menores. Hensher y Johnson (1981) comentaron que los valores pseudo- R² entre 0.2 y 0.4 se consideran buenos ajustes.

El signo negativo en las variables de área incendiada, mortalidad de los árboles y pago indica que el catalán promedio considera que valores altos en estos atributos disminuyen su bienestar. Es decir, se prefieren menos áreas incendiadas y menos árboles muertos.

Los diferentes modelos estimados exploran más aún las preferencias de aplicar ciertos tipos de métodos de reducción de combustibles. Estas preferencias, junto con cualquier otro efecto sistemático no observado, se capturan en las constantes alternativas-específicas (ASC, por sus siglas en inglés) (Blamey et ál., 2000).

En total, se estimaron tres modelos diferentes. En el Modelo I, las alternativas de usar la quema prescrita (ASCPB, por sus siglas en inglés) y la reducción mecánica de combustibles (ASCPR, por sus siglas en inglés) se comparan con la alternativa del *statu quo*. Ambas ASC son estadísticamente significativas (es decir, diferentes de cero) y positivas. Esto significa que ambas alternativas, donde se aplican medidas adicionales de prevención, se prefieren a la alternativa sin medidas adicionales de

prevención.

El Modelo II pretende calcular si los encuestados tienen preferencias en relación con el tipo de método aplicado para llevar a cabo las medidas adicionales de prevención de incendios forestales. Por lo tanto, la alternativa de aplicar la quema prescrita fue comparada con otras dos alternativas. También, en este modelo, ambas ASC fueron estadísticamente significativas. El signo negativo de la constante del *statu quo* (ASCSQ) confirma el resultado del Modelo I de que llevar a cabo medidas adicionales de prevención mediante la quema prescrita se prefiere a la opción de cero prevención adicional. El valor positivo y el significado estadístico de la alternativa de la extracción física de combustible (ASCPR) indican que esta alternativa se prefiere a la quema prescrita.

Para indagar más sobre las razones de esta preferencia, se calculó el Modelo III. Se basa en el Modelo II y se añade la variable falsa que indica el conocimiento de los encuestados sobre la quema prescrita (NOPB, por sus siglas en inglés). Esta variable toma el valor de 1 si el encuestado, antes de llenar el cuestionario, no estaba familiarizado con el método de la quema prescrita y 0 si lo estaba. No se hicieron cambios en relación con la alternativa del *statu quo*, que continúa siendo menos deseable que la alternativa de la quema prescrita. Sin embargo, la constante alternativa específica de la reducción mecánica ya no es estadísticamente significativa. Esto significa que esta alternativa no se prefiere a la quema prescrita. La explicación la da la variable NOPB. Esta variable es estadísticamente significativa en el intervalo de confianza de 95% y negativa. Expresa que es menos probable que los individuos que no estaban familiarizados con el método de la quema prescrita escojan esta alternativa.

Tabla 3—Valores marginales

Atributo	Valor marginal (€)
Área incendiada	-0.85 [-1.121,-0.63]
Árboles muertos	-0.79 [-1.041,-0.524]

(1) Intervalos de confianza 95% en corchetes (2) Los valores marginales están expresados en Euros (2007)

La Tabla 3 muestra los valores marginales y los errores estándar de los atributos de área incendiada y mortalidad de los árboles. Este valor marginal puede inferirse al calcular

$$(3) p_a = -\beta_a / \alpha$$

donde β_a es el coeficiente de regresión del atributo a valorarse y α el coeficiente del atributo expresado en unidades monetarias (precio) (Louiviere et ál., 2001). Los intervalos de confianza para el valor marginal de cada atributo se calcularon

mediante el uso del procedimiento de Krinski y Robb (1986) con 2000 repeticiones.

Los valores indican que (i) para una disminución de 1 hectárea de 1000 de área de bosque incendiada, el individuo promedio estaría dispuesto a contribuir 0.85 euros al año y (ii) para una disminución en el promedio de la mortalidad de los árboles por incendios forestales de un punto porcentual (es decir, de 30 a 29 árboles muertos por cada 100 árboles), en promedio, los encuestados estarían dispuestos a pagar 0.79 euros al año.

Estos valores podrían usarse para estimar el valor de la aplicación de diferentes escenarios de prevención. Sin embargo, debe señalarse que existen algunas limitaciones. Los valores fueron estimados con los niveles dados para cada atributo (Tabla 1). No se sabe si el usar diferentes niveles, fuera de estos límites, tendría como resultado los mismos valores estimados, ya que la percepción de los encuestados podría variar.

Discusión

Este estudio pretendía explorar (i) los valores que la gente da a las áreas incendiadas y a la mortalidad de los árboles causada por los incendios forestales y (ii) las preferencias de los encuestados sobre la aplicación de medidas de reducción de combustible.

En relación al primer punto se estimaron los valores marginales de ambos atributos. Para ambos obtuvimos valores marginales negativos. Esto era lo esperado ya que se considera que un aumento en el área incendiada o en la mortalidad de los árboles tiene una influencia negativa en la utilidad de los individuos. Los resultados concuerdan con las respuestas obtenidas en la introducción al cuestionario. Se pidió a los encuestados que seleccionaran la situación que preferían en relación con los diferentes niveles de área incendiada y la mortalidad de los árboles. En ambos casos, aproximadamente el 94% de los encuestados seleccionaron los niveles más bajos. Según estos resultados puede concluirse que la implementación de un programa adicional de prevención de incendios forestales aumentaría el bienestar de la población catalana y que, en promedio, la población estaría dispuesta a pagar por su implementación.

El segundo propósito de este estudio era descubrir las preferencias de los catalanes en relación con la aplicación de diferentes métodos de prevención de incendios, particularmente la quema prescrita y la reducción mecánica de los combustibles. Esta pregunta era de particular interés ya que la quema prescrita aún no ha sido aceptada ni aplicada ampliamente en España. Más aún, la mayoría de las campañas de concienciación describían cualquier incendio en el bosque como malo. Por lo tanto, existe la preocupación de que el uso del fuego para el manejo de

combustible sea rechazado por el público.

Sin embargo, los resultados del análisis de regresión demostraron que al público le es indiferente el método que se use para implementar precauciones adicionales. Esto concuerda con las respuestas a las preguntas adicionales, en las que no se detectaron diferencias entre aquellos encuestados que apoyaban el uso de la reducción mecánica de combustibles y la quema prescrita. También, cuando se les pidió explícitamente que seleccionaran el método que preferían, el 24% seleccionó la quema prescrita, el 36% la reducción mecánica de combustibles y al 26% les era indiferente.

No obstante, los resultados también muestran claramente que parte de la población no conoce la posibilidad del uso del fuego como herramienta de manejo. Por lo tanto es necesario aumentar los esfuerzos de campañas informativas y educativas antes de aplicar ampliamente la quema prescrita.

Hay que hacer un señalamiento final con respecto a la manera en que los encuestados percibieron el escenario utilizado en el estudio. Las medidas de prevención de incendios y sus beneficios son menos conocidas entre la población general. Esto podría causar que los encuestados sobrestimen los efectos de la aplicación de tales medidas y expresen su apoyo basados en suposiciones equivocadas. Probamos esto al preguntar a los encuestados su opinión sobre las posibilidades de que ocurra un incendio forestal luego de haber aplicado medidas de prevención. Solamente un 4% de los encuestados contestaron que no era posible, mientras que los demás consideraron que aún después de aplicar las medidas de prevención pueden ocurrir incendios forestales.

En resumen, este estudio demostró que la sociedad catalana considera beneficiosa la implementación de medidas adicionales de prevención de incendios forestales y estarían dispuestos a apoyarlas. También demostró que ambos métodos propuestos para la implementación de tal programa (es decir, la quema prescrita y la reducción mecánica de combustibles) son aceptables por la sociedad. Sin embargo, hay que dedicar más esfuerzos a informar a la población sobre las posibilidades y beneficios de aplicar nuevos tipos de métodos de prevención tales como la quema prescrita.

Reconocimientos

Este estudio fue respaldado por el proyecto de la Unión Europea FIRE PARADOX: *An Innovative Approach of Integrated Wildland Fire Management Regulating the Wildfire Problem by the Wise Use of Fire: Solving the Fire Paradox* (FP6-018505). También queremos agradecer al Dr. José Ramón González sus sugerencias, explicaciones y comentarios.

Referencias

- Bennett, Jeff W.; Blamey, Russell K. 2001. **The choice modelling approach to environmental valuation**. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar Publishing.
- Blamey, Russell K.; Bennett, Jeff W.; Louviere, Jordan J.; Morrison Mark D.; Rolfe, John. 2000. **A test of policy labels in environmental choice modelling studies**. Ecological Economics 32: 269-286.
- BOE. 2005. **Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, de el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales**. Boletín Oficial del Estado 175 (2005): 26341 - 26348.
- GENCAT. 2007. **Estadístiques d'Incendis**. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge; en: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/
- EFFIS 2006. **Forest Fires in Europe 2005**. Ispra, Italia: European Commission – Joint Research Centre.
- Gonzalez , Jose R. 2006. **Integrating fire risk into forest planning**. Joensuu, Finlandia: University of Joensuu; disertación doctoral.
- Gonzalez , Jose R.; Trasobares, Antoni; Palahi, Marc; Pukkala, Timo. 2007. **Predicting stand damage and tree survival in burned forests in Catalonia (North-East Spain)**. Ann. For. Sci. 64: 733–742.
- Green, William H. **NLOGIT 3.0** [Program de computadora]. 2005. Plainview, NY: Econometric Software Inc.
- Hanley, Nick; Mourato, Susana; Wright, Robert E. 2001. **Choice modelling approaches: A superior alternative for environmental valuation?** Journal of Economic Surveys 15:433-460.
- Hensher, David A.; Johnson, Lester W. 1981. **Applied discrete choice modeling**. New York: John Willey and Sons.
- Holmes, Thomas P.; Adamowicz, Wiktor L. 2003. **Attribute-Based Methods**. De: Camp, Patricia A.; Boyle, Kevin J.; Brown, Thomas C., editores. A Primer on Nonmarket Valuation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 171-220.
- INE. 2007. **Cifras de población**. Madrid: Instituto Nacional de Estadística; en: <http://www.ine.es>
- Krinsky, Itzhak; Robb, Leslie. 1986. **On Approximating the Statistical Properties of Elasticities**, The Review of Economics and Statistics 68(4): 715-719.
- Louviere, Jordan J.; Hensher, David A.; Swait, Joffre D. 2000. **Stated choice methods: Analysis and applications**, Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Manisfield, Carol; Pattanayak, Subhrendu. 2007. **Getting Started**. De: Kanninen, Barbara, J., editora. Valuing Environmental Amenities Using Stated Choice Studies – A Common Sense Approach to Theory and Practice. Dordrecht: Springer-Verlag; 1-20.
- Martins Fernandes, Paulo A. 2001. **Fire spread prediction in shrub fuels in Detugal**. Forest Ecology and Management: 144: 67-74.
- McFadden, Daniel L.. 1973. **Conditional logit analysis of qualitative choice behavior**. Páginas 105–142 de P. Zarembka, editor. Frontiers in econometrics. Academic Press, New York, New York, USA.
- MMA 2006. **Los incendios forestales en España durante el año 2005**. Madrid, España: Ministerio de Medio Ambiente: 119 p.

- MMA 2007. **Los incendios forestales en España durante el año 2006 – Draft Redet**. Madrid, España: Ministerio de España de Medio Ambiente: 26 p.
- Piñol, Josep; Terradas, Jaume; Lloret, Francisco. 1998. **Climate warming, wildfire hazard, and wildfire occurrence in coastal eastern Spain**. Climatic Change 38: 345-357
- Riera, Dee; Mogas, Joan. 2004. **Evaluation of risk reduction in forest fires in a Mediterranean region**. Forest Policy and Economics 6:521 – 528.
- Riera, P., J. Peñuelas, V. Farreras and M. Estiarte. 2007. Valuation of climate-change effects on Mediterranean shrublands. Ecological Applications: 17:91–100.
- SPSS. 2006. **SPSS 15.0** [Programa de computadora]. Chicago, IL: LEAD Technologies Inc.
- Unsworth, Robert E.; Bishop, Richard C. 1994. **Assessing natural resource damages using environmental annuities**. Ecological Economics 11 (1):35–41.
- Xanthopolus, Gavriil; Caballero, David; Galante, Miguel; Alexandrian, Daniel; Rigolot, Eric; Marzano, Raffaella. 2006. **Forest Fuels Managament in Europe**. De: Andrews, Patricia L.; Butler, Bret W., comps. Fuels Management – How to Measure Success: Conference Proceedings. 28-30 de marzo de 2006; Detland, OR. Proceedings RMRS-P-41. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture Forest Service, Rocky Mountain Research Station; 29-46.

Los Impactos de los Fuegos y la Vulnerabilidad Socioeconómica de los Ecosistemas Forestales: Un Enfoque Metodológico Usando Teledetección y Sistemas de Información Geográficos¹

**F. Rodríguez y Silva², J. R. Molina Martínez ², M. Herrera Machuca²,
y R. Zamora Díaz²**

Resumen

La creciente demanda por parte de las administraciones con responsabilidades en la gestión del territorio de productos cartográficos con integración de variables descriptoras del medio forestal, está implicando a su vez un incremento en la investigación y desarrollo de herramientas y productos basados en sistemas de información geográficos. Las capacidades operacionales que brinda la disponibilidad de cartografía temática para su aplicación en la toma de decisión, y la facilidad de inclusión de modificaciones y adaptaciones según las necesidades y tipo de gestión de los recursos naturales, convierte a la información cartográfica digital en una herramienta de trabajo de gran utilidad en los programas de defensa contra incendios forestales.

El reconocimiento y valoración de los ecosistemas forestales, es básico cuando se aborda la planificación espacio temporal de las medidas para la defensa contra incendios forestales en un territorio. En este sentido y extendiendo el estudio de diagnóstico desde la perspectiva conceptual de la vulnerabilidad, se presenta en este trabajo el procedimiento metodológico desarrollado para reconocer, evaluar, calcular e integrar los resultados en términos económicos del conjunto de los recursos forestales existentes en el área de estudio, analizando dicha valoración bajo el efecto de los niveles potenciales de intensidad de fuego que pueden llegar a generar la presencia de incendios. La integración de los algoritmos de cálculo con las herramientas de interpolación y procesamiento cartográfico, facilita la elaboración de mapas que permiten realizar el seguimiento espacial y temporal, tanto diferenciado por cada uno de los recursos identificados en el área, como del valor integral de los existentes en cada una de las unidades espaciales de evaluación. La incorporación de evaluaciones de efectos post-fuego mediante tratamiento de imágenes de satélite (Modis),

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de Incendios Forestales: Problemas y enfoques comunes, 29 de abril al 2 de mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² Departamento de Ingeniería Forestal. Universidad de Córdoba. Avd. Menéndez Pidal s/n. 14071, e-mail: ir1rosif@uco.es; o92momaj@uco.es; mherrera@uco.es; ir1zadir@uco.es.

permite ajustar los resultados de los índices normalizados de vegetación y los niveles de intensidad de fuego, con el fin de obtener ratios porcentuales para determinar la depreciación económica que se producen en los recursos forestales por afectación directa de incendios.

El resultado analítico de la vulnerabilidad socioeconómica, se integra dentro del marco de trabajo del proyecto de investigación FIREMAP (CGL2004-06049-C04-03/CLI financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España), en el que junto a los algoritmos que proporcionan la probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad ecológica, se determina el índice de riesgo sintético de incendios forestales, mediante el análisis integrado de herramientas de evaluación económica, ecológicas, SIG y teledetección.

Palabras clave: Vulnerabilidad. Nivel de intensidad de fuego, Sistemas de información geográfica, Teledetección, Planificación de la defensa contra incendios forestales, Diagnóstico del riesgo.

Introducción

La determinación de la vulnerabilidad socioeconómica frente al impacto de los incendios forestales, se aborda en el presente trabajo, dentro del contexto del proyecto de investigación denominado “Análisis Integrado del Riesgo de Incendios Forestales, Mediante el Uso de Sistemas de Información Geográficos (financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, España). Dicho proyecto responde a la modalidad de proyecto coordinado siendo su objetivo de trabajo, la integración mediante un índice de riesgo sintético de un conjunto de variables sensibles al impacto de los incendios forestales, pudiéndose citar entre ellos la vulnerabilidad ecológica, la vulnerabilidad socioeconómica, la variabilidad de la humedad de los combustibles analizada mediante índices derivados del tratamiento de imágenes de satélite, la ocurrencia de rayos, el riesgo de incendio por efecto antrópico y la caracterización del comportamiento del fuego. La determinación de un algoritmo integrador de todos ellos y la automatización de cálculo y gestión mediante sistemas de información geográfica, se constituye como eje central del proyecto en la idea de proporcionar una herramienta de gran versatilidad para su uso en la gestión operacional de las administraciones e instituciones públicas con responsabilizadas en la defensa contra incendios forestales.

Procedimiento y esquema metodológico desarrollado, para obtener la vulnerabilidad socioeconómica frente a los incendios forestales.

La determinación de la vulnerabilidad socioeconómica se ha planteado mediante el desarrollo de un conjunto de algoritmos que permiten evaluar las repercusiones de los

incendios forestales en los recursos naturales, tanto de naturaleza tangible como intangibles. La unidad espacial definida para la determinación geográficamente referenciada de las variables interpretativas de la valoración económica, ha sido la celda de 10x10km, pudiéndose posteriormente rasterizarse la información en celdas menores de 1x1km. La decisión del tamaño de la celda de 10 km, se justifica por la conexión con la base de datos nacional de la estadística de incendios forestales, que usa esta dimensión para referenciar espacialmente la ocurrencia de incendios forestales.

El esquema general seguido ha sido en primer lugar la toma de contacto e identificación del conjunto de variables que son necesarias para el desarrollo de los algoritmos, simultáneamente han sido identificadas las coberturas digitales existentes que permiten obtener, relacionar e interpolar las variables que han sido seleccionadas para el cálculo de las variables dependientes que proporcionan la solución de los algoritmos desarrollados. Con posterioridad se ha integrado el conjunto de variables explicativas de la valoración socioeconómica en un modelo de vulnerabilidad representativa de la celda estudiada, finalmente el volcado cartográfico ha proporcionado el mapeo de la vulnerabilidad socioeconómica ante el impacto de los incendios forestales en cada una de las unidades territoriales estudiadas, el modelo operacional y la arquitectura de cálculo seguida ha estado dirigida a facilitar la adaptación y aplicabilidad del procedimiento en otras áreas diferentes de las seleccionadas como experimentales para el desarrollo del modelo (Rodríguez y Silva y otros 2007) (figura 1).

Figura nº: 1

Figura 1— Representación de los elementos claves del sistema diseñado.

Fases de los trabajos

1. En una primera fase se ha procedido a realizar la revisión bibliográfica del estado del arte en cada uno de los bloques (1 a 5):

1.1. Valoración socio-económica del paisaje y de las capacidades de recreo.

1.2. Valoración socio-económica de la producción de sistemas forestales

1.3. Análisis de las interrelaciones ambientales y de la protección que proporcionan los sistemas forestales

1.4. Valoración socio-económica de los servicios que ofrecen los sistemas forestales

1.5. Valoración socio-económica de la propiedad presente en el medio forestal

2. En una segunda fase se analizó la viabilidad del empleo de los métodos de evaluación de mayor aceptación, afrontando cuando ello fue necesario la adaptación o desarrollo de herramientas y/o expresiones de cálculo que mejor aproximen la valoración económica al recurso natural objeto del análisis. En este sentido y para el caso de los recursos de naturaleza intangible han sido contrastados métodos de evaluación económica tales como “valoración contingente” y “método de costos de viaje” con aplicación a los bloques (1 a 5).

3.- En una tercera fase se procedió a delimitar e inventariar las variables requeridas en el área de estudio, considerándose para ello que en el recinto definido exista una representación variada de los recursos forestales, a fin de fortalecer el modelo integrador de las diferentes valoraciones, permitiendo ello, la aplicabilidad del método en áreas diferentes a la definida para acometer las experimentaciones objeto del presente proyecto.

4.- En una cuarta fase se procedió a determinar los niveles de intensidad de los incendios de acuerdo a la ocurrencia histórica y las características espaciales por donde potencialmente puedan originarse y evolucionar, a fin de establecer las correlaciones necesarias entre emisiones energéticas y efectos en los recursos forestales afectados. Simulaciones mediante el programa “Visual Cardin-Nuatmos” permitieron conocer el comportamiento espacializado de los incendios potenciales, empleándose como herramientas complementarias, los antecedentes en incendios acaecidos y al análisis de impactos mediante el tratamiento de imágenes de satélite. La disponibilidad geográficamente referenciada de los impactos permitió evaluar de forma cualificada el alcance económico de los daños y perjuicios potenciales.

5.- En una quinta fase se determinó para la zona de estudio y experimentación, la evaluación económica de la renta que produce el medio forestal y la evaluación económica de los daños y perjuicios por nivel de intensidad de incendio potencial y para cada uno de los bloques temáticos indicados, con excepción del bloque (5).

En la valoración socioeconómica por celda se han considerado de forma diferenciada la determinación cualitativa y cuantitativa de los aspectos ambientales,

de ocio y recreo, de los recursos naturales, del paisaje y de las propiedades presentes. En el grupo de los recursos naturales han sido considerados e integrados en el modelo los siguientes bloques: madera, corcho, frutos, leña, recursos cinegéticos y piscícolas, productos menores (apicultura, setas,...). La presencia de especies catalogadas con rangos de protección y monumentos naturales, de igual modo han sido reconocidos, valorados y localizados en el modelo.

En el bloque de los aspectos ambientales, han sido analizados y valorados las particularidades inherentes a la fijación y pérdida de carbono, erosión y el no uso. La creciente importancia que en la actualidad presenta el recurso paisaje, ha motivado que éste haya sido tenido en cuenta, desarrollándose un algoritmo de evaluación y valoración socioeconómica, que reconoce la consideración que hoy la sociedad le presta y considera. Para ello se han analizado los siguientes aspectos: calidad y fragilidad, realizándose el análisis en tres fases, el paisaje intrínseco, el entorno inmediato y el fondo escénico (figura 2).

Figura n°:2

Figura 2—Metodología de estudio del recurso paisaje.

La asignación de la valoración cuantitativa del recurso paisaje ha sido obtenida mediante el uso de técnicas econométricas de valoración contingente (figura 3).

Valoración cualitativa

$$Vp_{celda} = \sum Fp_i \times Vp_i$$

Vp	Vpe
30 – 35.....	1
35 – 40.....	2
40 – 42.....	3
42 – 45.....	4
45 – 50.....	5
50 – 55.....	6
55 – 60.....	7
> 60.....	8

Figura n°: 3

Figura 3— Valoración cualitativa del recurso paisaje.

El estudio y valoración del recurso ocio y recreo ha sido obtenido integrando la representatividad y calidad del paisaje con la aplicación del método del “coste-viaje” (Riera 2000), para de esta forma obtener la función de demanda que permite valorar económicamente las preferencias de los ciudadanos en relación con la mayor o menor capacidad que el entorno natural presenta (figura 4). La valoración económica obtenida mediante la función de demanda ha sido ponderada con un factor que relaciona la calidad del paisaje cuya valoración se analiza en relación con la calidad de la comarca a la que pertenece.

ASIGNACIÓN DEL VALOR RECREATIVO

MÉTODO COSTE- VIAJE

1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO
2. FUNCIÓN DE DEMANDA
 - a) Planteamiento de la curva de demanda.
DIAS; RENTA; IMPORTANCIA; DAP; VECES; KM; TIEMPO; EDAD;
COSTE; DIASAÑO;
 - b) Variable “ Coste del viaje ”.
Coste de desplazamiento; coste circunstancial; coste del tiempo
 - c) Soluciones aportadas a las dificultades originadas durante el análisis.
 - d) Cálculo de frecuencias de visitas.
 - e) Análisis estadístico de los datos.

Figura n°: 4

Figura 4—Asignación del valor recreativo usando el método del coste-viaje.

La función de demanda usada es la siguiente:

$$D_{ij} = f(C_{ij}, R_{ij}, V_{ij}, E_{ij}, I_{ij})$$

Donde, **D** es el número de días al año que el visitante “i” pasa en el lugar “j”, **C_{ij}** es el coste que le supone a la persona “i” el viaje “j”, **R** es la renta del visitante “i”, que adopta 4 valores obtenidos de la encuesta, **V_{ij}** son las veces al año que el visitante “i” va al lugar “j”, **E** es una variable ficticia que toma el valor 1 si el encuestado esta dispuesto a pagar una entrada y el valor 0 si no lo esta, e **I** representa la importancia que el individuo “i” concede a las áreas forestales, toma el valor 4 si es una importancia máxima y 1 si es una importancia mínima.

Una vez conocida la curva de demanda el cálculo del valor económico del lugar puede estimarse a partir de la siguiente fórmula (Bishop 1983):

$$VET = \frac{DIAVISITA^2}{2 \times \alpha}$$

Donde, **VET**: es el valor económico total, **DIAVISITA** es el tiempo en días medio que dura la visita, y **α** es el coeficiente estimado en la ecuación de regresión para la variable coste.

Utilizando esta fórmula para cada unas de las zonas de influencia planteadas se obtiene un valor económico total por zona y visitante. Finalmente, se utilizó la frecuencia de visitantes de cada una de las zonas, para la ponderación del valor definitivo por visitante, y se multiplicó éste por el número de visitas al año.

La valoración de los productos forestales ha sido realizada teniendo en consideración el grado de madurez de la masa así como los productos tanto mediatos como inmediatos, realizándose mediante el uso de cartografía digital la revisión pormenorizada de las coberturas existentes. Los productos utilizados para ello son los siguientes:

Mapa Forestal Español

Mapa Forestal de Andalucía

Usos y Coberturas Vegetales Landcover (revisión 2003)

II Inventario Forestal Nacional

Ortofotografía Digital

Modelo Digital del Terreno

La valoración ha sido determinada según la catalogación de los productos forestales (Martínez Ruiz 2005) aplicándose un algoritmo genérico al que se le ha ido incorporando modificaciones en razón al tipo de producto y edad media de la masa en la que se encuentra localizado. Con posterioridad, el cambio neto en el valor de los recursos fue corregido mediante el mapa de productividad forestal (figura 5).

Valoración final = φ x K x S

Donde, ϕ es la función de armonización, K es la fracción de cabida cubierta, y S es la superficie afectada para cada especie por el fuego.

La función de armonización es:

$$\phi = \frac{a \times E \times B}{E + b \times B}$$

Donde, a , b son coeficientes, E es la variable según los turnos de crecimiento, y B la variable adaptada a los ecosistemas mediterráneos.

Variable de aplicación para cada Nivel de Intensidad del Fuego (NIF) y especie:

$$B = \left[\frac{V \times P^* \times c^n}{1.04^n} \right] \times \left[1 - \left(\frac{c}{1.04} \right)^e \right] \times [1 + X \times h \times t]$$

Donde, B es la variable a estimar, V el volumen a cortar m^3/ha (previsión de futuro), P^* el precio del m^3 de madera apeada (euros), c el coeficiente, n es el número de años que restan hasta el turno de corta, e es la edad actual de la masa, X es el coeficiente de mortalidad y depende de la t , h es el porcentaje de masa inmadura y madura de la especie (i), en el total de la masa, y t es el porcentaje de la masa afectada para un nivel de intensidad del fuego (NIF) expresado en función de la longitud de llama pronosticada según el comportamiento del fuego.

El método de cálculo de la X y t , aparece detallado más adelante.

Variable E según los turnos de crecimiento:

$$E = Co * t * K [i^e + g(i^e - 1)] + A [i^e - 1]$$

Donde, E es la variable según los turnos de crecimiento, Co es el coste de repoblación de una hectárea de terreno (euros/ ha), t es el porcentaje de la masa afectada para un nivel de intensidad del fuego expresado en función de la longitud de llama pronosticada según el comportamiento del fuego, K es la fracción de cabida cubierta arbórea, i , g es la tasa de interés que fluctúa dependiendo del turno de la masa, A es el valor de una hectárea de suelo (euros/ha), y e es la edad actual de la masa.

Figura n°:5

Figura 5—Valoración económica de los recursos naturales.

La aplicación del algoritmo mediante herramientas geográficas (Walpole y otros 2005) proporciona mapas de interpretación de la valoración socioeconómica de la producción forestal. En el contexto del proyecto FIREMAP, se han realizado minuciosos estudios en la provincia de Huelva a través de las cinco comarcas en esta provincia establecidas, de las que se dispone la correspondiente colección de cartografía digital (figura 6).

La actividad cinegética se presenta como un recurso sostenible en el tiempo que tiene mercado de valoración, ya que las piezas de caza tienen un precio de transacción mercantil. El procedimiento seguido para valorar este bien es el de obtener un valor para cada ecosistema como la suma de las rentas cinegéticas anuales actualizadas y el stock reproductor:

$$V = R / i$$

Donde, **V** es el valor a efectos cinegéticos, **R** es la renta cinegética anual sostenible, **i** es el tipo de actualización. Se ha asignado una renta cinegética anual **R**, para cada base y vuelo (Mapa Forestal Español), de forma que se puede obtener el valor cinegético de cuadrícula como suma de los valores de cada tesela. Para realizar la valoración fue necesario establecer los porcentajes medios de la fracción de cabida cubierta arbórea y arbustiva por estratos y para cada una de las cuadrículas de 10 x 10

Km. en que se divide la comarca.

Figura n°: 6

Figura 6—Cartografía digital de la valoración de diferentes recursos en provincias de Huelva, España.

El porcentaje de fracción de cabida arbórea se obtiene partir de los datos que aparecen recogidos en el Segundo Inventario Forestal Nacional. A través de los diámetros de los pies por parcelas y estratos, puede accederse a las tablas que relacionan clases diamétricas y tamaño medio de copa. También se conoce el número de pies por parcela y estrato, que multiplicado por el tamaño medio de copa sirve para obtener el porcentaje de cabida arbórea para cada estrato por parcela.

Los datos obtenidos fueron geográficamente referenciados e interpolados según estratos y cuadrículas con el programa ArcGis 8.3. Tras ese proceso se realizó una media con los datos obtenidos para cada estrato de manera que se obtuvo el valor de cabida arbórea medio por cuadrícula. Cuando el estrato estuvo formado por mezcla de varias especies, los cálculos se realizaron de acuerdo con el proceso anterior considerando todos los datos por separado para cada una de las especies.

Una vez obtenido el valor de representación de cabidas arbóreas y arbustivas para cada cuadrícula, se multiplicó por la suma de las rentas cinegéticas y por la superficie de cada cuadrícula dentro de la comarca y se obtuvo el resultado final. Para

realizar todo el proceso de cálculo por cuadrículas, se trabajó con un modelo de tablas como el que se muestra a continuación (tabla 1), en la que aparece como ejemplo la cuadrícula E06 de la provincia de Huelva (España) (figura 7).

CUAD	Pcto. Arbust	Pcto. Arbor	S base	S vuelo	Tot-suma	SUP	TOTAL
E06	0,12	0,88	18,00	54,00	49,64	184,54	9.159,77

Tabla 1-- resultados de las pérdidas económicas de caza (euros).

Figura n°:7

Figura 7—Valoración de los recursos cinegéticos.

Donde, **Cuad** es la cuadrícula de estudio, **Pcto. Arbust** es el porcentaje medio por cuadrícula de estrato arbustivo, **Pcto. Arbor** es el porcentaje medio por cuadrícula de estrato arbóreo, **S base** es la suma de las rentas cinegéticas asociadas a las bases en cada cuadrícula (euros), **S vuelo** es la suma de las rentas cinegéticas asociadas a los vuelos en cada cuadrícula (euros), **Tot-suma** es la suma parcial (euros/ha), **Sup** es la superficie de cada cuadrícula (ha), y **Total** es la suma total (euros).

Con la disponibilidad de los resultados completos, proporcionados por los diferentes algoritmos desarrollados para la evaluación y medición de cada una de las variables pertenecientes a los bloques anteriormente indicados, se aborda la determinación de la depreciación que el impacto del fuego, de condiciones más

frecuentes en el área (comportamiento del fuego), puede llegar a desarrollar. Para ello se ha analizado la combustibilidad y su dinámica espacial, asignando a cada celda de estudio las particularidades energéticas de la propagación del fuego. De la información obtenida y mediante el establecimiento de los niveles de intensidad del fuego (clasificación basada de acuerdo con la longitud de llamas), se ha determinado una matriz de coeficientes de depreciación que permite identificar el alcance del impacto del incendio en los diferentes recursos naturales existentes en la comarca (figura 8).

Figura n°: 8

Figura 8—el comportamiento del fuego por nivel de intensidad indica el porcentaje de afectación de su valor socioeconómico.

Para la determinación ajustada y validación de los porcentajes de disminución o depreciación del valor económico por hectárea de los diferentes recursos naturales incluidos en la valoración, se ha desarrollado una metodología basada en el empleo de imágenes de satélite de incendios forestales. El procedimiento seguido ha sido el de obtener el valor porcentual de afectación en función de dos variables independientes:

Intensidad lineal promedio del frente de llamas (kw/m) del píxel analizado, generado por la combustión de la vegetación forestal. Esta variable posteriormente fue traducida a su equivalente en longitud de llamas (m).

Índice normalizado de vegetación (cociente de la información radiométrica, obtenida entre la diferencia correspondiente a las bandas del infrarrojo cercano y del rojo, dividido por la suma de ambos valores)

$$NVDI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

El rango de variación del NVDI, varía entre (-1) y (+1)

- Agua, nieve y nubes. $-1 \rightarrow 0$, Reflejan más radiación roja que infrarroja.
- Roca y suelo desnudo. ≈ 0
- Vegetación. $0 \rightarrow 1$, Valores positivos.
- Alto estado de vitalidad ≈ 1
- Incendios y alto estrés. Valores positivos pero bajos.

En el tratamiento de las imágenes analizadas, se han considerado escenarios anteriores y posteriores a los incendios, con el fin de conocer la respuesta de la vegetación, comparando en un mismo píxel los resultados, a fin de identificar el comportamiento del índice.

Para esta primera aproximación metodológica se han realizado investigaciones de campo en dos incendios forestales ocurridos en el año 2006 en las provincias de Huelva (Incendio de Alajar) y de Málaga (Incendio de Gaucín). Ambos con más de 500 hectáreas, y con una gran diversidad de vegetación forestal. Esta situación ha permitido extender los resultados a una mayor combinación de combustibles forestales.

Las imágenes estudiadas corresponden a las obtenidas a través del sensor MODIS, localizado en los satélites Terra y Aqua (NASA). La resolución espacial de las imágenes consideradas es de 250x250 metros

El procedimiento seguido fue el de localización en las áreas afectadas por los incendios, de un conjunto de parcelas de identificación de la severidad en cada uno de los recursos forestales en los que previamente se había determinado su valoración socioeconómica. La severidad fue medida en función de la altura de chamuscado (en el caso del dosel arbolado) y en función del porcentaje de consumición de la vegetación (en el caso de matorrales).

En cada celda o grid de 250x250 metros, fueron medidas 9 parcelas circulares de 10 metros de diámetro. Entre los centros de las parcelas se estableció una distancia de 125 metros y los transectos de muestreos fueron realizados según líneas perpendiculares. Los centros de cada parcela fueron identificados mediante sus coordenadas geográficas, medidas con GPS (dotado de corrección diferencial). La información considerada en el grid, fue la de la tipo de cobertura vegetal dominante (mayor del 75% de la superficie), a fin de extender los resultados de la severidad de medida en campo a los grupos de matorrales, arbolado de coníferas, arbolado de frondosas y arbolado mixto.

Con posterioridad se realizó un estudio de reconstrucción del comportamiento del fuego, determinando para cada parcela, la longitud de llama promedio que

desarrolló la propagación del fuego. En este proceso de cálculo se utilizaron los simuladores Visual-Cardin y Visual-Behave (Rodríguez y Silva 1997, 2002). Con los datos obtenidos se elaboró una matriz integrada por los resultados obtenidos para cada píxel del terreno en el que se interrelacionaron, el porcentaje de severidad (en términos de mortandad de la vegetación afectada), el nivel de intensidad del fuego (dependiente de la longitud de llama) y el índice normalizado de vegetación (NDVI), (figura 9).

Figura 9-- reconstrucción del comportamiento del fuego, determinando para cada parcela, la longitud de llama promedio que desarrolló la propagación del fuego.

Como avance de los estudios en proyecto se ha obtenido una ecuación de regresión multivariable que proporciona el porcentaje de depreciación que aplicado sobre el valor socioeconómico inicial, proporciona tanto las pérdidas ocasionada por el incendio forestal como el valor económico residual de la vegetación no afectada por el fuego.

El modelo de regresión obtenido presenta la siguiente ecuación:

$$\%Dep = 0,38648 + 0,0795303\phi - 0,524952\beta; \text{ con } R^2 = 0,89$$

Donde, %Dep representa el porcentaje de depreciación del valor económico del recurso forestal (coberturas vegetales), Φ representa el nivel de intensidad de fuego promedio en el píxel (NIF), y β representa el valor obtenido para el índice normalizado de vegetación en el píxel analizado.

Transitoriamente y hasta la obtención final de los modelos de depreciación para cada una de los recursos, se ha propuesto la tabla empírica de porcentajes de depreciación según el nivel de intensidad de fuego (NIF) determinado en cada píxel (figura 10). En la actualidad se están desarrollando estudios de obtención de los algoritmos y validación en un escenario de 2.500 hectáreas, afectado por un gran incendio acaecido los días 29 a 31 de julio del año 2007, en la provincia de Córdoba (Incendio de Córdoba-Obejo).

NIF	Vrm madera	Vrme frutos	Vrc corcho	Vrp pesca	Vrca caza	Vrpai paisaje
I	10%	5%	20%	1%	10%	5%
II	20%	10%	45%	5%	25%	15%
III	40%	20%	65%	10%	45%	35%
IV	60%	45%	85%	25%	65%	55%
V	80%	65%	95%	35%	85%	85%
VI	90%	75%	100%	45%	100%	100%

Figura n°: 10

Figura 10 -- tabla empírica de porcentajes de depreciación según el nivel de intensidad de fuego (NIF) determinado en cada píxel

Finalmente, se determinó la conversión a ratio o índice de riesgo por vulnerabilidad socioeconómica, mediante una matriz de conversión de unidades monetarias en índices cualitativos que clasifican la gravedad potencial que el impacto de posibles incendios forestales pueden llegar a generar en la comarca en estudio, facilitándose a la vez la conexión con otros índices procedentes de otras valoraciones en el contexto del proyecto FIREMAP (figura 11).

Figura nº: 11

Figura 11-- índice de riesgo por vulnerabilidad socioeconómica.

Agradecimientos

Los autores del trabajo desean expresar su agradecimiento al proyecto FIREMAP del Ministerio de Educación y Ciencia (CGL2004-06049-C04-03/CLI) y a las organizaciones públicas autonómicas.

Referencias

- Bishop, R., Heberlein, T., Kealey, M.J. 1983. Contingent Valuation of Environmental Assets: Comparisons with a Simulated Market. *Natural Resources Journal*, 23: 619-633.
- Martínez Ruiz, E. 2005. *Manual de Valoración de Montes y Aprovechamientos Forestales*. (En Español). Madrid: Ediciones Mundi-Prensa; 184 pp.
- Riera Font, A. 2000. Mass tourism and the demand for protected natural areas: A travel cost approach. *Journal of Environmental Economics and Management* 39(1): 97-116.
- Rodríguez y Silva, F. Molina JR. Herrera M. Zamora R. 2007. Vulnerabilidad socioeconómica de los espacios forestales frente al impacto de los incendios, aproximación metodológica mediante sistemas de información geográficos (proyecto Firemap). IV International Wildland Fire Conference. Proceedings. Sevilla. (www.wildfire07.es)
- Riera Font, A. 2000. Mass tourism and the demand for protected natural areas: A travel cost approach. *Journal of Environmental Economics and Management* 39(1): 97-116.
- Walpole, S.C., Sinden, J.A., 2005. BCA and GIS: integration of economic and environmental indicators to aid land management decisions. *Ecological Economics* 23: 45-47.

Una Función de la Disposición a Pagar por Dos Tratamientos de Combustible Para Reducir la Cantidad de Acres Quemados por Incendios Forestales: Una Prueba de Alcance y una Comparación de Viviendas de Blancos e Hispanos¹

John B. Loomis², Le Trong Hung³ y Armando González-Cabán⁴

Resumen

Hemos calculado una función de beneficios marginales de los programas de quema prescrita y disminución mecánica de combustibles para reducir la cantidad de acres quemados por los incendios forestales en tres estados. Debido a que la disminución de acres quemados fue diferente para cada estado, un coeficiente estadísticamente significativo de la disminución de acres quemados también es una prueba de alcance de una muestra cuarteada que se emplea con frecuencia como indicador de la validez interna de las encuestas de valoración contingente. En este trabajo se emplea el método dicotómico de valorización contingente para hacer una prueba de cuán sensible es la disposición de los encuestados a pagar por programas de quema prescrita y de disminución mecánica de combustibles a la reducción en la cantidad de acres quemados por los incendios forestales. Los modelos *logit* fueron estimados para hogares de personas blancas e hispanas en California, Florida y Montana. Los resultados de las regresiones *logit* muestran que la variable de disminución de acres quemados es estadísticamente significativa al 1% para los programas y grupo de personas propuestos. El signo positivo de esta variable indica que mientras mayor sea la reducción en acres propuesta, más probabilidades hay de que las personas se interesen en pagar por los programas de reducción de combustibles. Debido a la importancia de la variable de reducción de acres en la función de disposición a pagar, esta función puede utilizarse para evaluar los beneficios incrementales de los distintos planes de manejo de incendios forestales que reducen la

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes; 29 de abril al 2 de mayo, 2008, Carolina, Puerto Rico.

2. Catedrático, Department of Agricultural and Resources Economics, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523- USA. E-mail: John.Loomis@colostate.edu

3. Director, Department of Economics and Business Management- Forestry University of Vietnam, XuanMai- HaTay- Vietnam. E-mail: hungtl03@yahoo.com.

4. Economista Investigador, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU., Riverside, CA 92507- USA
Email: agonzalezcaban@fs.fed.us

cantidad adicional de acres quemados. Estos beneficios podrían emplearse como justificación presupuestaria al uso de programas de quema prescrita y de reducción mecánica de combustibles para proteger los bosques del peligro de los incendios forestales.

Palabras clave: California, disposición a pagar, Florida, Montana, prueba de alcance, quema prescrita, reducción mecánica de combustibles, valorización contingente

Introducción

En agosto 20 de 2002, el presidente George W. Bush aprobó la iniciativa de bosques saludables para restaurar los bosques y pastizales del oeste de Estados Unidos, particularmente en los terrenos públicos y en áreas de interfaz urbano-forestal. Como parte de esta iniciativa, las agencias de recursos naturales aumentarán el uso de dos métodos de tratamiento de combustibles: la quema prescrita y la reducción mecánica de combustibles. La quema prescrita se describe como la aplicación controlada de fuego a combustibles naturales en condiciones ambientales específicas (División Forestal de Florida, 2000). La reducción mecánica de combustibles consiste en la remoción mecánica de árboles pequeños y vegetación. Este método de reducción mecánica de combustibles es particularmente efectivo para reducir la altura de la vegetación, lo que disminuye la capacidad del fuego para subir desde el suelo hasta la copa de los árboles.

En los terrenos públicos no hay señales del mercado que revelen el valor o la demanda de estos programas de reducción de combustibles. Proveer este tipo de información permitiría a los administradores de programas y a quienes deciden la política pública establecer el nivel eficiente de los programas de quema prescrita y reducción mecánica de combustibles (en adelante, programas RX y Mech) en cada estado. Para estimar este valor, generalmente se utiliza el método de valorización contingente y se obtiene la disposición a pagar del encuestado por los programas propuestos.

La valorización contingente es un método de encuesta directa en el cual cualquier prejuicio por parte de los encuestadores, el diseño y la implementación de la encuesta o del encuestado, puede poner en riesgo la confiabilidad y validez de los estimados de la disposición a pagar (DAP). Una forma de valorar la validez interna es contestando la siguiente pregunta: ¿Varía la disposición a pagar con los factores que la influyen según la teoría económica? (Arrow et ál. 1993). Una de las verificaciones lógicas es que el DAP debería incrementar cuando se ofrecen más “beneficios”. A esto generalmente se le llama análisis de efectos de alcance o de alcance de sensibilidad. El alcance de sensibilidad se considera una condición necesaria para la validez del DAP. Por consiguiente, la prueba de alcance, para medir

la sensibilidad del DAP conforme a los cambios en los niveles o la amplitud del programa público, ha atraído una investigación sustancial y se ha considerado una prueba crucial en un estudio de valorización contingente. La prueba de alcance podría ser interna al encuestado o externa a la muestra. La prueba de alcance interna se emplea para probar diferencias en el DAP para diferentes niveles de beneficios en el mismo encuestado; la prueba externa mide el cambio en DAP para distintos encuestados a través de la muestra, en diferentes niveles del beneficio público.

Se han conducido pruebas de alcance en CVM utilizando entrevistas personales (Carson, Wilkins y Imber 1994) y algunas encuestas por correo (Loomis y Ekstrand 1997). Carson (1997) señala que aunque algunas encuestas CVM no pasan la prueba de alcance, muchas sí la superan. Las pruebas de alcance han sido evaluadas desde el punto de vista de calidad ambiental y la visibilidad (Smith y Osborne 1996), y en países en desarrollo (Memon y Matsuoka 2002), pero hasta donde sabemos, no se han hecho pruebas de alcance externas para el manejo de incendios forestales y bosques, ni para encuestados de habla española.

Objetivos de estudio

El propósito de este estudio es conducir una prueba de alcance que determine si, en los hogares de blancos e hispanos, la disposición a pagar, por hogar, para la quema prescrita y los programas de reducción mecánica de combustibles, aumenta con el número de acres de bosques protegidos. Hasta donde sabemos, esta es una de las primeras pruebas de alcance de encuestados hispanos que toman la encuesta en español. Además, ofrecemos funciones DAP relacionadas con el DAP por acres de bosques protegidos contra incendios que pueden ser útiles a administradores y a quienes formulan la política pública.

La ecuación de regresión y la hipótesis de la prueba de alcance

En nuestro estudio de los programas de reducción de combustibles, llevamos a cabo pruebas de alcance acerca del impacto de una disminución en los acres de bosque incendiados sobre la disposición a pagar. Esperamos que esta variable de reducción de acres sea significativa y que el signo del coeficiente sea positivo; específicamente, mientras más grande la reducción de acres de bosque quemados, más serán las personas dispuestas a pagar. Podemos realizar una prueba de alcance externa porque, la cantidad de reducción de acres varía en los tres estados de California, Florida y Montana, y controlamos las diferencias en las características demográficas y en las actitudes en los tres estados.

Primero, definimos las probabilidades de votar por el programa de quema prescrita como:

$A = P_i/(1-P_i)$ y entonces tomamos el logaritmo para el modelo *logit*:

$$\ln(A) = \beta_0 + \beta_1 \text{ReducciónAcres} + \beta_2 \text{RXBid} + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + u_i \quad (1)$$

De forma similar, calculamos las probabilidades de votar por el programa de reducción mecánica de combustibles:

$$\ln(A) = \beta_0 + \beta_1 \text{ReducciónAcres} + \beta_2 \text{MechBid} + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + u_i \quad (2)$$

Para controlar cualquiera de las diferencias a través de los estados, incluimos las variables demográficas y de actitud de los encuestados que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1-- variables en el modelo logit de la disposición a pagar

Variables	Explicación de las Variables
VotoRXPr	Variable dependiente: 1 si el encuestado vota por programa RX, de lo contrario, 0
VotoMechPr	Variable dependiente: 1 si el encuestado vota por programa Mech, de lo contrario, 0
Reducción Acres	Reducción acres de bosque incendiado
Edad	Edad del encuestado
Educ	Educación del encuestado
Exp humo	Variable ficticia: 1 si el encuestado experimentó humo de un incendio forestal o fuego prescrito, de lo contrario, 0
Ingreso	Ingreso en hogar del encuestado
Prophogar	Variable ficticia: 1 si encuestado posee hogar, 0 si encuestado alquila
Probresp	Variable ficticia: 1 si encuestado sufre problemas respiratorios, de lo contrario, 0
RXoferta	Cantidad que se le pide al encuestado que pague por programa RX
Mechoferta	Cantidad que se le pide al encuestado que pague por programa Mech program
Testigofuego	Variable ficticia: 1 si encuestado presencié incendio forestal, de lo contrario, 0

La prueba de alcance implica examinar si el signo de la variable de reducción de acres es o no positivo. Por consiguiente, la hipótesis nula sería:

$$H_0: \beta_1 = 0 \text{ y } H_A: \beta_1 > 0.$$

Se llevará a cabo una prueba de la -t.

Diseño de la encuesta

Se creó un folleto de encuesta para proveer al encuestado la información básica de los programas propuestos antes de pedir el DAP. El folleto comenzaba con una discusión de los fuegos grandes en los tres estados el año previo. Contenía información e ilustraciones, contrastando los fuegos con la quema prescrita como parte de la descripción del programa público. Luego se describía con detalle la reducción de acres incendiados y los costos del programa de quema prescrita. Después de votar por el programa de quema prescrita, se introducía la reducción mecánica de combustibles como alternativa. Para este programa se describían los mismos elementos que para el programa RX, en particular la reducción de acres quemados por incendios. Se empleó la siguiente pregunta para obtener el DAP para el programa de quema prescrita:

Si se estableciera el programa de quema prescrita en su condado y en su estado, se esperaría que redujera el número de acres quemados del promedio actual de A acres cada año, a alrededor de B acres, para una reducción de 25%.

Su oportunidad para votar: *El costo a su hogar del programa de quema prescrita será \$X.....al año. Si la expansión del programa de quema prescrita se sometiese a votación en las próximas elecciones, votaría usted:*

A favor..... En contra.....

El \$X se reemplazó por las cantidades monetarias ofrecidas por la quema prescrita, que fueron: \$10, \$20, \$30, \$40, \$60, \$90, \$120, \$150, \$250, y \$350. Las cantidades ofrecidas por la reducción mecánica de combustibles son, en promedio \$10 más altas que aquellas del programa de quemados prescritas. Una pregunta similar se utilizó para el programa de reducción mecánica de combustibles. La tabla 2 muestra la reducción de acres en cada estado

Tabla 2—acres quemados actuales y reducción en acres quemados por los programas RX y Mech

Estados	Acres incendiados actualmente A	Acres incendiados con programa B	Reducción de Acres	
			Programa RX	Programa Mech
California	362,000	272,500	89,500	89,500
Florida	200,000	150,000	50,000	50,000
Montana	140,000	105,000	35,000	35,000

Recolección de información y modalidad de encuesta

Para obtener una muestra representativa se empleó el discado aleatorio de la población. El uso del discado aleatorio asegura que casi todos los hogares sean elegibles para la entrevista. Las encuestas se llevaron a cabo mediante un método de teléfono-correo-teléfono. La entrevista telefónica inicial duraba alrededor de cinco minutos y las preguntas se centraban en introducir los objetivos de la encuesta y obtener la dirección postal para enviar el folleto de la encuesta. Se les solicitó a los individuos que leyeran el folleto antes de la fecha pautada para la entrevista telefónica DAP. Las entrevistas se realizaron en inglés para los hogares blancos y en español para los hispanos en California (CA) y Florida (FL), y solo en inglés en Montana (MT).

En tres estados, CA, FL y MT, los porcentajes de las respuestas a la encuesta de la entrevista a fondo de DAP fueron similares (72.8%, 72.2% y 72.9%, respectivamente). Una prueba chi-cuadrado indica que estadísticamente no son diferentes.

Análisis estadístico de las respuestas DAP

Reunimos información de tres estados para estimar el modelo de prueba de alcance para los programas RX y Mech, controlando cualquier diferencia demográfica o de actitud en los hogares de los tres estados. Probamos si la reducción de acres quemados afecta la probabilidad de contestar afirmativamente a la cantidad propuesta.

Resultados para hogares blancos

La regresión inicial se especifica con variables demográficas y de actitud para controlar las diferencias en los estados. La variable de **reducción de acres** es estadísticamente significativa al nivel 0.01 y 0.1 para ambos programas (tabla 3). El signo positivo de la variable nos indica que los hogares blancos en estos estados estarían dispuestos a pagar más por una reducción mayor de la cantidad de acres de bosques quemados. Se rechaza la hipótesis nula de ningún efecto de la reducción de acres y el DAP es sensible a la reducción de los acres de bosques quemados; es decir, se apoya la hipótesis de sensibilidad de alcance.

Tabla 3—resultados de regresión logit de una prueba de alcance para hogares blancos

Variables	Programa RX		Programa Mech	
	Coefficiente	Estadística t	Coefficiente	Estadística t
Constante	1.4638	(1.84)	0.021	(0.03)
Reducción Acres	1.17E-05	(2.4)^{***}	6.37E-06	(1.65)[*]

RXoferta	-0.00449	(-6.36) ***		
Mechoferta			-0.003	(-4.49) ***
Edad	-0.00323	(-0.51)	0.0039	(0.73)
Educ	-0.0472	(-0.99)	-0.0117	(-0.29)
Exp humo	0.0247	(0.08)	-0.3698	(-1.45)
Ingreso	2.81E-06	(0.91)	5.40E-06	(2.13) ***
Prophogar	0.0228	(0.09)	-0.2139	(-0.96)
Respprob	0.268	(1.14)	0.1095	(0.55)
Testigofuego	-0.07	(0.06)	-0.192	(-0.98)
McFadden R cuadrado	0.0735		0.0438	
Total de observaciones	583		673	

* Significativo al 10% ** Significativo al 5% *** Significativo al 1%

Resultados para hogares hispanos

Para los hispanos, del signo positivo de la variable de **Reducción de Acres** y su estadística t significativa en la tabla 4, podemos observar que mientras mayor es la reducción de acres quemados propuesta, más probable es que los hispanos estén de acuerdo con las cantidades ofrecidas. La variable de **Reducción de Acres** es estadísticamente significativa al nivel 0.01; por ende, aceptamos la hipótesis alternativa con $\beta_1 > 0$ a este nivel. El alcance o cambio en la cantidad de reducción de bosques quemados es estadísticamente significativa y por consiguiente, el DAP es sensible a la cantidad de reducción de acres.

Tabla 4—resultados de regresión logit de pruebas de alcance para hogares hispanos

Variables	Programa RX		Programa Mech	
	Coeficiente	Estadística t	Coeficiente	Estadística t
Constante	1.493	(1.32)	1.7872	(1.83)
Reducción Acres	2.27e-05	(3.4) ***	1.47E-05	(2.63) ***
RXoferta	-0.002716	(-3.26) ***		
Mechoferta			-0.001152	(-1.65) *
Edad	-0.0069	(-0.89)	-0.000218	(-0.03)
Educ	-0.088	(-1.49)	-0.1766	(-3.47) ***
Exp humo	0.2527	(0.96)	0.08188	(0.37)
Ingreso	-4.28E-06	(-0.92)	1.11E-06	(0.28)
Prophogar	-0.2388	(-0.93)	-0.0989	(-0.46)
Respprob	-0.095	(-0.33)	-0.2344	(-0.94)
Testigofuego	0.166	(0.61)	0.1355	(0.59)
McFadden R cuadrado	0.0779		0.06042	
Total de observaciones	478		601	

La forma reducida del modelo logit

Para estimar una función DAP de reducción de acres más útil para la política pública, eliminamos variables que no eran uniformemente significativas para enfocarnos en el

impacto de las variables significativas sobre la la probabilidad de votar a favor de pagar las cantidades ofrecidas. Este modelo excluirá las variables que sean insignificantes, debido a que la inclusión inflaría innecesariamente la varianza, reduciendo la capacidad de las pruebas estadísticas para detectar el alcance y provocando que el modelo sea más difícil de manejar para los gerentes.

La tabla 5 presenta la forma reducida de los modelos logit para los hogares blancos. El alcance es aún más evidente para el programa mecánico, pues la variable de reducción de acres es ahora significativa a un nivel de 1%. Estas ecuaciones logit pueden reparametrizarse en funciones de beneficio o de disposición a pagar por reducciones en acres quemados siguiendo el procedimiento de Cameron (1998), para producir una función directa DAP para reducir acres quemados. Dividiendo la constante y los acres entre el valor absoluto del coeficiente de oferta, obtenemos el DAP por hogar blanco como función de la reducción de acres quemados a consecuencia del programa de quema prescrita:

$$\text{DAP por hogar} = \$174.06 + .002578 (\text{Reducción de Acres})$$

La tabla 6 presenta la forma reducida del modelo logit para los hogares hispanos. Dada la significación estadística de los acres quemados, el alcance continúa siendo evidente para los programas MX y Mech. Aunque la cantidad ofrecida para el programa mecánico es negativa, no es estadísticamente significativa.

Tabla 5—resultados de regresión logit reducida para los hogares blancos

Variables	Programa RX		Programa Mech	
	Coeficiente	Estadística t	Coeficiente	Estadística t
Constante	0.7899	(3.04) ^{***}	-0.4819	(-2.16) ^{**}
Reducción Acres	1.17E-05	(2.7) ^{***}	1.05E-05	(2.9) ^{***}
RXoferta	-0.004538	(-6.91) ^{***}		
Mechoferta			-0.00311	(-4.96) ^{***}

Tabla 6—resultados de regresión logit reducida para los hogares hispanos

Variables	Programa RX		Programa Mech	
	Coeficiente	Estadística t	Coeficiente	Estadística t
Constante	-0.2229	(-0.6249)	-0.9574	(-3.09) ^{***}
Reducción Acres	2.50E-05	(4.69) ^{***}	2.03E-05	(4.69) ^{***}
RXoferta	-0.00247	(-3.19) ^{***}		
Mechoferta			-0.000649	(-1.02)

Conclusión

La prueba de alcance que se realizó en este trabajo muestra que la disposición a pagar por los programas de quema prescrita y reducción mecánica de combustibles entre

los blancos e hispanos es sensitiva a la cantidad de reducción de acres quemados. Mientras mayor la cantidad de acres propuesta, más serán las personas dispuestas a pagar. Este hallazgo es cierto tanto para los hogares blancos que tomaron la encuesta en inglés como para los hispanos que la hicieron en español. Este estudio de caso expande nuestras reservas de conocimiento en cuanto a la prueba de alcance para evaluar la validez del método de valoración contingente. Las ecuaciones logit resultantes pueden convertirse en funciones de beneficio para cada programa de tratamiento de combustible para que los manejadores de incendios las empleen para evaluar los beneficios económicos de reducir los acres de fuegos forestales.

Agradecimientos

Nos gustaría agradecer a Lucas Bair y a Hayley Hesseln su ayuda en el desarrollo de la información utilizada en este análisis.

Referencias

- Arrow, Kenneth, Robert Solow, Paul R. Portney, Edward E. Leamer, Roy Radner, and Howard Schuman. 1993. **Report of the NOAA panel on contingent valuation**. U.S. Department of Commerce, Federal Register 58 (10): 4602-4614.
- Bush, George W. 2002. **Healthy forest: An initiative for wildfire prevention and stronger communities**. Assessed at www.whitehouse.gov/infocus/healthyforests.
- Cameron, Trudy. 1988. **A new paradigm for valuing market goods using referendum data: Maximum likelihood estimation by censored logistic regression**. *Journal of Environmental Economics and Management* 15: 355-379.
- Carson RT. 1997. **Contingent valuation surveys and tests for insensitivity of scope**, in R.J. Koop, W. Pommerhene and N. Schwartz, eds., *Determining the value of non-marketed goods: Economic, Psychological, and Policy Relevant Aspects of Contingent Valuation Methods*. Boston: Kluwer 127-163.
- Carson RT, L Wilks and D Imber. 1994. **Valuing the preservation of Australia's Kakadu conservation zone**. *Oxford Economic paper* 46: 727-749
- Florida Division of Forestry. 2000. **Prescribed fire position paper**. Assessed at www.fl-dof.com/Enr/rx/html.
- Loomis John and Ekstrand Earl. 1997. **Economic benefits of critical habitat for the Mexican spotted Owl: A scope test using a multiple-bounded contingent valuation survey**. *Journal of Agricultural and Resource Economics* 22 (2): 356-366.
- Memon Muchtaq Ahmed and Shunji Matsuoka. 2002. **Validity of contingent valuation estimates from developing countries: scope sensitivity analysis**. *Environmental Economics and Policy Studies* 5: 39-61.
- Smith V K and L Osborne. 1996. **Do contingent valuation estimates pass a scope test? A meta analysis**. *Journal of Environmental Economics and Management* 31: 287-301

Efectos de las Actitudes Hacia el Riesgo en una Decisión de Ataque Extendido¹

Donald G. MacGregor² y Armando González-Cabán³

Resumen

La protección contra los incendios supone la evaluación y el manejo del riesgo y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. A pesar de que los procedimientos organizativos y las guías son factores determinantes importantes para establecer cómo se estructuran y formulan los problemas, las personas que toman las decisiones podrían ver las decisiones basadas en el análisis de riesgos desde una perspectiva particular a su trasfondo y experiencia. Investigaciones anteriores han demostrado que las diferencias individuales en las actitudes hacia el riesgo de los encargados de la protección contra incendios ejercen un efecto significativo en las prácticas de manejo del fuego. En el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU., se consideran incidentes de Ataque Extendido (AE) los incendios que no son contenidos durante el primer período de fuego después de la ignición. Las metodologías basadas en hipótesis ofrecen un acercamiento potencialmente viable que ayuda a comprender mejor el papel que desempeñan las actitudes hacia el riesgo y la formulación del problema en la toma de decisiones claves asociadas a incidentes de AE, y en particular en las decisiones de retirarse del lugar del incidente, regresar al mismo y de hacer la transición a un nivel superior de mando. Los ejercicios hipotéticos en los que los Comandantes de Incidente Tipo III, o ICT-3, responden a las condiciones de un incidente simulado proveen la oportunidad de estudiar el comportamiento en la toma de decisiones basándose en teorías y modelos actuales de toma de decisiones que apuntan a la función de la formulación del problema e incentiva estructuras que sirvan de impulso para la toma de decisiones clave.

Palabras clave: Ataque extendido, evaluación del peligro, manejo de incendios, toma de decisiones.

Introducción

El manejo de incendios involucra de manera intrínseca la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre y el rol de las personas que toman las decisiones es fundamental para lograr cumplir con las metas y los objetivos del manejo de

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y enfoques comunes. 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Científico principal y Director, MacGregor-Bates, Inc., 1010 Villard Ave., PO Box 276, Cottage Grove, OR 97424; Email: donaldrm@epud.net.

³ Economista investigador, Departamento de Agricultura de EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, 4955 Canyon Crest Drive, Riverside, CA 92507; Email: agonzalezcaban@fs.fed.us.

incendios. Para darle un contexto a la toma de decisiones, el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (al igual que otras organizaciones que administran terrenos federales) ha establecido políticas organizacionales, planes y directrices que proveen pautas para guiar a las personas que toman las decisiones hacia las prioridades institucionales fundamentales. En el caso del manejo de los incendios forestales, las prioridades de la organización acerca de la seguridad de los bomberos y del público en general y la protección de la propiedad privada son puntos de referencia que ofrecen una guía contextual sobre cómo deben ser evaluadas las acciones administrativas alternas.

En los últimos años, ha sido más evidente que el rol del administrador individual, aunque es fundamental para cumplir con las metas y la misión de la organización, representa una fuente de variabilidad incomprensida cuando se trata de dar cuenta de las decisiones. Algunas veces, esta variabilidad se expresa en términos de diferentes niveles de “aversión al riesgo” o en cuán propensa a asumir riesgos es cada persona encargada de manejar los incendios. Otras veces, se expresa como un problema de las estructuras de incentivos en las cuales cada encargado evalúa sus decisiones y experimenta los resultados. La investigación empírica en esta dirección requiere el desarrollo de enfoques que permitan observar cómo se toman las decisiones dentro de contextos que simulen situaciones reales de toma de decisiones. El desarrollo de estos enfoques requiere que se integren modelos y teorías pertinentes de las investigaciones acerca del proceso de toma de decisiones con un modelo contextual de toma de decisiones en el manejo de incendios.

Investigación Preliminar

Actitudes individuales ante el riesgo y el comportamiento al tomar decisiones relacionadas con los incendios

A pesar de que los factores organizacionales son importantes para determinar cómo se formulan y estructuran las decisiones, al final, la toma de las mismas se logra gracias al factor humano, ya que las personas encargadas pueden ver los problemas de las decisiones desde una perspectiva distinta (o modificada) a la establecida en los planes y las políticas institucionales. Esto se evidencia en numerosos estudios administrativos que han examinado cómo las actitudes hacia el riesgo de los encargados más experimentados influyen en su comportamiento al tomar decisiones dentro del contexto del proceso de toma de decisiones en la quema prescrita. Cortner, Taylor, Carpenter, y Cleaves (1990) hallaron que, dentro del contexto de la quema prescrita, la propensión que tiene cada individuo a tomar riesgos varía grandemente. Esto se reveló en situaciones hipotéticas de toma de decisiones que involucraron diferentes niveles de riesgo asociados a la realización de quemas prescritas, como se

evidenció en la distribución de equipo y personal.

González-Cabán (1996) presentó a los encargados de las quemas prescritas un conjunto realista de posibles problemas relacionados con las mismas para que proveyeran elementos pertinentes a la implementación de los planes, tales como los patrones de ignición, las estrategias de contención, las clasificaciones finales, la temporada y el tiempo del fuego y los cálculos aproximados del equipo y personal. Los resultados indicaron que la mayor parte de las discrepancias al calcular los costos de los incendios se debió a las diferencias individuales entre los encargados de controlar las quemas prescritas y no a sus niveles de educación o experiencia, el lugar del incendio o las características del terreno. Las autoevaluaciones sobre la propensión a tomar riesgos revelaron que el promedio de los costos de las quemas prescritas fue más bajo para los participantes con aversión al peligro que para aquellos que dijeron ser arriesgados.

En un estudio de MacGregor basado en entrevistas exhaustivas (1997), se examinaron las actitudes ante el peligro de los encargados más experimentados en controlar quemas prescritas. Los resultados indicaron que el concepto de peligro se percibía como una interacción compleja de varios factores relacionados con la quema prescrita y su utilidad como herramienta de administración de recursos. También, se demostró que los encargados de la quema prescrita buscan controlar una gama de riesgos que se distribuyen a través del tiempo. No obstante, las estrategias de manejo del riesgo variaban y dependían de la orientación de cada individuo hacia el peligro y su experiencia.

El riesgo y el arrepentimiento en la toma de decisiones en el manejo de incendios

El principio de precaución (Sandin 1999; Graham 2001) es un concepto importante que ha sido significativo para lograr entender las actitudes relacionadas con el riesgo a nivel administrativo. En esencia, el principio de precaución es una perspectiva de “mejor precaver que tener que remediar” que guía al individuo hacia una acción de autoprotección. El principio de precaución se puede interpretar como un axioma de la propensión general de los individuos hacia responder de forma más extrema ante decisiones cuyas consecuencias involucran pérdidas que ante las que involucran ganancias (Kahneman y Tversky 1979).

El *arrepentimiento anticipado* es uno de los efectos de evaluar y responder prospectivamente a los resultados de las decisiones. La teoría del arrepentimiento ha sido clave como factor que ejerce una fuerte influencia sobre el comportamiento de los individuos al tomar decisiones (por ejemplo, Bell 1982; Loomes y Sugden 1982, 1983, 1987). De acuerdo con la teoría del arrepentimiento, la persona que toma las decisiones *anticipa* la experiencia que podría tener como consecuencia de sus decisiones. El arrepentimiento es la experiencia psicológica que se asocia con la

elección de una alternativa que resulta ser menos satisfactoria que otra cuya consecuencia ya se conoce. Por consiguiente, el arrepentimiento surge de la insatisfacción obtenida a causa de la alternativa elegida y el saber que otras alternativas sí hubieran sido más satisfactorias. Como resultado, la persona que toma las decisiones busca minimizar el arrepentimiento anticipando las consecuencias de sus decisiones y eligiendo la alternativa que presente la menor cantidad de arrepentimiento posible.

La teoría del arrepentimiento puede modelarse en el contexto de la toma de decisiones en el manejo de incendios examinando las decisiones en dos contextos: el *contexto prospectivo*, en el que se analiza y se toma la decisión, y el *contexto retrospectivo*, en el que la decisión se evalúa y se justifica (figura 1). Estos dos contextos difieren en características importantes. De forma prospectiva, las decisiones y sus resultados están vinculados probabilísticamente y una sola alternativa elegida puede dar pie a numerosos resultados. De forma retrospectiva, se experimenta un resultado en particular y se tiende a percibir que los resultados están vinculados de manera causal o predeterminada con las acciones de la persona que toma las decisiones. Una decisión relacionada con la asignación a un incendio de un Equipo de Manejo de Incidentes (IMT, por sus siglas en inglés) Tipo I versus uno Tipo II puede ser representada en términos del *Contexto Prospectivo*, que supone la toma de decisiones acerca del nivel apropiado del IMT que debe ser enviado al incendio, y del *Contexto Retrospectivo*, que evalúa los resultados obtenidos y justifica la decisión tomada. Cada uno de los cuatro recuadros en una matriz de desenlaces 2 x 2 se asocia con cuatro resultados. Dos de los recuadros representan la decisión “correcta”; estos son los resultados para los cuales la selección prospectiva del IMT concuerda con el nivel del IMT que en realidad se necesita. Estas decisiones son correctas porque al evaluarlas, luego de seleccionar el IMT, se constata que se ha seleccionado el nivel apropiado.

		<i>Contexto retrospectivo anticipado (Justificación de la decisión)</i>	
		<i>Equipo tipo I requerido</i>	<i>Equipo tipo II requerido</i>
<i>Contexto prospectivo (Toma de decisiones)</i>	<i>Equipo tipo I seleccionado</i>	Decisión “correcta”	Exceso en los costes \$\$ de la organización Pequeño riesgo a la capacidad
	<i>Equipo tipo II seleccionado</i>	Supresión inadecuada Riesgos de mortalidad y enfermedad Riesgo mayor a la capacidad Riesgos a la carrera	Decisión “correcta”

Figura 1 – Matriz hipotética de desenlaces para decidir el nivel del IMT que debe asignarse a un incendio.

En los dos recuadros restantes, existe una discrepancia entre el nivel del IMT seleccionado prospectivamente y el nivel del IMT justificado retrospectivamente basándose en las consecuencias del incidente. El caso en el que se seleccionó prospectivamente un nivel más alto de IMT (Tipo I), pero el nivel más bajo (Tipo II) hubiera sido apropiado, tiene dos posibles desenlaces: (a) que la organización incurra en un gasto monetario excesivo debido a que el equipo Tipo I es más costoso, y (b) que la persona que toma las decisiones tenga un pequeño daño (potencial) a su capacidad debido a la sobreestimación del nivel de recursos necesarios para manejar el incidente. En el caso en que se seleccionó el nivel más bajo de IMT (Tipo II), pero hubiera sido apropiado un nivel más alto, los desenlaces incluyen: (a) la supresión inadecuada del incendio, (b) riesgos potenciales de mortalidad y morbilidad, (c) riesgo relativamente alto a la capacidad de la persona que toma las decisiones (d) riesgos reales o percibidos a la carrera.

Para la diagonal representada por las dos decisiones correctas, la persona que toma las decisiones no tiene un arrepentimiento anticipado pues se estima que la decisión administrativa relacionada con la designación del nivel del IMT es congruente con el resultado. Todos los posibles arrepentimientos tras la decisión se asocian con el par de resultados en los que existe una disparidad entre el nivel del IMT asignado y el nivel que, en retrospectiva, se percibe como necesario o

justificado. Existe una asimetría entre el valor de los dos desenlaces negativos, con el peor desenlace asociado a la decisión de utilizar el nivel más bajo del IMT. Una persona encargada de tomar las decisiones que interese minimizar su arrepentimiento potencial máximo en una situación similar tendería a seleccionar el nivel más alto del IMT, a no ser que intervengan en su decisión otros factores contextuales.

Gastos irre recuperables en la toma de decisiones de los Ataques Extendidos

Los efectos de los gastos irre recuperables ocurren cuando la persona que toma las decisiones ya ha invertido tiempo, dinero u otros recursos en opciones que influyen en las decisiones, aún si estas no representan la mejor alternativa (por ejemplo, Arkes y Blumer 1985). Según la teoría económica racional, las decisiones que se toman deben considerar únicamente los gastos y beneficios futuros. Los estudios empíricos sobre la toma de decisiones han demostrado que las personas tienden a tomar decisiones basadas en lo que ya han invertido (por ejemplo, Gourville y Soman 1998). En el contexto del manejo de incendios, los gastos irre recuperables pueden manifestarse en decisiones que favorezcan la protección de inversiones asociadas a la construcción de líneas, aún si tales decisiones suponen riesgos y costos mayores a los que habría si no existieran los gastos irre recuperables. Uno de los resultados de la toma de decisiones basada en los gastos irre recuperables es la tendencia a *fortalecer el compromiso* con un curso de acción inferior al óptimo, dejándose llevar por una inversión ya hecha (Staw 1976). Parte de la evidencia sugiere que el efecto que dejan los gastos irre recuperables no permanece de manera indefinida y que la tendencia hacia favorecer las inversiones previas se reduce con el tiempo (Thaler 1999). Aún no se han contestado las preguntas sobre cómo se manifiestan los gastos irre recuperables, específicamente, en la toma de decisiones de los AE y cómo, si se presentan tales efectos, éstos pueden ser atenuados.

Sistemas de producción en la toma de decisiones de los AE

Los sistemas de producción son una clase general de modelos de decisiones que describen la relación entre los humanos y las tareas que realizan. En términos sencillos, los sistemas de producción representan el desempeño humano desde el punto de vista de insumos, procesos sistémicos y productos que se conectan mediante un circuito de retroalimentación que afecta el ambiente en el que opera el sistema (Sheridan y Ferrell, 1981; Wickens y Hollands, 1999). La analogía con el manejo de incendios es directa.

En un sistema de producción prototípico, los insumos incluyen *los eventos programados y esperados* que sirven de *detonantes* para procesos sistémicos (ilustración 2). Los diversos procesos sistémicos (tales como procedimientos, planes, comunicaciones internas) tienen como resultado *productos* que son resultado del

sistema de producción. Entre estos productos se incluyen las decisiones, las acciones y las comunicaciones que se supone que tengan un efecto en el ambiente en que opera el sistema (por ejemplo, un incendio). El impacto del sistema de producción en el ambiente actúa como un circuito cerrado de retroalimentación para el insumo del sistema, controlando así sus acciones (Powers 2005). Los sistemas de producción son, en esencia, un tipo de *sistema de control cibernético* (Wiener 1948) cuyos productos sirven de base para evaluar la efectividad de los procesos sistémicos (por ejemplo, las decisiones del manejo de incendios) en el cumplimiento de las metas y los objetivos del sistema, tales como el control del perímetro.

Los factores humanos, como la fatiga física o mental y el estrés, pueden perturbar o alterar los procesos sistémicos. En términos más generales, los procesos sistémicos son influenciados por la evaluación continua de las capacidades; los cambios (Δ) en las capacidades pueden alterar la manera en que el sistema responde a los insumos y cómo los diversos procesos que se implementan tienen un efecto final en el producto del sistema. Los cambios en las capacidades de los recursos humanos también pueden influir sobre la forma en que se reconocen y procesan las señales de decisiones cruciales (Klein, Calderwood y MacGregor 1989).

Figura 2 – Modelo de toma de decisiones de un sistema de producción prototípico.

También pueden ocurrir alteraciones debido a las interrupciones: situaciones o eventos no anticipados externos al sistema y que evitan que se finalicen las acciones o secuencias organizadas. Comprender la influencia que ejercen las interrupciones sobre la dinámica de los sistemas de producción es crucial para mejorar su funcionamiento y hacerlas más resistentes contra la degradación y el colapso (Rudolph y Repenning 2002).

Método

Las características de los incidentes de Ataque Extendido

El enfoque de la investigación que se aplica aquí supone el desarrollo de un marco metodológico para el estudio del efecto que tienen las actitudes hacia el riesgo de las decisiones administrativas individuales y las estructuras de incentivos sobre la toma de decisiones en el manejo de incendios dentro del contexto de los incidentes de Ataque Extendido (AE). Dentro del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU., los incidentes de AE son aquellos que no logran contenerse durante el primer período de incendio luego de su ignición. El personal de un incidente típico de AE está constituido por un Comandante de Incidente Tipo III y por recursos de supresión. El mando también puede incluir personal subordinado encargado de las funciones asociadas a la logística, las operaciones, los planes, las finanzas y la información, dependiendo de la complejidad del incidente, la disponibilidad de personal y el estilo de manejo y/o las preferencias del Comandante de Incidente Tipo III.

El tamaño de los incendios de Ataque Extendido puede variar de unos pocos acres (por ejemplo, los Clase B) hasta más de cien acres (por ejemplo, los Clase C o los del límite inferior de la Clase D). La complejidad del fuego (por ejemplo, las condiciones de los combustibles) es más importante que su tamaño real. Por otra parte, existen pautas mediante las cuales un Comandante de Incidente Tipo III puede medir si continuar manejando un incidente como un Tipo III es la respuesta de manejo adecuada. La lista de cotejo de los factores clave incluye el comportamiento del fuego, la seguridad de los bomberos, las posibilidades organizativas y los valores que deben protegerse (NWCG, 2007).

Los incidentes de AE constituyen un reto particular desde varios puntos de vista, entre los que se incluye de manera prioritaria la seguridad de los bomberos. Cuando un incidente rebasa las capacidades de una organización Tipo V o Tipo IV, va creciendo en tamaño y complejidad, y se convierte en un incendio emergente cuya naturaleza dinámica dificulta la caracterización precisa de los riesgos. Un incidente de AE es, en esencia, un incidente en transición para el que una respuesta de manejo local puede o no resultar efectiva en la prevención de un incendio más grande y costoso (el desenlace va a depender en gran medida de la calidad del proceso de toma de decisiones que ocurra durante el manejo de esta etapa crucial del incidente). Al cambiar demasiado rápido un AE a Tipo II o Tipo I, se puede incurrir en gastos innecesarios si es que el incendio pudo haberse manejado efectivamente como un incidente Tipo III. Por otro lado, el continuar manejando un incidente como un Tipo III puede arriesgar excesivamente la seguridad de los bomberos e incrementar la posibilidad de que se pierdan valiosos recursos en vano.

El Ataque Extendido se puede describir como un proceso constante de toma de

decisiones en el que la organización Tipo III evalúa tanto la situación del incendio como la capacidad de la organización para manejar el incidente usando los recursos que tiene a la mano. En algunas circunstancias, la organización Tipo III puede separarse del incidente para evaluar sus capacidades y la probabilidad de salir airoso si volviese a involucrarse en el incidente. Las decisiones recurrentes tienen que ver con si una organización puede lograr o no los objetivos importantes con respecto al fuego, y/o si deben desarrollar tácticas dilatorias hasta que lleguen nuevos recursos o mejoren las condiciones. Los factores humanos, como el estado físico y mental del personal, pueden complicar el proceso de toma de decisiones. Esencialmente, la organización Tipo III se encuentra a menudo en los límites de sus capacidades y opera dentro de un círculo de decisiones enmarcado en un período breve de tiempo, a través del cual adapta constantemente su enfoque de manejo conforme a una situación de incendio dinámica que evoluciona rápidamente.

Simulación de un ambiente de toma de decisiones Tipo III

Para propósitos de entrenamiento y reconocimiento de aptitud, los ambientes Tipo III se recrean de dos formas generales. La primera le brinda a las personas que están en entrenamiento la “sensación” de la rapidez con la que deben ejecutar las operaciones, el montaje y el manejo asociados a un ambiente Tipo III, en el cual sus responsabilidades incluyen establecer una organización de manejo, así como controlar y responder a un ambiente de comunicación denso con múltiples canales de tráfico radial. Controlar y actualizar el estado de vigilancia ante la situación representa otro aspecto crucial en el manejo del ambiente Tipo III.

La segunda forma es simular los aspectos estratégicos de la toma de decisiones dentro de un ambiente Tipo III. Estos aspectos incluyen el saber dónde posicionar al personal, la elaboración de un Plan de Acción contra Incidentes, la identificación de los objetivos de control primarios y secundarios, la adquisición y ubicación de los recursos de supresión y la preparación de actividades de control asociadas al ciclo de producción del manejo de incidente (figura 2).

En esta investigación, se emplea un contexto estratégico dentro del cual se estudia la toma de decisiones en los incidentes de Ataque Extendido. La simulación del ambiente incluye una combinación de materiales con apoyo de computadoras y listas de cotejo y protocolos estructurados que plantean situaciones y requieren respuestas de los participantes del estudio.

La simulación del ambiente brinda un escenario hipotético en donde ocurre el inicio de un fuego que ya ha sido manejado por un Comandante de Incidente Tipo IV, pero que ha hecho la transición hacia un Comandante de Incidente Tipo III. El escenario hipotético se desarrolla durante el transcurso de cuatro días (un período de cuatro días de incendio). En cada período de incendio simulado, el participante

recibe información concerniente a la situación actual, como mapas topográficos que muestran el perímetro actual del incendio, la ubicación de los recursos, el estatus de los recursos que se han pedido, las condiciones climatológicas, la ubicación de los valores que corren riesgo (como las casas y la vida silvestre). Luego, el participante evalúa un conjunto de factores relacionados con el incidente, entre los que se incluyen: la ubicación de los objetivos de control primarios y secundarios, las probabilidades de cumplir con cada objetivo, los factores y los recursos de los que depende el cumplimiento de los objetivos, la posibilidad de contener el fuego dentro de un marco de veinticuatro horas, las probabilidades de retirarse en veinticuatro horas y de hacer la transición hacia un nivel más alto (por ejemplo, un nivel Tipo II). En la parte final del ejercicio, se le solicita al participante información preliminar, entre la cual figura su experiencia como Comandante de Incidente Tipo III, los gastos incurridos en el manejo del fuego y problemas de responsabilidad legal.

En general, la simulación está diseñada para representar un incendio forestal que emerge hacia una situación marginalmente manejable como incidente de Tipo III. Durante los cuatro días de la simulación, el incidente, que comienza con una probabilidad moderada de contención, progresa a uno que elude continuamente la contención. El propósito del ejercicio es que el participante se enfoque en un conjunto clave de decisiones concernientes a la posibilidad de retirarse y regresar, así como a la transición a un nivel más alto de manejo de incidente. Las variables de la simulación del incidente se construyen para plantear situaciones que encaren al participante con la posibilidad de perder la línea construida, lo que permite que se examinen los efectos del gasto irrecuperable. Dentro del contexto de la situación, las actitudes hacia el riesgo son evaluadas según una gama de variables, que incluyen las probabilidades de tener éxito o no, la ubicación de los objetivos de control primarios y secundarios, el encargo y el uso de los recursos, los antecedentes del participante y sus percepciones generales de la toma de decisiones riesgosas en las operaciones Tipo III.

Reconocimientos

Los siguientes recursos apoyaron esta investigación: el acuerdo #04-JV-11272165-448 entre el Departamento de Agricultura de los EE.UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste y MacGregor-Bates, Inc. Agradecemos a Aaron Ortega (especialista en combustibles, Comanche y Cimarron National Grasslands), Shane Greer (FMO, Pike-San Isabel NF), y a Jay Perkins (FMO, Klamath NF) por su ayuda y pericia en el desarrollo de este enfoque investigativo.

Referencias

- Arkes, H.R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35, 125-140. Bell, D. E. (1982).
 Regret in decision making under uncertainty. *Operations Research*, 30, 961-981.
- Cortner, H. J., Taylor, J. G., Carpenter, E. H., & Cleaves, D. A. (1990). Factors influencing forest service fire managers' risk behavior. *Forest Science*, September, 531-548.
- González-Cabán, A. (1996). Managerial and institutional factors affecting prescribed burning costs. *Forest Science*, 43, 535-543.
- Graham, J. D. (2001). Decision-analytic refinements of the precautionary principle. *Journal of Risk Research*, 4, 127-141.
- Gourville, J.T., & Soman, D. (1998). Payment depreciation: The behavioral effects of temporally separating payments from consumption. *Journal of Consumer Research*, 25, 160-174.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47, 263-292.
- Klein, G. A., Calderwood, R., & MacGregor, D. G. (1989). Critical decision method for eliciting knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19(3), 462-472.
- Loomes, G. and Sugden, R. (1982). Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty. *Economic Journal*, 92, 805-824.
- Loomes, G. and Sugden, R. (1983). A rationale for preference reversal. *American Economic Review*, 73, 428-432.
- Loomes, G. and Sugden, R. (1987). Some implications of a more general form of regret theory. *Journal of Economic Theory*, 41, 270-287.
- MacGregor, D. G. (1997). Assessing risk attitudes of prescribed fire managers. Final report. Project No. OM-43-91S8-5-3325. USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, Riverside, CA.
- NWCG (2007). Incident Response Pocket Guide. National Wildland Fire Coordinating Group, Washington, DC.
- Powers, W. T. (2005). *Behavior: The control of perception*. New Canaan, CT: Benchmark Publications.
- Rudolph, J. W. & Repenning, N. R. (2002). Disaster dynamics: Understanding the role of quantity in organizational collapse. *Administrative Science Quarterly*, 47, 1-30.
- Sandin, P. (1999). Dimensions of the precautionary principle. *Human and Ecological Risk Assessment*, 5, 889-907.
- Sheridan, T. B., & Farrell, W. R. (1981). *Man-machine Systems: Information, control, and decision models of human performance*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Staw, B.M. (1976). Knee-deep in big muddy: Study of escalating commitment to a chosen course of action. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16, 27-44.
- Thaler, R. (1999). Mental accounting matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12, 183-206.
- Wickens, C.D., & Hollands, J. G. (1999). *Engineering psychology and human performance*. Prentice Hall.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. New York: Wiley.

Efectos de las Actitudes Hacia el Riesgo en una Decisión de Ataque Extendido

¿Que Propició el Interés del Servicio Forestal en la Valoración de Intangibles?¹

John B. Loomis² y Armando González-Cabán³

Resumen

Esta ponencia puntualiza el origen y evolución de la aplicación de técnicas de valoración de intangibles al manejo de incendios dentro del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La motivación para los estudios de valoración contingente que cuantifican el “valor de existencia” surge de la necesidad de demostrar los beneficios monetarios de la protección de los rodales maduros –hábitat del búho moteado– a principios de la década de los 90. Dos encuestas públicas de gran escala demostraron con éxito que la valoración contingente se podía utilizar para calcular los beneficios de la prevención y supresión de incendios en el hábitat crítico de las especies en peligro de extinción, tanto a nivel estatal como nacional. Hacia finales de la década de los 90, los incendios en la interfaz urbano-forestal sacaron a la luz la necesidad de medir lo que el público general estaría dispuesto a pagar por programas de quema prescrita y de reducción mecánica de combustibles. Con la adición del análisis conjunto a la valoración contingente como herramientas aplicables a la estimación de los beneficios intangibles de la prevención y supresión de los incendios forestales, la capacidad de los economistas ha aumentado considerablemente. Debido al gasto y el consumo de tiempo que representa llevar a cabo estas encuestas, el reto mayor es la incorporación sistemática de estos tipos de valores de uso y no uso a la planificación de los incendios forestales y a los modelos de asignación de recursos. Partiendo de resultados anteriores, ofrecemos la transferencia de beneficios de los resultados existentes como posible técnica interina para estimar los beneficios intangibles de la prevención y la supresión de incendios. También vislumbramos las fronteras subsiguientes en la aplicación de la valoración contingente.

Palabras clave: Valoración contingente, especies en peligro de extinción, reducción mecánica de combustible, disposición a pagar.

¹Una versión abreviada de esta trabajo se presentó en el Tercer Simposio Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales, Problemas Comunes y otros Enfoques, 29 de abril al 2 de mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² Catedrático, Departamento de Agricultura y Recursos Económicos, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523- USA; E-mail: John.Loomis@colostate.edu

³ Economista investigador, Estación del Pacífico Suroeste del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EEUU, Riverside, CA 92507- USA; Email: agonzalezcaban@fs.fed.us

Introducción

Los primeros años de la década de los 90 fueron testigos de un rápido cambio en la ordenación de los bosques, de un énfasis arrollador en el manejo de los recursos madereros y la concepción del bosque como un conjunto de usos diversos, a una concepción del bosque como ecosistema. La inclusión del búho moteado del norte en la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la designación de más de 4 millones de acres de rodales maduros en terrenos federales como hábitat crítico del búho en Oregón, Washington, y el norte de California, fue un catalítico importante para el cambio. El *Thomas Report* (Thomas y otros 1990, 1993) y el *Forest Plan for the Cascades and coastal forests* del Presidente Clinton destacaban el manejo de los ecosistemas. A esto le siguió un esfuerzo proactivo por proteger los rodales maduros restantes en California para el búho moteado de este estado. Los Bosques Nacionales ya no eran solo para la extracción de maderera. Estos planes liberaban a los rodales maduros de la explotación forestal, pero era necesario proteger los rodales maduros de la sustitución de rodales provocada por el fuego para recuperar al búho moteado (Verner y otros 1992).

Las justificaciones tradicionales a la protección de los bosques del fuego se basaban fundamentalmente en la protección de los valores madereros. Si la agencia ya no podía explotar los bosques, ¿cómo podía justificar el gasto de millones de dólares en la prevención y la supresión del fuego? La respuesta estaba en reconocer y valorar los bienes colectivos así como los servicios provistos por el bosque pero que no se tomaban en cuenta en los mercados tradicionales, como por ejemplo, el hábitat para las especies en peligro de extinción.

Por coincidencia, durante la década anterior, los economistas ambientales habían estado refinando una técnica que pudiera calcular el valor económico del bien público ligado a la protección del hábitat de las especies en peligro de extinción. Aunque el método de valoración contingente se diseñó originalmente para valorar la recreación (Knetsch y Davis 1966), el método surgió, en la década de 1980, como una técnica que podía valorar lo que el economista John Krutilla (1967) llamó “valor de existencia”. Estos valores de existencia eran beneficios que los no visitantes podían obtener del hecho de tener conocimiento de que un ambiente natural único estaba protegido para las generaciones actuales y futuras.

Las aplicaciones de la valoración contingente a la monetización del valor de existencia de las especies en peligro de extinción (Brookshire y otros 1983) y las zonas silvestres (Walsh y otros 1984) demostraron que las técnicas funcionarían con el público general. Estudios de prueba-reprueba demostraron la confiabilidad de la técnica de valoración contingente para medir los valores de uso y existencia para los visitantes y el público general respectivamente (Loomis 1989).

¿Puede la valoración contingente cuantificar la disposición a pagar por la prevención y la supresión?

El director asociado de investigación de la Estación del Pacífico Suroeste del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EEUU y un economista del fuego en el Laboratorio de Incendios Forestales en Riverside, California, cobraron consciencia, en 1992, de la posibilidad

de utilizar las técnicas de valoración de intangibles para precisar los beneficios de proteger del fuego a los rodales maduros (como hábitat del búho moteado). Si bien el Servicio Forestal había empleado técnicas de valoración de intangibles tales como el costo de viaje y la valoración contingente para valorar el uso recreacional (Sorg y Loomis 1984; Donnelly y Nelson 1986), el organismo había estado reacio a incluir los beneficios de existencia al evaluar las zonas silvestres, a pesar de la documentación en la bibliografía de la importancia de dichos valores (Walsh y otros 1984).

Así que, ¿cuál fue la diferencia en 1992? Fue la convergencia de varios factores. Uno de ellos, la conciencia cada vez mayor de que para cumplir con los requerimientos de la Ley de Especies en Peligro de Extinción para recuperar especies, era necesario proteger a los rodales maduros del fuego (Verner y otros 1992). Otro factor pudo haber sido el reconocimiento de que si la agencia y la sociedad iban a renunciar a la explotación de árboles maduros de valor comercial, sería un desperdicio dejarlos quemar debido a la falta de un sistema de prevención y supresión de incendios. A esto se sumó el movimiento dentro del Servicio Forestal hacia el manejo de ecosistemas, una corriente que reconoció que los bosques eran, más que un conjunto de múltiples usos, ambientes naturales únicos que representaban la interconexión de los hábitats de la vida silvestre y las cuencas hidrográficas. Finalmente, el organismo estaba reconociendo que las partes interesadas incluían a personas que nunca habían visitado un Bosque Nacional, pero eran tenaces en cuanto a su visión de cómo debían administrarse los bosques. Esto podía atenderse ampliando las muestras de manera que incluyeran no sólo a los visitantes, sino también al público general; era necesario incluir a los contribuyentes que financiaban la administración de los Bosques Nacionales.

Cálculo del valor económico total de la reducción de los incendios forestales para los hogares de Oregón

En respuesta a estos factores, Armando González-Cabán (1993), en el Laboratorio de Incendios Forestales, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, delineó un programa para obtener e incorporar este tipo de información al sistema de Planificación de Manejo de Incendios del Servicio Forestal. Más adelante, ese mismo año, patrocinó y participó en un estudio diseñado para calcular la cantidad, en términos monetarios, que las familias de Oregón estarían dispuestas a pagar para reducir los incendios forestales en los 4 millones de unidades de hábitat crítico (CHU, por sus siglas en inglés), designadas para el búho moteado. En colaboración con Robin Gregory en Decision Data, los autores desarrollaron una encuesta de valoración contingente de los hogares de Oregón⁴. Se les preguntó a los encuestados si votarían a favor de un programa para reducir a la mitad la cantidad de CHU de rodales maduros que se queman cada año, de 7,000 acres a 3,500 acres. El programa incluyó tres elementos: (a) una prevención mayor del fuego; (b) la detección temprana de incendios; y (c) una respuesta más agresiva a los incendios.

Enviándola repetidas veces, la encuesta a los hogares consiguió una respuesta del 50 por ciento. Los hogares de Oregón indicaron que pagarían un promedio de \$77 por hogar por año.

⁴ Este trabajo no constituye un examen exhaustivo de la bibliografía, sino un esfuerzo por destacar el origen del empleo de la valoración contingente en la economía del fuego en el Servicio Forestal, y hacia dónde puede encaminarse.

Esto se traduce a una disposición a pagar de \$28 por acre protegido⁵ (ver Loomis y González-Cabán 1994 para más detalles).

Este estudio se amplió para estudiar la protección del hábitat del búho moteado en el norte de California y Oregón. Además, ya que el búho moteado era una especie en la lista federal de especies amenazadas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, y las CHU se encontraban en los Bosques Nacionales, era una ramificación natural el investigar la extensión geográfica de la disposición de pagar por proteger el hábitat del búho de los incendios forestales. Por consiguiente, la muestra incluyó hogares en California y seis estados de Nueva Inglaterra: Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island y Vermont. Se preguntó a los encuestados de ambas áreas geográficas su disposición a pagar por un programa que protegería el hábitat crítico del Búho moteado de los incendios forestales en: (a) California; (b) Oregón; y (c) ambos, California y Oregón.

Los resultados que se muestran en la Tabla 1 son convincentes ya que son compatibles con lo que se podría esperar según la teoría económica. Los hogares en California tienen una disposición a pagar por proteger las unidades del hábitat crítico del búho manchado más elevado en su propio estado (\$79 por hogar por año) que en Oregón (\$59), pero los hogares californianos, aún así, tienen un disposición a pagar por proteger las unidades de hábitat crítico en Oregón bastante elevada. La disposición a pagar de los residentes de Nueva Inglaterra por proteger los hábitats críticos es similar, -\$45 en cada uno de los estados— y solo un poco menor que la disposición a pagar de los residentes de California por proteger el hábitat del búho moteado en Oregón. A pesar de las casi 2,500 millas de distancia entre los hogares de Nueva Inglaterra y las unidades de hábitat crítico del búho moteado, la disposición a pagar anual por hogar es substancial. Esto sugiere la existencia de beneficios nacionales derivados de la prevención de incendios forestales en los Bosques Nacionales para las especies designadas por el gobierno federal como en peligro de extinción. Esto ayudó a ampliar la concepción del Servicio Forestal y a reconocer a los interesados a nivel nacional, además de los locales. Finalmente, el total de disposición a pagar por el programa combinado de California y Oregón fue sustancialmente más alta que la disposición a pagar solo para el programa de Oregón, lo cual indicó que la disposición a pagar de los encuestados era sensible a los acres protegidos. Como resultado, Loomis y González-Cabán (1998) pudieron estimar la función de la disposición a pagar por proteger del fuego el hábitat del búho moteado, que podía ser utilizada por los administradores en Oregón y California. Para más detalles sobre el estudio de California y Nueva Inglaterra véase Loomis y González-Cabán (1997).

La Tabla 1 resume los valores anuales, por hogar, de los estudios de Oregón, California y Nueva Inglaterra, junto con los valores respectivos por acre de hábitat del búho moteado protegido de los incendios forestales (\$772 y \$256, respectivamente) Por ejemplo, los valores por acre de Nueva Inglaterra y California son más de 25 y diez veces, respectivamente, más altos que los valores de los residentes del estado de Oregón. Dado que los valores por hogar son similares en magnitud entre los residentes de Oregón, California y Nueva Inglaterra, la gran

⁵ El valor por acre protegido se obtiene dividiendo el total del valor estimado de la disposición a pagar (\$84.6 millones) entre el total de la superficie en acres de los rodales maduros en unidades protegidas de hábitat crítico del búho moteado del norte (3 millones de acres).

diferencia en valores por acre se debe a que mucha más gente vive fuera de Oregón, y estas personas pagarían por la protección de una especie en la lista federal perteneciente a sus Bosques Nacionales.

Tabla 1– *Beneficios anuales estatales y regionales por hogar y beneficios por acre protegido.*

Residentes estatales/regionales	Programa de California	Programa de Oregón	Programa de CA y OR combinados	Beneficios por acre de hábitat protegido
California	\$78.69	\$58.56	\$94.77	\$772
Nueva Inglaterra	\$45.70	\$44.70	\$61.17	\$256
Oregón	N/A	\$77.00	N/A	\$ 28

¡La interfaz urbano forestal explota!

Poco tiempo después de la crisis del búho moteado, la atención del país se desplazó a los dramáticos incendios de grandes proporciones que amenazaron la interfaz urbano-forestal de Daytona Beach, Florida en 1998 y el conjunto de fuegos en el Valle Bitterroot de Montana en el 2000. Específicamente, fueron los fuegos de Florida que ocurrieron el fin de semana del 4 de julio los que ocasionaron el cierre de la playa de Daytona 500, y la carretera interestatal, y los que acapararon la atención de los encargados de formular las políticas. En respuesta a los eventos de Florida, el Programa Conjunto de Ciencias del Fuego⁶ patrocinó los trabajos para diseñar una encuesta sobre los efectos de estos fuegos y sobre si estos efectos habían cambiado el apoyo del público a los programas de reducción de combustibles, tales como la quema prescrita y la reducción mecánica de combustibles. El éxito del trabajo de Florida condujo a la aplicación de la misma encuesta en California y en Montana.

Diseño de la Encuesta

Inicialmente, se desarrolló un folleto, en conjunto con profesionales de la silvicultura en Florida, que luego se adaptó a California y Montana, para comunicar información relacionada a la magnitud del problema, junto con dos posibles programas para aminorarlo (es decir, quema prescrita y reducción mecánica de combustibles).

El folleto de la encuesta describía el área en acres quemada por los incendios forestales, en un año promedio en cada estado. El efecto de los incendios forestales en los bosques, las casas y la calidad del aire se ilustró con un dibujo a color que mostraba la altura de las llamas y la velocidad de propagación del fuego⁷.

Luego, se ilustraba y describía un programa para incrementar el uso de los fuegos prescritos o la quema controlada en California, Florida y Montana. A los encuestados se les dijo, específicamente, que el programa de quema prescrita y reducción de combustibles reduciría los combustibles de los incendios forestales potenciales a través de una quema

⁶ El Programa Conjunto de Ciencias del Fuego es un programa de becas para la investigación de los incendios forestales patrocinado, conjuntamente, por el Servicio Forestal del USDA y el Buró de la USDI para la administración de terrenos.

⁷ Para obtener una copia de la encuesta puede contactar a Armando González-Cabán.

controlada periódica. Se reconocía que la quema prescrita crea humo, pero mucho menos que un incendio forestal. Además, el folleto de la encuesta proveía información adicional y dibujos contrastando los incendios forestales y la quema prescrita.

El costo de financiar este programa de quema prescrita se describía como un programa de costos compartidos entre el gobierno de su estado y el condado en el que vivía el individuo.

La formulación utilizada en la encuesta fue idéntica para California, Florida y Montana, excepto que la cantidad de acres y de casas incendiadas se cambió de manera que correspondiera con los números específicos de cada estado.

Para el programa de reducción mecánica de combustibles, el folleto de la encuesta establecía la misma reducción en acres incendiados que la obtenida con el programa de quema prescrita, e indicaba que solo se implementaría uno de los dos programas.

Nuevamente, se utilizó la misma formulación en los tres estados (California, Florida y Montana) excepto que la cantidad de acres quemados y la cantidad de casas se cambió para que correspondiera a los números de cada estado particular (para información adicional ver Loomis y González-Cabán 1998).

Al llevar a cabo la valoración contingente en California, Florida y Montana, nos percatamos de que un segmento de la población no se había tomado en cuenta: los indios americanos. Para calcular la disposición a pagar de los indios americanos por los mismos programas de reducción de combustibles, revisamos la encuesta de manera que ésta representara a sus tierras y experiencias. Ya que los indios americanos representan una parte importante de la población de Montana, llevamos a cabo un estudio de valoración contingente donde se comparaba la población general de Montana con la de los indios americanos. La encuesta utilizada fue igual a la del estudio de California, Florida y Montana, excepto que se revisó para que diera cuenta de las tierras de los indios americanos y sus características.

Recopilación de datos y modo de encuesta

Las encuestas se realizaron en Florida, California y Montana, entre 1999 y 2001, a través de un proceso de llamada telefónica-correo-llamada telefónica en los tres estados. Para obtener una muestra representativa de los hogares, utilizamos la marcación aleatoria. Se obtuvo una muestra adicional de la población general de Montana y de las Tribus Pienegro y Kootenai. Los condados se seleccionaron de manera tal que hubiera variedad de experiencias en torno a los incendios forestales y a la exposición a estos. Esta variación tuvo dos características útiles. Primero, aseguraba variedad en torno a las repuestas a preguntas como, por ejemplo, si el encuestado “había visto un incendio forestal”. En segundo lugar, seleccionar esta muestra ayudó a generalizar los resultados a todas las áreas del estado.

Una vez establecido el primer contacto, se obtuvo la actitud inicial y lo que el encuestado conocía de los incendios forestales y los fuegos prescritos, seguido por la programación de las citas con los individuos para hacerles entrevistas de seguimiento detalladas. En el interín, se envió a los hogares un folleto a color para complementar las entrevistas. Las entrevistas se realizaron con la ayuda de este folleto a color. El folleto se envió en inglés a los caucásicos y en español a los hogares hispanos en California y Florida. Se pidió a los entrevistados que leyeran

el folleto de la encuesta antes de la entrevista. Las entrevistas telefónicas se llevaron a cabo en inglés o español dependiendo del folleto que hubieran recibido.

Resultados

Estadísticas descriptivas de cada uno de los programas de reducción de combustibles y las muestras

El porcentaje de encuestados que respondió “sí” a la pregunta de elección dicotómica para cada estado y cada programa es instructivo. El programa de quema prescrita recibió 60 por ciento o más de respuestas afirmativas; estas iban de un 84 por ciento entre los hispanos en California a un 60 por ciento entre los caucásicos en Montana. Lo mismo es cierto para los indios americanos, con casi un 93 por ciento de respuestas afirmativas. Los resultados del programa de reducción mecánica de combustibles fueron más bajos entre los caucásicos, solo un 34 a un 50 por ciento, pero de 50 a 68 por ciento entre los hispanos. Sin embargo, el 78 por ciento de respuestas afirmativas de los indios americanos, aunque fue más baja para los programas de quema prescrita, es alta.

Resultados de la disposición a pagar

La disposición a pagar promedio se estimó para los caucásicos y los hispanos utilizando un modelo de regresión logística. La disposición a pagar promedio para los caucásicos para la quema prescrita fue de \$460 en California, \$392 en Florida y \$323 en Montana. Para el programa de reducción mecánica de combustibles, la disposición a pagar media para los caucásicos de California fue de \$510, mientras que en Florida fue mucho más baja, \$239 y \$186 en Montana. Estos resultados son compatibles con el por ciento más bajo de valores positivos, y sugieren mucho menos apoyo para el programa de reducción mecánica de combustible que para el de quema prescrita en los tres estados.

El promedio de disposición a pagar de los hispanos en Florida es de \$473 para el programa de quema prescrita, cerca de la mitad de lo que pagarían los hispanos en California: \$838. La disposición a pagar de los hispanos en Florida para el programa de reducción mecánica fue de \$373.

La clasificación del promedio de disposición a pagar por hogar sigue a la magnitud de acres protegidos del fuego y las casas rescatadas. Aunque todos los programas del estado presentaron una reducción proporcional equivalente (25 por ciento de reducción) en acres y casas quemadas, la magnitud absoluta o la cantidad menor de acres que ardieron y la cantidad de casas rescatadas varió en los distintos estados. En términos de los tres programas estatales, California protegería 90,000 acres y 18 casas; Florida protegería 50,000 acres y 18 casas; y Montana protegería 35,000 acres y 12 casas. La clasificación del promedio de disposición a pagar por casa se encuentra en el mismo orden que el número de acres protegidos del fuego y casas rescatadas. El promedio de disposición a pagar de los hogares en California, en particular, es notablemente más alto que en los hogares de Florida, que es notablemente más alto que el de los hogares de Montana.

Cuando se comparan los hogares de la población general en Montana con los hogares de los indios americanos encontramos que la disposición a pagar de la población en general para la quema prescrita es más grande que la de los indios americanos, \$174 vs. \$135 (González-Cabán y otros 2007). Para el programa de reducción mecánica de combustibles lo opuesto es cierto y la disposición a pagar de los indios americanos es \$305 vs. \$286 para la población en general. Sin embargo, el análisis estadístico demuestra que no hay diferencias estadísticas significativas entre las dos poblaciones para la quema prescrita o los programas de reducción mecánica de combustible.

Tabla 2—*La disposición a pagar promedio por la quema prescrita y la reducción mecánica de combustibles en California, Florida y Montana.*

Estado	Quema Prescrita		Reducción Mecánica	
	Caucásicos	Hispanos	Caucásicos	Hispanos
California (reducción de 89,500 acres)				
disposición a pagar promedio	\$460	\$838	\$510	n/a
Florida (reducción de 50,000 acres)				
disposición a pagar promedio	\$392	\$473	\$239	\$373
Montana (reducción de 35,000 acres)				
disposición a pagar promedio	\$323		\$186	

Con un promedio de disposición a pagar de más de \$400 por hogar, y más de 13 millones de hogares en California, la disposición a pagar por cualquiera de estos dos programas de reducción de combustibles es de alrededor de \$5 mil millones. En Florida, donde hay 7.6 millones de hogares, esto se traduce en \$3 mil millones para el programa de quema prescrita, y \$2 mil millones para el programa de reducción mecánica. En Montana, con solo 366,000 hogares, el nivel de beneficios del estado estaría cerca de los \$118 millones para la quema prescrita y \$68 millones para la reducción mecánica de combustibles. Nótese que la encuesta indicó explícitamente que se utilizaría tan solo uno de los programas, por lo que sería incorrecto sumar los valores de estos programas de reducción de combustibles. Sin embargo, estos valores, a nivel estatal, solo reflejan lo que los residentes del estado pagarían por el programa; Loomis y González-Cabán (1997) encontraron que los hogares de no- residentes a menudo tienen una disposición a pagar para prevenir los incendios forestales en bosques de importancia ecológica.

¿Qué es lo próximo en el futuro de la economía de los incendios?

Representaciones visuales en las encuestas sobre el fuego

Dada la naturaleza dinámica del fuego y de los programas de tratamiento de combustibles como la quema prescrita, los diagramas utilizados en los trabajos previos son más bien estáticos y

bidimensionales. Con la llegada de las cintas de video, los *devedés* y el Internet, existe el potencial de representar de manera más realista los resultados de los programas de tratamiento de fuego y las consecuencias de los incendios forestales sin el programa. Además, los *devedés* y el Internet dieron la oportunidad de proveer a los encuestados información sensible al contexto en momentos críticos de la encuesta donde algunos encuestados la requerían. Por otra parte, los *devedés*, las cintas de video o el Internet proveen la oportunidad de una entrevista piloto en persona.

Recientemente, experimentamos con cierto éxito con una cinta de video como mecanismo de entrega de encuestas. Este piloto demostró que era factible llevar a cabo encuestas de la interfaz urbano forestal idénticas a las encuestas realizadas en California y que se describieron anteriormente. No hubo diferencia estadística entre la disposición a pagar anual que se obtuvo al utilizar cintas de video y la del método de entrevistas por medio de llamada telefónica-correo-llamada telefónica. Ver Loomis y otros (2006) para más detalles.

En una interesante aplicación de la realidad virtual a la valoración económica de los fuegos, Fiore y otros (2007) utilizaron el modelo de simulación FARSITE⁸ junto con auriculares de realidad virtual para exponer a los encuestados a la progresión dinámica de un incendio forestal. La información de riesgo luego se le comunica a los encuestados y se les formula una pregunta de valoración para reducir la probabilidad de que suceda el incendio que “observaron” en el escenario virtual. Como señalaron los autores, esta es verdaderamente la vanguardia en el uso de la realidad virtual para tratar de crear un experimento de campo simulado en el ambiente seguro de un laboratorio.

Encuestas de preferencia multiatributivas

En muchas ocasiones, el manejo de programas de fuego, tales como la creación de espacio defendible o la utilización de la reducción mecánica de combustible o el aclareamiento, suponen ventajas y desventajas recíprocas entre los atributos deseables que están en competencia. Los propietarios de casas escogieron mudarse al bosque para estar rodeados de vegetación. El aclareamiento y la remoción reducen el peligro de incendios pero a expensas de reducir los mismos atractivos que los moradores de estas casas buscaban. La fortaleza de los métodos de valoración basados en atributos estriba en entender este tipo de ventajas y desventajas recíprocas (Holmes y Adamowicz 2002). Recientemente, Holmes y otros (estudio en progreso) han aplicado un experimento de elección multiatributivo para valorar los programas de reducción de riesgo de incendios de los propietarios de casas y las comunidades. A menudo, las funciones de disposición a pagar resultantes de un enfoque multiatributivo se prestan a la transferencia de beneficios a otros escenarios, incluso mejor que la valoración contingente. Esto se debe a que el experimento de elección permite separar los atributos del programa de reducción de combustibles. Por lo tanto, con un experimento de elección, la disposición a pagar se puede calcular para el tipo y los niveles de atributos de interés en la nueva aplicación, siempre y cuando esos atributos se incluyeran en el experimento de elección original.

⁸ Un modelo de simulación de fuego desarrollado por el Servicio Forestal.

Tabla de Contenido

- 1 Los Incendios Forestales en la Cuenca Mediterránea
Üæââ[Å..|: Å ~ fi[:
- 9 Asia y Australasia Manejo de Incendios Forestales: Una Perspectiva Regional
Öæ^Å[/ * æ
- 27 Aproximaciones Sobre la Protección Contra Incendios Forestales en Centro y Sur América
Ö~ q|^|{ [Å | q Å^æÁ
- 38 Hacia un Adelanto en la Teoría Económica de los Incendios Forestales
Ö[~ *|æ Å^æ[~ dV~ Å^æ Å^æ á^ Åã•&@
- 50 Problemática de los Incendios Forestales en Costa Rica, su Sistema de Voluntariado y su Estructura Organizacional
Öp^|q Å| : ~^: Å[á|ö ~^:
- 61 Predicciones Estacionales de la Gravedad de los Incendios Forestales
Ü@ ÖÖ Å@} ÖPæ æ[~ • Ö|'ã |^| ÖÖ'æ &ã Ö' q \æÖ[ÖÅ ÖÖ}[æÖ Å[ÖÅÜ[æ•
- 78 Los Incendios Forestales Recurrentes, ¿Afectan la Demanda de Compradores de Vivienda en Áreas de Alto Riesgo? Un Análisis Hedónico de los Efectos a Corto y a Largo Plazo de los Incendios Forestales Recurrentes en los Precios de las Viviendas en el Sur de California
R |ã Å Ö ~^| |^| ÖÖ[ÖÖÖ[[{ ã ÖÖÖ{ æ á[Ö[} : |^: ÖÖÖ } Á
- 92 El Costo del Fuego en Australia
ÖÜÖ ÖÖ @ ÖÖÖ ÖÖ^} ^ ÖÖÖÖÖ æ Á
- 116 El Efecto de los Incendios Forestales sobre la Salud y la Economía: Revisión de la Bibliografía y Evaluación del Impacto
Q~ ÖÖ[&ÖÖ[ÖÖ[[{ ã ÖÖÖÖÖÖ[ÖÖÖ[~|^ ÖÖ[] [çæ Á
- 133 El Desarrollo de una Base Probabilística en Apoyo a las Decisiones sobre el Manejo de Incendios Forestales
Y~ Å^æ Ö[~ *|æ Å^æ[~ Ö
- 143 Un Modelo Logit Mixto de las Preferencias de los Propietarios para Reducir el Riesgo de Incendios Forestales
VÖ{ æ ÅÖ[|{ ^•ÖÖ[ÖÖ[[{ ã ÖÖÖ{ æ á[Ö[} : |^: ÖÖÖ }
- 160 El Método de Modelo de Elección para Valorar un Programa de Prevención de Incendios en Cataluña (España)
Ü[à^|Ö æ•æ Ö Å^|5} æÖÖ^|æ Á
- 174 Los Impactos de los Fuegos y la Vulnerabilidad Socioeconómica de los Ecosistemas Forestales: Un Enfoque Metodológico Usando Teledetección y Sistemas de Información Geográficos
ÖÜ[á|ö ~^: Å Å^æ ÖÖ[| q æ Å^: ÖÖ ÖÖ^| |^| Å æ@æ Å
ÅÅÅÅÅÖÖÖ[|æ ÖÖ Ö

Referencias

- Brookshire, D.; Eubanks, L.; Randall, A. 1983. **Estimating Option Prices and Existence Values of Wildlife Resources**. Land Economics 59(1): 1-15.
- Cameron, Trudy. 1988. **A new paradigm for valuing market goods using referendum data: Maximum likelihood estimation by censored logistic regression**. Journal of Environmental Economics and Management 15: 355-379.
- Donnelly, D.; Nelson, L. 1986. **Net Economic Value of Deer Hunting in Idaho**. Resource Bulletin RM-13. Fort Collins, CO: Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, USDA Forest Service; 27 p.
- González-Cabán, Armando. 1993. **The Economic Impact of Fire: Improving the Forest Service's Fire Management Planning System Capabilities to use Non-Market Values**. Wildfire 2(4): 16-21.
- González-Cabán, Armando; Loomis, John B.; Rodriguez, Andrea; Hesseln, Hayley. 2007. **A Comparison of MVC Survey Response Rates, Protests, and Willingness-to-Pay of Native Americans and General Population for Fuels Reduction Policies**. Journal of Forest Economics 13: 49-71.
- Holmes, T.; Adamowicz, V. 2003. **Attribute Based Methods**. In: Champ, P.; Boyle, K.; Brown, T., editors. A Primer on Nonmarket Valuation. Boston MA: Kluwer Academic Publishers: 171-220.
- Krutilla, John. 1967. **Conservation Reconsidered**. American Economic Review 57: 777-786.
- Knetsch, Jack; Davis, Robert. 1966. **Comparison of Methods for Recreation Evaluation**. In: Kneese, A.; Smith, S., editors. Water Research. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press: 125-142.
- Loomis, J. 1989. **Test Re-test Reliability of the Contingent Valuation Method: A Comparison of General Population and Visitor Responses**. American Journal of Agricultural Economics 71(1): 76-84.
- Loomis, John; González-Cabán, Armando. 1994. **Estimating the Value of Reducing Fire Hazard to Old Growth Forests in the Pacific Northwest: A Contingent Valuation Approach**. International Journal of Wildland Fire 4(4): 209-216.
- Loomis, John; González-Cabán, Armando. 1998. **A Willingness-to-pay function for protecting acres of búho moteado habitat from fire**. Ecological Economics, 25: 315-322
- Loomis, John; González-Cabán, Armando. 1997. **Comparing the Economic Value of Reducing Fire Risk to Búho moteado Habitat in California and Oregon**. Forest Science 43(4):473-482.
- Loomis, John; Miller, Julie; González-Cabán, Armando; Champ, Joseph. 2006. **Testing the Convergent Validity of Videotape Survey Administration and Phone Interviews in Contingent Valuation**. Society & Natural Resources 19: 367-375.
- Loomis, John; Hung, Le Trong; González-Cabán, Armando. 2008. **Willingness to Pay Function For Two Fuel Treatments to Reduce Wildfire Acreage Burned: A Scope Test and Comparison of White and Hispanic Households**. In: González-Cabán, Armando, technical coordinator, Proceedings of III International Symposium on Fire Economics, Planning, and Policy: Common Problems and Approaches, April 29 to May 2, 2008, Carolina, Puerto Rico. Albany, CA: Pacific Southwest Station, USDA Forest Service.
- Sorg, C.; Loomis, J. 1984. **Empirical Estimates of Amenity Forest Values: A Comparative Review**. General Technical Report RM-107. Fort Collins, CO: Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, USDA Forest Service. 23p.

- Thomas, J.W.; Forsman, E.D.; Lint, J.B.; Meslow, E.C.; Noon, B.R.; Verner, J. 1990. **A conservation strategy for the NS Owl: a report of the Interagency Scientific Committee to address the conservation of the northern búho moteado.** U.S. Department of Agriculture Forest Service, Portland, Oregón.
- Thomas, J.W., Raphael, M.G.; Anthony, M.G.; Forsman, E.D.; Gunderson, A.G.; Holthausen, R.S.; Marcot, B.G.; Reeves, G.H.; Sedell, J.R.; Solis, D.M. 1993. **Viability assessments and management considerations for species associated with late-succession and rodales maduross of the Pacific Northwest—the report of the Scientific Analysis Team.** U.S. Department of Agriculture Forest Service, National Forest System, Washington, D.C.
- Verner, J.; McKelvey, K.S.; Noon, B.R.; Gutiérrez, R.J.; Gould Jr., G.L.; Beck, T.W. 1992. **The California Búho moteado: A technical assessment of its current status.** General Technical Report PSW-GTR-133. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, USDA Forest Service 285 p.
- Walsh, R.; Loomis, J.; Gillman, R. 1984. **Valuing Option, Existence and Bequest Demands for Wilderness.** Land Economics 60(1): 14-29.

La Figura del Técnico de Brigada Helitransportada: Hacia la Profesionalización del Sector¹

Clara Quesada-Fernández², Federico Grillo-Delgado^{3,4}, Domingo M.

Molina-Terrén³, y Enric Pous-Andrés³

Resumen

En la actualidad las brigadas helitransportadas se están constituyendo como una fuerza muy eficaz de ataque a los incendios forestales por las numerosas ventajas que presentan tales como el corto tiempo de respuesta, la mejor visión del incendio, la más pronta respuesta y capacidad de extinción, lo que conlleva una menor siniestralidad laboral (si excluimos los accidentes de helicóptero). Por contra, requieren enormes desembolsos económicos para que sean operativas.

Los medios humanos destinados a estas brigadas están constituidos básicamente por el personal propio de las administraciones, con competencia en incendios y por el personal contratado a las empresas públicas. Los técnicos suelen tener, en muchas ocasiones, contratos eventuales. La competencia del técnico es realizar labores de coordinación de medios aéreos, mando de la brigada cuando no es de la administración y dirección de la extinción en la primera llegada al incendio, si no la hubiera de la administración en ese momento y siempre hasta que se incorpore esta.

Cuando el técnico de la brigada helitransportada llega al incendio debe establecer un plan de ataque. Si el plan es bueno y resulta exitoso, la superficie quemada será mínima y menores los gastos de extinción y por daños. Desgraciadamente este carácter estacional del colectivo técnico provoca que toda esa experiencia se pierda, en muchos casos, al abandonar esta especialidad de después de los primeros años por optar a otros puestos mucho menos temporales que ofrece el mercado laboral. Por tanto, se puede afirmar que en muchos sitios adolece de ser un colectivo joven y en fase de aprendizaje en continua renovación. Sin embargo, para una mejor realización de este trabajo, se requiere una mayor y más completa profesionalización técnica, para hacerlo atractivo y competitivo desde el punto de vista

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques comunes, 29 de abril - 2 de mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² Universidad de Córdoba. ETSIAM. Avda. Menéndez Pidal s/n, 14080 Córdoba, España. claraquesada@hotmail.com y felfeare@uco.es

³ Universidad de Lleida. Unidad de Fuegos Forestales. Avda. Rovira Roure 191, 25198 Lleida, España. dmolinat@yahoo.es, fgrillo_delgado@hotmail.com y enricpous@hotmail.com

⁴ Academia Canaria de Seguridad. C/Alfonso XIII, 7. Las Palmas de Gran Canaria. 35003. Gran Canaria, España.

laboral, con una mayor inversión en contrataciones más largas o mejor remuneradas. El coste que se supone la medida planteada, en comparación con los costes del trinomio “aeronave - piloto-mecánico”, es insignificante y los beneficios obtenidos muy claros, una capitalización de la experiencia, un aumento de la seguridad y de la eficacia y por tanto una reducción de la superficie quemada con la consiguiente disminución del gasto.

Palabras claves: Brigadas helitransportadas, capitalización de la experiencia, combate helitransportado, costes en extinción, costes por daños, coste/eficiencia en la extinción, técnicos de brigada helitransportada, formación, profesionalización, seguridad laboral.

Introducción

Los medios humanos destinados a las tareas de prevención y lucha contra los incendios forestales están constituidos básicamente por el personal de los servicios forestales de las diferentes administraciones, fundamentalmente técnicos y agentes de medio ambiente que se adscriben al plan durante la campaña de incendios y el personal contratado por las empresas públicas, con carácter fijo discontinuo o eventual, así como el propio personal de dichas empresas.

Con carácter general la contratación de un técnico dura de tres a cinco meses, estando dedicado con exclusividad a tareas de lucha contra los incendios forestales durante los meses de mayor peligro y el resto del año, en el mejor de los casos, a la realización de trabajos selvícolas preventivos. Para un primer ataque en despacho automático la mayor parte de los dispositivos están optando por equipos helitransportados que pueden estar compuestos por un número variable de peones, entre cuatro y ocho, y, al mando, un ingeniero y/o un capataz (Figura 1).

Figura 1—Cuando el equipo helitransportado llega a tierra debe verificar la viabilidad real de ejecución de las estrategias y tácticas de lucha contra el incendio forestal planificadas en vuelo por su Técnico. Imagen: Dídac Díaz, 2005.

Situación actual

El final del decenio ha estado marcado por la aparición recurrente de los grandes incendios que han provocado repercusiones que van más allá de los bienes forestales afectados, con gran alarma social por el riesgo de protección civil, por los importantes daños en edificaciones e infraestructuras y sobre todo a las vidas humanas.

La organización contra incendios forestales en España.

Las Comunidades Autónomas, división territorial y administrativa en España, han consolidado en este último decenio (1997-2007) sus organizaciones contra incendios forestales, al dotarse de servicios especializados, que no responden a un patrón común. En Comunidades Autónomas muy urbanizadas como Cataluña, Madrid y Navarra se ha asignado la extinción a Servicios de Bomberos y la prevención a los Servicios Forestales. En otras, como Valencia y Asturias, las competencias de extinción residen en Consejerías de Emergencias, complementando a los Bomberos con Brigadas Forestales (Bomberos Forestales) con estructura similar a la de los Servicios Forestales. Un tercer grupo, compuesto por el resto de Autonomías ha mantenido el Servicio Forestal en las labores de prevención y extinción coordinándose con los Servicios Autonómicos de Protección Civil y Emergencias cuando la afección es en bienes distintos a los forestales.

Otra característica del decenio es la descentralización administrativa, basada en el principio de minimización del tiempo de primer ataque, iniciada en los noventa en zonas como Andalucía con sus Centros de Defensa Forestal o Galicia con sus Distritos Forestales.

Asimismo, la coordinación de servicios se ha ido imponiendo como una necesidad ineludible ante la complejidad de las estructuras administrativas y los múltiples medios que se utilizan. Para esto se crean Centros de Coordinación bajo

distintas denominaciones (Centro de Coordinación de Emergencias en Valencia, Centro Operativo Regional en Andalucía, etc.), todos ellos con el cometido común de facilitar y coordinar la movilidad de medios dentro de la Comunidad Autónoma y canalizar las peticiones de ayuda a la Administración Central y a otras Comunidades.

La experiencia demuestra que ningún territorio queda al margen de poder sufrir grandes incendios forestales y/o gran simultaneidad de estos. Para esto la mayoría de Autonomías han desarrollado un Sistema de Manejo de Emergencias para abordar desde situaciones sencillas con medios locales, hasta complicadas, que integran medios lejanos, propios o ajenos, y a varias agencias. Igualmente, se han suscrito acuerdos entre Autonomías que faciliten la operación de los medios de extinción, independientemente de su titularidad, en incendios próximos a las líneas que delimitan sus respectivos territorios.

Durante este decenio comienza una cierta profesionalización del colectivo contra incendios con convenios laborales que intentan regular las condiciones de los trabajadores y ampliaciones de los periodos de contratación. Las Comunidades Autónomas han aumentando el número de bases de medios helitransportados y se ha ido implantando la figura del técnico de esta brigada. Se ha mejorado el equipamiento del personal de extinción dotando a los brigadistas de los EPI (según la recomendación realizada por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales compuesto por representantes de las administraciones) y el de las indemnizaciones por accidentes durante la extinción.

Más información sobre la organización contra incendios forestales en España puede verse en otros textos (Vélez 2000, Junta de Andalucía 2003, MMA 2003, Rábade y Aragoneses 2004, WWF/Adena 2004 y WWF/Adena 2006,)

La figura del técnico, el mando único

El principio de mando único se define por la necesidad de que la cadena de mando en el incendio no solo esté perfectamente definida, sin duplicidad de dependencias que deriven en bloqueos o descoordinación, sino que en el punto más alto de esa cadena exista una autoridad reconocida por el resto del organigrama. Solo bajo esta premisa cabe asegurar la necesaria coordinación y capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas o cambios bruscos en el comportamiento del incendio.

Se debe tener en cuenta que en un incendio pueden llegar a intervenir recursos de muy diferente naturaleza, que han de integrarse en un único sistema con unos determinados protocolos. La situación se complica si no hay costumbre de trabajo conjunto con otras agencias. Es en esta circunstancia cuando se hace realmente necesaria la existencia de una estructura jerárquica preestablecida y con un mecanismo ágil para la toma de decisiones.

Sobre cada mando recae una responsabilidad que incluye la seguridad de los que

tiene a su cargo. El técnico de la brigada dirige y supervisa las labores de extinción, asumiendo, en ocasiones, la dirección de otras unidades que puedan ser incorporadas al sector que les haya sido asignado. Al llegar al incendio (Figura 2) deberá hacer una evaluación previa del mismo, ponerse a disposición del Director de Extinción si estuviese, y si no, actuar como tal, decidiendo el lugar y tipo de ataque, rutas de escape y seguridad, y coordinar las descargas de su helicóptero pues en muchas ocasiones llega el primero al incendio. De forma complementaria ayuda en la planificación.

La experiencia que adquiere le debería llevar con el tiempo a ocupar el puesto de trabajo de analista de fuegos forestales (Molina y otros 2007).

La figura de un técnico helitransportado formado en incendios forestales es de vital importancia ya que al estar en un medio aéreo con un menor tiempo de respuesta que los medios terrestres y una mejor visión global del incendio forestal, puede dar una información precisa del comportamiento actual y futuro al centro de coordinación, para que el director de extinción movilice correctamente a los medios necesarios, lo que es de gran importancia a la hora de la simultaneidad de incendios.

Figura 2—Vista parcial que observa desde la cabina del helicóptero el Técnico de la brigada a la llegada a un incendio en medio aéreo. Esta visión ayuda a planificar las estrategias y tácticas de ataque que se pretenden seguir. Imagen: Julio de Miguel, 2006.

También es importante una buena elección de la estrategia y táctica que se va a llevar a cabo en la extinción del incendio, de ello va a depender el tiempo que se va a tardar en controlarlo (a menor tiempo una mayor disponibilidad del medio aéreo y un menor coste), y el perímetro final del incendio (a menor superficie, menores daños).

Una vez esté en tierra es importante que conozca la comarca y los incendios históricos, lo que le ayudará en la toma de decisiones y en la seguridad del personal a la hora de elegir zona segura y ruta de escape. Además, sería el encargado de la efectividad del medio aéreo y sus descargas en sintonía con el personal de tierra ya que las descargas por sí solas no suelen controlar y liquidar.

Figura 3—Técnico realizando las tareas de Dirección de Extinción (izquierda) y supervisión de maniobra segura de embarque de su brigada en helicóptero al finalizar su trabajo (derecha).
Imágenes: Juan Caamaño, 2005 (izquierda) y Clara Quesada, 2004 (derecha).

Tiene ciertas responsabilidades para evitar nuevas reproducciones futuras y nuevas movilizaciones de medios a lugares donde ya se ha actuado, situación que incrementaría el coste. Y, finalmente, podrá actuar como Director de Extinción (Figura 3).

Gastos en extinción

En grandes cifras, podríamos decir que el coste de la extinción y prevención activa, entendida como las infraestructuras de apoyo a la extinción (cortafuegos, balsas de agua, etc.) en España, repartido entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y las CC.AA., asciende a 450 millones de euros al año (MMA, 2005). Por otro lado, la media de superficie forestal quemada al año en España, sin distinguir entre tipos de vegetación, supone unas 150.000 hectáreas. En el gasto anual en la lucha contra los incendios forestales se incluyen los presupuestos en extinción y las actuaciones de prevención activa, como el mantenimiento de cortafuegos, construcción de puntos de agua, campañas de sensibilización, etc. Según estos valores, desde el punto de vista del gasto en extinción, cada hectárea quemada costó 3.000 euros. Pero este es un valor que no deja de ser orientativo y, quizás, no sea el mejor estimador dado que los gastos producidos en los incendios, a veces, no son proporcionales a la superficie calcinada y habría que tener en cuenta la dificultad en extinción y la incorporación sucesiva de medios. La labor del técnico de primera intervención puede ser crucial aquí, para evaluar esta potencialidad del fuego y poder asignarse los recursos de forma apropiada.

Así, se estima que el daño generado por los incendios forestales produce

pérdidas anuales no inferiores a los 1.125 millones de euros a lo que hay que sumar los 650 millones de euros en concepto de extinción, prevención activa y restauración de zonas quemadas, unos 1.800 millones de euros en total. Naturalmente estas cifras no incluyen otros valores como la pérdida de vidas humanas, bienes de las personas afectadas o el valor existencial que tenía el paisaje perdido y su influencia en cuestiones tales como el turismo, ocio, etc.

La situación actual parece indicar que en los próximos años continuará la tendencia a estabilizar o incluso reducir el número de siniestros y que la mayoría de los incendios forestales serán controlados más rápidamente. Por el contrario, habrá un reducido número de fuegos que escaparán del ataque inicial alcanzando grandes dimensiones y serán responsables de la mayoría de los daños.

Es aquí donde para una mejor optimización de este trabajo, se requiere una mayor y más completa profesionalización técnica. El coste que supone la medida planteada, en comparación con los costes del trinomio “aeronave-piloto-mecánico”, es insignificante y los beneficios obtenidos muy claros, una capitalización de la experiencia, un aumento de la seguridad y de la eficacia y por tanto una reducción de la superficie quemada con la consiguiente disminución del gasto.

Propuestas de mejora y discusión

La problemática

Como en otras facetas del sector forestal la extinción de incendios forestales acusa un marcado carácter de precariedad laboral debido a la estacionalidad que afecta de manera especialmente preocupante al colectivo técnico no perteneciente a las Administraciones, es decir, personal contratado. Esto genera como resultado la inexistencia de una profesión definida y reconocida.

Ante tal indefinición es aquí donde decidimos realizar una encuesta que reflejase la realidad sobre el colectivo de ingenieros e ingenieras que trabajan y/o han trabajado como Técnicos de Brigada Helitransportada que permitiese por tanto conocer de primera mano cuáles eran y son las aspiraciones, inquietudes y problemática de este sector profesional.

En este caso, limitamos la investigación a estudiar al personal contratado temporal y no al contratado indefinido pues creemos conveniente prestar mayor atención en este momento a aquel colectivo ya que se trata de un colectivo mayoritario y trabaja en prioritario

Para ello, formulamos una serie de preguntas, en un cuestionario cerrado y estructurado en el que pretendimos englobar a todos los miembros del colectivo técnico de España con una muestra representativa del total, tarea nada fácil debido a la deslocalización geográfica y al desconocimiento de contactos entre los propios

profesionales y a la lógica inexistencia de bases de datos oficiales y fiables sobre los mismos. Las características de la encuesta se encuentran recogidas en la Tabla 3.

Características de la encuesta a Técnicos de Brigada Helitransportada
Encuesta personal a una muestra de 76 individuos seleccionados entre la población de ingenieros/as técnicos forestales e ingenieros/as de montes que se dedican durante la campaña 2007 a este trabajo. La muestra utilizada estimamos que corresponde aproximadamente al 40% de la población total y tiene en cuenta al 25% de las empresas implicadas.
El ámbito geográfico ha sido territorio nacional español
La herramienta de recogida de datos fue un cuestionario estructurado
El método de recogida de datos ha sido la realización de una encuesta mediante entrevista personal y encuesta telefónica cuando no ha sido posible la primera opción.
Las fechas de realización del trabajo de campo abarcan desde el mes de abril de 2007 hasta el mes de octubre del mismo año.

Tabla 3- *Características principales de la encuesta realizada a Técnicos de Brigada Helitransportada entre abril y octubre de 2007.*

Finalmente se consiguió localizar y contactar con un total de 76 personas a lo largo de todo el territorio nacional, muestra más que representativa del total, que, desinteresadamente, prestaron su colaboración dentro de las cuales incluimos a las que trabajaron durante 2007 y las que lo hicieron anteriormente a ese año, aunque en el presente se dedicasen a otras tareas (Tabla 4). La distribución espacial de la muestra es independiente del número total de profesionales en cada Comunidad Autónoma. De este modo pudimos conocer también cuál había sido la evolución de la profesión en los últimos años a la vez que permitía tener en cuenta la experiencia adquirida en este período.

Se ha llevado a cabo una fase de aproximación en la que se ha recogido información de primera mano para el colectivo objeto de estudio. No obstante lo anterior se está continuando las investigaciones de modo que se pueda ampliar de modo significativo el número de personas entrevistadas y, así, acercarnos al total de la población lo más posible.

Distribución espacial de la muestra	Número de Técnicos entrevistados
Norte y oeste (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra)	8
Arco del Mediterráneo (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares)	48
Canarias 10	
Comunidades interiores (Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, La Rioja y Aragón)	10
TOTAL 76	

Tabla 4- *Distribución espacial de la muestra de la población de ingenieros e ingenieras que trabajan actualmente o han trabajado como Técnicos de Brigada Helitransportada. Elaboración propia a partir de datos de trabajo de campo realizado entre los meses de abril y octubre de 2007.*

Este estudio nos permitió comprobar realmente que se trata de un colectivo preocupado por su profesión. Los resultados obtenidos, en general nada sorprendentes respecto a lo esperado, se resumen a continuación en este apartado.

La formación es una cuenta pendiente que se encuadra entre la inexistencia de modelos formativos adecuados y la precariedad de muchos de los existentes. Se observa que es realmente mejorable que:

- Un gran número de altos mandos en la dirección de extinción son funcionarios pertenecientes a los Servicios Forestales dedicados a selvicultura, aprovechamientos, obras u otros que en época estival son también encargados de la extinción de incendios forestales por lo que tienen escasa o nula formación en manejo de personal, trabajo en equipo, gestión de emergencias, comportamiento del fuego, educación física, etc. Ni siquiera, salvo puntuales excepciones, existen en los planes de enseñanza superior, media y demás centros académicos, asignaturas sobre extinción de incendios forestales adecuadas a las necesidades actuales y cogidas de la mano con lo que la ciencia y la técnica desarrollan continuamente. Basta citar que muy poca información generada en los Congresos Internacionales de Incendios Forestales llega realmente a los miembros de los dispositivos.
- No queda definida la línea maestra que debe marcar una formación reglada, homologada y que integre la investigación nacional o internacional, y por tanto, temarios extensos que permitan el diseño de planes de formación integral donde se recojan las experiencias acumuladas y los avances de otros campos interrelacionados.
- La inversión en prevención es aún escasa, los incendios cada vez son más potentes por la acumulación de combustibles y nuestras técnicas y herramientas limitadas a unos pocos metros de llama por lo que deben invertirse más recursos

en este aspecto.

- El fuego prescrito parece ser una herramienta cada vez más aceptada para hacer frente a esta limitación pero que requiere de técnicos muy bien formados en manejo del fuego. Los incendios que se avecinan, con comportamiento G.I.F, por la acumulación de biomasa requieren para su control de técnicas como los contrafuegos, muy complicadas si no se tiene una adecuada formación y experiencia.
- Este parece ser en muchas zonas un sector marginal por temporalidad y remuneración, cuyo efecto sea porcentajes altos de personal no cualificado, en muchos casos sin ilusión por formarse, pero trabajando en un sector tan delicado y peligroso como el que exponemos aquí de los incendios forestales. Pero quizás lo peor sea el abandono de los profesionales más experimentados por falta de futuro en esta profesión y la consiguiente renovación con novales creando una muy alta tasa de rotación.

Una mayor y más completa profesionalización daría como resultado la posibilidad de aumentar la seguridad y de disminuir la superficie quemada mediante mejores técnicas, una preparación física adecuada y el desarrollo del trabajo en equipo en todos sus niveles. Es una equivocación difundida pensar que este es trabajo solo de jóvenes, valorando como mejor cualidad la forma física.

La falta de estructuras permanentes en la extinción forestal es otro de los causantes de que los planes no funcionen óptimamente, al montarse y desmontarse cada campaña, repercutiendo negativamente en todos sus niveles. Claro ejemplo es la ruptura de los equipos humanos que en muchos casos no vuelven a coincidir en otras campañas debido a la constante reubicación. Esto para el técnico es un gran inconveniente porque al recibir una brigada nueva debe pasar un tiempo de adaptación donde el personal adquiere confianza en el técnico y viceversa.

En este apartado llama la atención que aproximadamente la mitad de los entrevistados opinen que de la extinción de incendios debe encargarse la Administración, tal como hasta ahora y como voto de confianza y esperanza de mejora, frente a la otra mitad que opina que debe privatizarse el servicio pues la Administración ha demostrado su incompetencia.

Otros aspectos que influyen notablemente en la problemática y que entendemos que no son fáciles de corregir son:

- La división entre Comunidades Autónomas con formas de trabajar diferentes, en algunos casos sin coordinación fluida entre ellas.
- La carencia de una formación integral y unificada de los combatientes a distintos niveles territoriales.
- La necesidad de unos medios y presupuestos acordes a una profesionalización real. Es cierto que se ve una mejora pero aparentemente es lenta y, desde luego,

insuficiente.

- Los grandes problemas que genera la autocrítica, aunque sea positiva como la que se pretende aquí.

Pero, por otra parte, la sociedad actual, cada vez más desarrollada, llamada del primer mundo, no acepta que las emergencias se nos vayan de las manos. Baste con exponer los numerosos casos de incendios forestales en urbanizaciones o cerca de ellas, en los que se exige la máxima capacidad.

Figura 5 — Estrategia y táctica de control eficaz elaboradas por un Técnico experimentado (izquierda) y ejecutada por la brigada que está a su mando (derecha). Imágenes: Mauricio Martín, 2006.

Técnico estable frente al técnico temporal. Situación actual y profesionalización.

Queda bastante claro que la situación del técnico de brigada helitransportada dentro de la problemática general es menor. Pero hay un punto muy importante a tener en cuenta: cuando la brigada helitransportada llega al incendio, por su celeridad, muchas veces la primera, dependiendo de cómo haga el ataque este puede quedarse en conato o pequeño incendio o bien puede pasar a ser un GIF que son los económicamente onerosos y que pueden llegar a colapsar el dispositivo.

El técnico profesional, veterano, ya conoce las características del territorio, al personal tanto técnico como operativo, el dispositivo y la forma de trabajar.

Temporalidad, estacionalidad, contratación por campaña entre tres y cinco meses, muchas veces como primeros empleos, implica inseguridad, estrés y como resultado que los medios no sean lo más eficaces que pudieran. Se generan situaciones de indecisión por causas como el desconocimiento del comportamiento del fuego. La gran mayoría de los técnicos encuestados (87%) opina que un curso básico de incendios forestales no es suficiente para la toma de decisiones y esto deriva en problemas tan graves como la desconfianza del personal a su mando e incluso contrariedades en decisiones que pongan en peligro la seguridad.

Figura 6—Situaciones en las que el Técnico realiza una planificación aérea eficaz de ataque previa a un incendio forestal por conocimiento anterior de la zona de intervención. Imagen: Clara Quesada, 2004 (izquierda) y 2006 (derecha).

A pesar de la posible capacidad de adaptación de la persona a esa continua renovación que supone empezar de cero en nuevas bases forestales de helicópteros se invierte demasiado tiempo y esfuerzo en detrimento de la mejora, reciclaje, investigación y ensayo de nuevas técnicas.

Este colectivo sufre de un estrés inicial en los nuevos destinos y responsabilidades. Ya es bastante la enorme responsabilidad que se tiene en cualquier primer ataque para que no crezca el incendio además de garantizarse la seguridad para el personal a su cargo. Por tanto, a ese doble estrés se le suma el derivado de ser principiante.

Inconvenientes: los incendios se agravan por novatos al mando. ¿Cuánto cuesta ese crecimiento?

En el primer ataque se movilizan unos medios que potencialmente pueden controlar el incendio rápidamente con los medios presentes. Dependiendo del caso aumentará o disminuirá la superficie que puede apagar la brigada helitransportada, pero llegado a un punto de no retorno, los costos del incendio aumentan de forma exponencial por el gasto en extinción y por los daños producidos.

Pero *¿cuánto se quema con técnicos noveles frente a cuánto menos se podría haber quemado si realmente fuéramos profesionales expertos?* Esa pregunta es muy difícil de contestar por la ausencia actual de datos a este respecto, es decir, por subjetiva, pero los técnicos que trabajan y trabajamos en este campo saben que al principio cometen errores, en la mayoría de casos por falta de experiencia, a veces simplemente por falta de conocimiento de la zona. Estos errores generan estrés y, como consecuencia, dudar en la toma de decisiones, con una poca o mala capacidad para priorizar, o en la elección de herramientas a utilizar, previo al desembarco, en

función de variables como el tipo de combustible, que puede ser que se desconozcan.

Cuando hablamos de inexperiencia debemos incluir aquí a la que se genera por la elevada movilidad a la que estamos acostumbrados. Un caso muy claro es el que se produce cuando un técnico peninsular se traslada a Canarias o viceversa, con meteorología, combustibles, territorio y formas de trabajar muy diferentes a lo que pueda estar acostumbrado. En esto como en otras situaciones necesitará tiempo para adaptarse (Figura 7).

Figura 7—Brigada helitransportada en primer ataque siguiendo las instrucciones de su Técnico, experimentado y con formación avanzada en incendios forestales. Imagen: Federico Grillo, 2006.

Por tanto, queda claro que existen grandes posibilidades de tener medianos y grandes incendios por “incompetencia” del técnico en la fase inicial. Esto se ha ido salvando en ocasiones gracias a la ayuda de capataces y brigadistas veteranos de la zona se mantienen en la misma base campaña tras campaña lo que permite conocer meteorología, combustibles y topografía local.

Soluciones. Invertir en personal técnico más cualificado.

Un axioma aceptado es que *Un buen técnico de brigada helitransportada puede reducir mucho la factura compensando con creces su salario.* ¿Cómo conseguir esta mejora?

La experiencia se puede conseguir en menos plazo de tiempo si se tiene una formación avanzada (Grillo y Molina 2007) pues mucha información disponible y detallada sobre cómo se mueven los incendios forestales, desde un punto de vista mecanicista, no ha llegado a muchos Técnicos de Brigadas Helitransportadas (temporales o funcionarios). Algunos de estudios detallados de cómo se mueven esos incendios forestales históricos se encuentra entre otros en UTGRAF (2000-2007) revista electrónica semanal de los incendios acaecidos (editado por Bomberos de Cataluña), Grillo y Molina (2007), Viegas (2007) y Viegas y otros (2007).

Pero vamos por partes:

Inversión en formación de técnicos especialistas para poder ejercer mejor su trabajo. Esto se puede conseguir:

- a.- Desde las Universidades y los Colegios Oficiales, con mayor implicación.
- b.- Desde las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c.- Desde las empresas, con inversiones en I+D+i.

Continuidad para que esos especialistas puedan vivir de su trabajo y que no se abandone. Para lograrlo proponemos actuaciones como:

- a.- Contratos de mayor duración, a ser posible continuando con tareas de prevención y formación fuera del tiempo de campaña.
- b.- Mejora de las retribuciones hasta niveles comparables con otras del sector técnico forestal que permita atraer personal. Una cierta rotación puede ser positiva pero no inferior a cinco años (según autores), tiempo que se tarda en rentabilizar la experiencia de las dos primeras campañas.

Estabilidad local que los convierta en expertos en el territorio.

Investigación y desarrollo (estudios)

Técnicos noveles mediante la recomendación realizada por Vélez (2000) no se podrían integrar en equipos helitransportados ya que deberían tener dos años de experiencia. Esto se podría sustituir si el técnico novel en su primer año acompañase a un técnico veterano en las salidas a incendios. Esta medida, usada antiguamente en las BRIF A, aumentaría su eficiencia en campañas posteriores y daría mejor resultado que únicamente el curso teórico de TBH de una semana de duración que consideramos insuficiente.

No es la primera vez que desde el sector de incendios forestales se acepta el reto de procurar integrar la profesionalización en la gestión forestal y tampoco se pretende introducir planteamientos novedosos o descubrir soluciones simples a problemas complejos. Se trata tan solo de un intento de demostrar que la profesionalización no es tanto una obligación como una necesidad. Estas serían grandes soluciones con enormes trascendencias en la mejora.

Figura 8 —Propuesta para una profesionalización de calidad a partir de las conclusiones de este estudio: conjunción de continuidad laboral, formación adecuada y acumulación de experiencia.

Agradecimientos

Agradecemos profundamente la colaboración de todos los ingenieros e ingenieras que han cedido desinteresadamente parte de su tiempo para la realización de este estudio sobre la profesión y sin cuya participación este trabajo indudablemente no habría sido posible.

Referencias

- Grillo, F., Molina, D. (coordinadores). 2007. **Curso de Especialización en Análisis del Fuego Forestal**. Universidad de Lleida y Academia Canaria de Seguridad.
- Junta de Andalucía. 2003. **Iª Valoración Económica Integral de los Ecosistemas Forestales, 2003**.
- MMA. 2006. **Informe de incendios forestales en el decenio 1996-2005**.
- Rábade, J.M. y Aragonés, C. 2004. **Políticas, Planificación y Economía en la Defensa contra Incendios Forestales** en II Simposio sobre Políticas, Planificación y Economía en la Defensa contra los Incendios Forestales. 19-22 abril 2004, Córdoba, España.
- Vélez, R. ed. 2000. **La defensa contra incendios forestales: Fundamentos y experiencias**. McGraw Hill, Madrid, c. 1400 p.
- Viegas, D.X. **Analysis of Eruptive Fire Behaviour** en “Proceedings of the 5th International Conference on Forest Fire Research”. 27-30, noviembre 2006, Figueira da Foz. Portugal.
- Viegas, D.X., Rossa, C., Caballero, D., Pita, L.C.P., Palheiro, P. 2006. **Analysis of accidents in 2005 fires in Portugal and Spain** en “Proceedings of the 5th International Conference On Forest Fire Research”. 27-30, noviembre 2006, Figueira da Foz. Portugal.
- UTGRAF 2000-2007. Lo forestalillo.
- WWF/Adena. 2004. **Incendios forestales: Causas, Situación Actual y Propuestas**. WWF/Adena, Madrid. 24 pp.
- WWF/Adena. 2006. **Grandes Incendios Forestales Causas y efectos de una ineficaz gestión del territorio**. WWF/Adena, Madrid. 34 pp.

Compensación por Incendios Forestales: Un Ejercicio de Valoración Contingente con Pago Fijo y Variación en los Niveles de Calidad Ambiental¹

Dulce Armonia Borrego y Pere Riera²

Resumen

En el formato dicotómico del método de valoración contingente, el cambio ambiental propuesto permanece fijo entre muestras mientras que la cantidad de dinero a pagar propuesta varía. Este estudio aplica este procedimiento para estimar el valor del “débito” o valor de la pérdida de bienestar por el daño en el recurso natural. En el contexto de compensación valor-a-valor, se requiere la estimación de la mejora ambiental equivalente o “crédito” en términos de preferencias sociales. Con este propósito, se propone una variante del formato dicotómico del método de valoración contingente, donde en la pregunta de valoración se fija el importe del pago estimado al valor del débito, mientras que la cantidad de compensación medioambiental propuesta varía entre los encuestados. Con ello se estima la media de la cantidad mínima de compensación física requerida por los daños, según las preferencias sociales. La aplicación en este caso de estudio se basa en un incendio forestal ocurrido en España. Se estima que por cada hectárea de bosque incendiada, se requiere una hectárea de remediación primaria y ½ hectárea de remediación compensatoria por las pérdidas temporales hasta la recuperación total del medio.

Palabras clave: Valoración contingente; valoración de incendios forestales; análisis de equivalencia de valor.

Introducción

La metodología de la equivalencia de recursos ha sido utilizada ampliamente en Estados Unidos para estimar la responsabilidad medioambiental con el propósito de proteger los recursos naturales. La reciente promulgación en la Unión Europea de las leyes medioambientales sobre responsabilidad medioambiental ha establecido un régimen para garantizar la reparación y restauración del medioambiente con la debida compensación a la sociedad por los daños a los recursos naturales (Comisión

¹ Una versión abreviada de este Trabajo se presentó en el III Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo, 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Departamento de Economía Aplicada Universidad de Barcelona, España, E08193, Bellaterra, España; Email: DulceArmonia.Borrego@campus.uab.es; pere.riera@uab.es.

Europea, 2006). En este contexto, la responsabilidad medioambiental implica la obligación por parte del que contamina de restaurar el medio dañado a la situación original, teniendo en cuenta también las pérdidas temporales hasta que la restauración sea completa.

Siguiendo la experiencia norteamericana, la legislación europea considera dos enfoques para calcular la cantidad de compensación requerida: la equivalencia física entre daño y compensación (recurso-a-recurso o servicio-a-servicio) y la equivalencia en términos de valor social (valor-a-valor). La Directiva del Parlamento Europeo sobre Responsabilidad Medioambiental da prioridad al primero de ellos, pero también considera el último.

En el análisis de equivalencia de recursos, el “débito” o daño se estima en términos de pérdidas de los recursos dañados. La compensación obtenida o “crédito” debe equivaler al débito en términos de recursos. De igual manera, en el análisis de equivalencia de hábitat (AEH), el débito y crédito en términos de servicios provistos por el hábitat deben ser iguales. Asimismo, en el análisis de equivalencia de valor (AEV), el valor social de los créditos debe equivaler al valor social del débito. Dependiendo del enfoque usado, los resultados se expresarán en distintas métricas, por ejemplo, en términos de área de remediación requerida (hectáreas de bosque), en número de organismos o especies por reemplazar (pinos de una determinada variedad), en servicios recreativos (visitantes), unidades monetarias, etc.

Este artículo se centra en la equivalencia de valor, mediante la aplicación de un método de preferencias declaradas –el método de valoración contingente (MVC)– como herramienta para estimar la remediación requerida en un incendio forestal en España. Basado en encuestas, el MCV es quizás el método más utilizado para la valoración de recursos naturales (Carson, en prensa). El cuestionario describe el cambio a valorar y la forma de pago para el mismo (Mitchell and Carson, 1989). En su formato abierto, se pregunta a una muestra de la población por su máxima disposición a pagar (DAP) por obtener una mejora o evitar un empeoramiento, o su mínima disposición a aceptar dinero en compensación por renunciar a una mejora o aceptar un empeoramiento. Con frecuencia se utiliza un formato dicotómico, cerrado. Se presenta al individuo el cambio a valorar y el pago requerido (o la compensación, en su caso), y se pregunta si aceptaría o no la nueva situación a un coste dado. La cantidad a pagar varía entre submuestras, mientras que el cambio a valorar permanece constante.

La mayoría de las aplicaciones de AEV utilizan métodos de experimentos de elección basados en atributos para identificar las preferencias para la valoración de la compensación por las pérdidas temporales (Bishop et al., 2000; Swait et al., 1998). La principal contribución de este estudio consiste en proponer la aplicación del método de valoración contingente, con una variante en la estimación del crédito en

términos físicos. El débito se obtiene mediante una aplicación del MVC tradicional con formato dicotómico (el daño a valorar es el mismo para toda la muestra y el pago requerido varían entre individuos). El valor obtenido (la media o la mediana) se usa como pago requerido en un segundo ejercicio de valoración contingente con formato dicotómico, donde varía entre individuos la cantidad de compensación propuesta. De esa forma se halla la cantidad mínima de restauración ambiental que deja indiferente a la sociedad entre no haber ocurrido el daño y que el daño haya ocurrido y se haya compensado con la restauración. Por tanto, la aplicación en este caso de incendio forestal y el programa de forestación utiliza dos cuestionarios de MVC sucesivos. El primer cuestionario utiliza el formato dicotómico tradicional para estimar el valor económico para la sociedad de la provincia de Barcelona de un programa de prevención de incendios forestales con base a un incendio ocurrido en la parte central de Cataluña en el pasado. El segundo cuestionario, estima las preferencias de la sociedad para la cantidad del programa de restauración que provee servicios de equivalente magnitud a las causadas por el incidente, empleando la variante del formato dicotómico anteriormente expuesta.

En la siguiente sección se presenta brevemente el marco teórico del MVC para el cálculo del débito y el crédito. La Sección 3 provee información sobre el diseño del cuestionario. La Sección 4 describe el diseño experimental en la aplicación empírica del estudio piloto. Tras ello se presentan y discuten los resultados, y se termina con las conclusiones.

Fundamento Teórico

La economía del bienestar proporciona el fundamento para la evaluación de daños a recursos naturales. Específicamente, la medida de cambio en el bienestar, la variación de compensación, es la que provee el fundamento para la valoración de daños. Se supone que los individuos maximicen su utilidad, tomado en consideración su presupuesto, el precio de los bienes de mercado (x), el nivel de bienes intangibles (z), y otras características (s). El nivel de los bienes intangibles o públicos se asume exógeno.

$$\text{Max } u(x, z, s)$$

Resolviendo este problema se puede obtener la combinación óptima de consumo (en particular, la cantidad óptima de x^*). Por tanto, la función de utilidad se puede expresar indirectamente como:

$$u(x^*, z, s) = v(p_x, y, z, s)$$

Un cambio en el nivel de provisión de un bien público, de z^0 a z^1 , implica un cambio en el nivel de utilidad de $v(p_x, y, z^0)$ a $v(p_x, y, z^1)$. La máxima disposición de un individuo a pagar por dicho cambio es aquella cantidad de dinero, A , que deja al individuo indiferente entre pagar y obtener el cambio, y no pagar y no obtener el cambio. Es decir, $v(p_x, y, z^0) = v(p_x, y - A, z^1)$. Cuando A tiene el valor que cumple con la igualdad, entonces $A = \text{DAP}$ del individuo. Si A fuese menor, el individuo optaría por el cambio (z^1), y si fuese mayor por la situación original.

El investigador no puede observar de forma precisa la DAP de los individuos. Ello puede modelizarse mediante un componente aleatorio, ε , en la función de utilidad. Así, utilizando el formato dicotómico de valoración contingente, la probabilidad de aceptar un pago propuesto de A unidades monetarias es igual a la probabilidad de que la DAP sea mayor o igual a A . O, en términos de utilidad,

$$\Pr\{[1]^{si}\} = \Pr\{v(p_x, y, z^0, \varepsilon) \leq v(p_x, y - A, z^1, \varepsilon)\}$$

Un supuesto sobre la distribución del término aleatorio, juntamente con las variaciones en las cantidades de pagos propuestas a los individuos, constituyen la base para las estimaciones econométricas y el consiguiente cálculo de la DAP media o mediana. Gráficamente (figura 1), la probabilidad de aceptar al pago propuesto A está modelada por $1 - G(A)$, donde $G(A)$ es la función de distribución acumulada (fda) de la máxima disposición a pagar de los individuos.

Figura 1—Probabilidad de aceptar el pago propuesto (A_M denota la DAP mediana)

De manera análoga, el nivel en la provisión del bien público puede variar manteniendo la cantidad de pago constante. La probabilidad de aceptar el cambio

propuesto a un coste A depende de que la cantidad del cambio propuesto sea suficiente, si se trata de una mejora. En consecuencia, se puede aplicar la expresión [1] en el marco de los modelos de maximización de la utilidad aleatoria. La diferencia ahora es el supuesto sobre la distribución del término estocástico que, en conjunto con variaciones en el nivel de, permite obtener la media o mediana de la mínima cantidad de bien público requerida para compensar un pago fijo de A . En términos gráficos, la probabilidad de aceptar la cantidad del bien público provista como compensación puede representarse con la fda de la cantidad de bien público requerido, $G(Z)$. En la representación de la fda de la figura 2, se supone que (z^1) es una variable continua truncada en cero, reflejando la hipótesis de que los individuos rechazarán pagar A en caso de que no haya mejora en la provisión del bien público.

Figura 2—Probabilidad de aceptar un aumento dado de un bien público, truncado en cero (Z_M de nota la mediana y la mínima provisión de bien público dada un determinado pago)

Construcción del Mercado de Valoración Contingente

Este caso de estudio implica la realización de dos ejercicios de valoración sucesivos. Ambos corresponden a la valoración contingente de una encuesta piloto realizada en la provincia de Barcelona. La elección de esta delimitación administrativa es arbitraria, dada la finalidad del estudio: proponer un procedimiento nuevo en aplicaciones valor-a-valor y mostrar su una aplicación empírica. El primer ejercicio estima valores de un programa de prevención de incendios en un tercio de bosques de pinus nigra en la zona central de Cataluña. La segunda encuesta propone un programa de forestación de pinus nigra en otras regiones de Cataluña como plan

de compensación e identifica la cantidad de compensación requerida para regresar a los individuos a su nivel de utilidad inicial.

La primera etapa de este estudio tiene el objetivo de estimar el valor social de las pérdidas ocasionadas por un gran incendio forestal, similar al que ocurrió en Cataluña en 1994 y que afectó aproximadamente un tercio de los bosques de pinus nigra. Aunque este incidente sucedió hace algunos años, se ha presentado en el cuestionario como un escenario a futuro. El Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña (IEFC) y el Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2) llevados a cabo en la zona del incendio un año antes de ocurrir el incendio forestal reflejan la situación antes de la pérdida.

La especie afectada está incluida en la protección prioritaria de la Directiva de la Unión Europea sobre Hábitat. Esta especie es el tercer tipo de pino más abundante en Cataluña. En bosques mixtos, donde los robles han rebrotado, y los pastizales y matorrales se han regenerado, pero no los pinus nigra, dada la escasa capacidad de regeneración que presentan. Los bosques de este tipo de pino se utilizan mayormente para actividades recreativas como recolección de setas o turismo rural. La información presentada a los encuestados en el cuestionario fue proporcionada por especialistas de pinus nigra en Cataluña con el fin de garantizar una descripción fiel en el cuestionario. En particular, se presentaron los efectos esperados para los próximos años hasta su recuperación completa.

Se realizaron reuniones de grupo con participantes seleccionados del público en general. Adicionalmente, se realizaron varias entrevistas individuales antes de la fase piloto para asegurar claridad en la información proporcionada a los encuestados con respecto a las consecuencias del gran incendio forestal esperado en los bosques de pinus nigra en los próximos 10 años, así como la aceptación del mercado simulado en el cuestionario.

Prevención de grandes incendios forestales

De acuerdo a las prácticas actuales para la evaluación de daños a recursos naturales (véase por ejemplo Carson et al., 2003), se consideró un programa para prevenir un gran incendio forestal en el futuro. Así, el programa de prevención propuesto en el cuestionario tenía el objetivo de proteger y preservar un tercio de la superficie de bosques de pinus nigra de la parte central de Cataluña, que en caso contrario, se esperaba que se incendiase en los próximos 10 años. La construcción del escenario enfatizaba la duración y extensión del daño esperado desde el año del incidente hasta que el bosque se recuperase a su situación original. Así, la información presentada a los encuestados indicaba que después de ocurrir el gran incendio forestal esperado, se requerirían unos 50 años para volver el nivel ambiental a su situación inicial.

Respecto al concepto de pérdidas temporales que se pretendía valorar, las reuniones de grupo y entrevistas individuales mostraron que las personas distinguían claramente la diferencia entre las consecuencias de las pérdidas permanentes y temporales. Las preguntas de debriefing posteriores a la de valoración revelaron que los encuestados comprendían correctamente que, de suceder el incendio, habría una escasa regeneración natural de los pinos, y que de forma natural el paisaje se recubriría mayoritariamente de robles, encinas y arbustos.

Programa de Compensación

La restauración propuesta consistió en la plantación en un lugar distinto de bosque de pinus nigra que proporciona el mismo hábitat que el incendiado. La principal razón de proponer un programa de regeneración en una superficie distinta a la del incendio es para estimar el efecto de la distancia geográfica en la DAP, que es objeto de otra investigación.

Como se ha mencionado, para propósitos de este estudio, se utilizó un formato modificado del MVC con el fin de estimar la cantidad apropiada del programa de compensación, manteniendo la cantidad del pago constante al valor obtenido en el primer cuestionario, y variando la cantidad de compensación. Por lo demás, este segundo cuestionario es muy parecido al primero.

Aplicación

El cuestionario piloto se administró en el otoño de 2007. Cuarenta y un personas fueron partícipes en el piloto del cuestionario correspondiente al programa de prevención de incendios y cuarenta y un personas para el programa de compensación. La modalidad de la entrevista fue personal “cara a cara” y realizada a residentes mayores de 18 años. La duración media de cada entrevista fue de alrededor de 14 minutos.

La mayoría de los encuestados declararon estar familiarizados con los efectos y consecuencias de los grandes incendios forestales en Cataluña. Después de la pregunta de valoración, se preguntó a los encuestados por los principales motivos para aceptar o rechazar el pago propuesto, respuestas que se utilizaron para identificar respuestas de protestas. Finalmente, los resultados obtenidos en la prueba piloto se utilizaron para fijar las cantidades de los pagos y los niveles de compensación a proponer en la versión final de ambos cuestionarios.

Cuestionario de prevención de incendios

Tras una presentación introductoria, la primera pregunta del cuestionario solicitó a los encuestados indicar el nivel de preocupación personal respecto a algunos

problemas generales como inmigración, coste de vivienda, protección al medioambiente y desempleo. Esta pregunta inicial tenía la intención de familiarizar al entrevistado con el escenario de valoración. A continuación, se mostraba un mapa indicando la superficie cubierta por bosques en Cataluña y tras éste, imágenes de los cuatro tipos de bosque más abundantes, dentro de los cuales se incluía la especie *pinus nigra*. Se pidió a los encuestados indicar cuál de estos tipos de bosques conocían o habían visitado alguna vez. La información presentada incluía un mapa mostrando la distribución específica de los bosques de *pinus nigra*.

Después, se describió información específica sobre el bosque que se pretendía preservar, la densidad actual del bosque, y la probabilidad de un gran incendio forestal así como sus consecuencias. El programa para evitar el gran incendio forestal lo promovía una fundación sin ánimo de lucro. En este punto, se les informó a los encuestados que en caso de llevar a cabo el programa tendría que ser pagado por todos los residentes de Cataluña con pagos obligatorios en un fondo especial durante 10 años. La pregunta de DAP siguió un formato dicotómico simple.

Finalmente, la tercer parte del cuestionario incluía algunas preguntas posteriores a la entrevista y sobre datos socioeconómicos de los encuestados y sus hogares.

Cuestionario de programa de compensación

El cuestionario para valorar la compensación siguió una estructura similar a la utilizada para valorar la prevención de incendios. Antes de preguntar a los encuestados cuánto pagarían por el programa de remediación, se les describió el escenario después del incendio y el tiempo requerido para su recuperación total. Después se les informó del programa de compensación por las pérdidas temporales. La remediación propuesta consistía en un programa de forestación en áreas apropiadas de Cataluña pero distintas a la superficie incendiada. El coste debería ser pagado por los residentes de Cataluña en pagos obligatorios durante 10 años.

Como ya se ha explicado, para la pregunta de valoración se fijó el pago para distintas cantidades del programa de remediación (i.e. hectáreas de forestación) que compensaría las pérdidas causadas por el daño ambiental. La superficie de forestación se expresó en términos de porcentaje con respecto al área del incendio forestal.

Resultados

Prevención

Un tercio de las entrevistas piloto para la valoración del programa de prevención de incendios correspondieron a respuestas de protestas. El principal motivo de protesta para no pagar fue que el gobierno debería pagar por el programa. Las respuestas de

protesta identificadas se eliminaron al computar los valores de DAP. Así, la base de datos para la valoración del piloto consistió en 26 observaciones. La tabla 1 muestra algunas estadísticas de los encuestados.

Tabla 1—Valores medios de las características demográficas del cuestionario de prevención

	Piloto 1
Porcentaje de hombres	46,15
Porcentaje de mujeres	53,85
Nivel Educativo (años)	12
Edad	39,3
Visitaron el bosque (%)	61,00

Para la estimación de la media de la DAP se ajustó un modelo logit correspondiente a la aceptación o rechazo de los encuestados a pagar por un programa de prevención de incendios (Hanemann, 1984). La tabla 2 muestra los resultados de la estimación. La DAP media anual fue de 68.7 euros anuales en valores de 2007 a pagar durante 10 años por implementar un programa que preservaría un tercio de la superficie de bosques de pinus nigra en la parte central de Cataluña.

Tabla 2—Resultados del modelo Logit para prevención*

Variable	Coefficiente
Constante	0.931 (0.247)
Pago	-0.135 (0.262)
Log likelihood	- 17.295
Chi-cuadrada	1.299
Observaciones	26

*Valor del estadístico t entre paréntesis

Las preguntas finales del cuestionario no revelaron problemas para la comprensión del bien a valorar y en el contenido del cuestionario en general.

Compensación

Para el cuestionario que corresponde a la compensación se empleó el valor obtenido de DAP del ejercicio previo, redondeado en 70 euros. Las respuestas de protesta representaron un 36%, quedando 26 respuestas válidas para el análisis. Nuevamente, el principal motivo de protestas fue que el gobierno debería pagar por el programa, seguido por aquellos que opinaban que son los propietarios de los bosques los que

deberían pagar. La tabla 3 muestra algunas estadísticas de la población encuestada.

Tabla 3—Valores medios de las características demográficas del cuestionario de compensación

	Pilot 2
Porcentaje de hombres	50,00
Porcentaje de mujeres	50,00
Nivel educativo (años)	13
Edad	34,0

La tabla 4 muestra los resultados del modelo logit estimado que corresponde a la aceptación/rechazo de la cantidad de restauración propuesta. La media o mínima compensación requerida por las pérdidas temporales, expresada en porcentaje (sobre la superficie original del incendio) de forestación de pinus nigra fue de 52.21%, o 13,000 ha a plantar en la comarca de Anoia. Lo que implica que, para compensar las pérdidas temporales de los bosques de pinus nigra incendiados, se requiere una forestación de aproximadamente la mitad de la superficie total incendiada fuera de sitio, basado en las preferencias sociales.

Tabla 4—Resultados del modelo Logit para compensación*

Variable	Coefficiente
Constante	-1.219 (0.144)
Pago	0.283 (0.043)
Log likelihood	- 15.241
Chi-cuadrada	4.942
Observaciones	26

*Valor del estadístico t entre paréntesis

Nuevamente, no se encontraron problemas en la comprensión del cuestionario.

Discusión

El procedimiento seguido en ambas estimaciones requiere cierto grado de certeza sobre la cantidad y tipo de daño así como del sistema de compensación. En la práctica, el análisis de equivalencia puede carecer en ocasiones de dicha certidumbre. En este sentido, los experimentos de elección podrían proporcionar mayor flexibilidad al ejercicio de equivalencia. Por otra parte, la estimación final corresponde a un cambio discreto, y en este sentido la valoración contingente parece

más apropiada que los modelos de elección, los cuales promocionan valores marginales que luego deben extrapolarse para obtener el valor del cambio discreto (Hanley et al., 1998; Hanley et al., 2001; Bateman et al., 2002; Alpizar et al., 2003).

En cualquier caso, el procedimiento descrito anteriormente, puede adaptarse a estimaciones de valores marginales, con variaciones tanto en el nivel del pago como en el nivel de cambio ambiental, utilizando el mismo formato en la pregunta de valoración. Los resultados podrían expresarse simultáneamente en términos de cambios del bien ambiental por unidad monetaria, o bien, en términos de cambios monetarios por unidad de bien ambiental.

Otra posibilidad sería una combinación de valores discretos y marginales. Ambas estimaciones podrían llevarse a cabo a través de la división de submuestras. De esta manera, los valores obtenidos en la estimación discreta podrían ajustarse por medio de valores marginales. Ello combinaría la precisión esperada de las estimaciones discretas de valoración contingente y la flexibilidad que con frecuencia requieren las aplicaciones de análisis de equivalencia. Esta aplicación queda pendiente para futura investigación.

Conclusiones

En algunos casos, como en análisis de equivalencia, el investigador podría estar interesado en estimar ambos valores, el del recurso natural dañado, o débito, y la cantidad mínima de mejora ambiental que compensaría el valor de las pérdidas, o crédito.

Este estudio propone una aproximación iterativa, donde inicialmente se usa el MVC tradicional para calcular el valor del daño, y después una variante del MVC para estimar la media o mediana de la mínima compensación requerida. La variante consiste en fijar la cantidad del pago y variar el nivel de calidad ambiental entre muestras. Las dos aplicaciones del MVC se basan en el modelo de la maximización de la utilidad aleatoria.

La aplicación de una encuesta piloto a la prevención de un incendio forestal y su posterior compensación muestran que esta aproximación secuencial es viable. El hecho de que para la persona que responde al cuestionario la pregunta de compensación sea similar a la de prevención del daño (¿pagaría X por Z?), facilita la aplicación y posterior cálculo de la mínima compensación requerida.

La aplicación para estimar el valor del débito con un programa de prevención de incendios para preservar un tercio de los bosques de *pinus nigra* en el centro de Cataluña, que podría incendiarse en los próximos 10 años, proporciona una media de alrededor de 70 euros anuales durante 10 años (en valores de 2007). Este valor de 70 euros por las pérdidas temporales se utilizó como cantidad de pago propuesta para los

cálculos del crédito. La media de la mínima compensación requerida consistió en la plantación de pinus nigra en superficies distintas a las del incendio, con una extensión equivalente a 52% de hectáreas respecto a la superficie incendiada (un tercio de bosque de pinus nigra en el centro de Cataluña). Es decir, cada hectárea incendiada, requeriría una hectárea de remediación primaria y aproximadamente media hectárea en compensación por las pérdidas temporales. Estos resultados son preliminares, ya que se han calculado con datos obtenidos de una aplicación piloto del caso de estudio.

Queda pendiente para futura investigación la implementación total de las entrevistas de este caso de estudio, y el uso de otros formatos de valoración e incluso de otros métodos. Asimismo, podría investigarse una combinación de estimaciones de valores discretos y marginales en el marco del análisis de equivalencia de valores.

Agradecimientos

Esta investigación se basa en el proyecto de investigación Métodos de Equivalencia de Recursos de la Evaluación de los Daños Ambientales de la Unión Europea (REMEDE). Los autores agradecen la financiación recibida de este proyecto y la contribución científica del resto de socios.

Referencias

- Adamowicz, W.; Louviere, J. 1998. Introduction to Attribute-Based Stated Choice Methods, Final Report to the Resource Valuation Branch of the NOAA Damage Assessment Center, Advanis.
- Alpizar, F.; Carlsson F.; Martinsson P. 2003. Using Choice Experiments for Non-Market Valuation. *Economic Issues* 8 (1): 83-110. , I. J.; Carson R. T.; Day, B.; Hanemann, W. M.; Hett, T.; Hanley, N.; Jones-Lee, M.; Loomes, G.; Mourato, S.; Ozdemiroglu, E.; Pearce, D. W.; Sugden, R.; Swanson, J. 2002. *Economic Valuation with Stated Preference Techniques: A Manual*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Bateman, I.J.; Langford I.H.; Turner R.K.; Willis, K.G.; Garrod, G.D. 1995. Elicitation and truncation effects in contingent valuation studies. *Ecological Economics* 12 (2): 161-179.
- Bishop, R.; Breefle, W.; Lazo, J.; Rowe, R.; Wytinck, S. 2000. Restoration scaling based on total value equivalency: Green Bay Natural Resource Damage Assessment, Final report. Report prepared by Stratus Consulting Inc. Boulder, CO.
- Carson, R.T. En prensa. *Contingent Valuation: A Comprehensive Bibliography and History*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Carson, R.T.; Mitchell, R.C.; Hanemann, M.; Kopp, R.; Presser, S.; Rud, P.A. 2003. Contingent Valuation and loss passive use: Damages from the Exxon Valdez oil spill. *Environmental and Resource Economics* 25 (3): 257-286.
- European Commission. 2006. Homepage for Environmental Liability. (Available at <http://europa.eu.int/comm/environment/liability/index.htm>)
- Hanemann, M. 1984. Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses. *American Journal of Agricultural Economics* 66 (3): 332-341.
- Hanley, N.; MacMillan, D.; Wright, R. E.; Bullock, C.; Simpson, I.; Parsisson D.; Crabtree, B. 1998. Contingent valuation versus choice experiments: estimating the benefits of environmentally sensitive areas in Scotland. *Journal of Agricultural Economics* 49 (1): 1-15.
- Hanley, N.; Mourato, S.; Wright, R. 2001. Choice modelling approaches: a superior alternative for environmental valuation? *Journal of Economic Surveys* 15 (3): 433-460.
- Mitchell, R.C.; Carson, R.T. 1989. *Using Surveys to Value Public Goods: the Contingent Valuation Method*. Resources for the Future, Washington, D.C.

Examen de los Sistemas de Detección de Incendios Existentes en Europa y en el Norte de África¹

M.C. Colaço², F. Rego², C. Montiel³, J. Solana², G. Herrero², D. Alexandrian⁴, B. Ubysz⁵, R. Szczygiel⁴, J. Piwnicki⁴, A. Sesbou⁶

Resumen

Con el fin de minimizar los daños asociados a los incendios forestales es crucial, en primer lugar, contar con una buena prevención. Cuando ésta falla, una detección rápida y precisa podría ayudar en un primer ataque seguido, si todo sale mal, de una fuerte supresión.

Esta ponencia presenta los primeros resultados de una investigación hecha en Europa, Marruecos y Túnez con relación a la detección de incendios, y que se envió al grupo de expertos en incendios de la Comunidad Europea. El presente trabajo se contextualiza en el proyecto europeo FIREPARADOX (FP6-018505), el cual tiene como objetivo inventariar, clasificar y analizar los sistemas de detección de incendios en Europa y en el norte de África, para desarrollar propuestas para mejorar su eficacia.

Como resultado, hemos visto que el sistema más común de detección de incendios continúa siendo la torre de vigilancia, seguida de las brigadas móviles. Los países que tienen más problemas con los incendios forestales recurren a la detección aérea.

España es el país que usa todos los recursos disponibles para detectar incendios forestales, y es el país que más dinero gasta en la detección.

El sistema de detección de incendios se basa particularmente en el empleo de trabajadores temporales, quienes son empleados solo durante la temporada de incendios. La mayoría de los países dan un adiestramiento específico a sus trabajadores, y las instituciones que ofrecen el adiestramiento son, generalmente, los servicios forestales y la protección civil.

Palabras claves: Brigada móvil, detección de incendios, Europa, nuevas tecnologías, torres de vigilancia.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² UTL, Instituto de Agronomía, Centro para la Ecología Aplicada Baeta Neves, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal. ccolaco@isa.utl.pt

³ Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Facultad de Geografía e Historia, Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid, España, crismont@ghis.ucm.es

⁴ MTDA, 298 avenue du Club hippique, 13090 Aix-en-Provence, France daniel.alexandrian@mtda.fr
⁵ Forest Research Institute, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Poland B.Ubysz@ibles.waw.pl

⁶ Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs, BP 511 Tabriquet, 1100 Salé, Maroc sesbou@menara.ma

Introducción

El área forestal europea cuenta con 1004 millones de ha, incluida la Federación Rusa (MCPFE, 2003). Una porción importante de estas tierras boscosas ha sido creada a través de actividades de reforestación llevadas a cabo durante el siglo XX, y desarrolladas conforme a políticas de conservación y protección ambiental. (FAO, 1995).

Aunque el fuego es un elemento común que ha estado siempre presente en las tierras silvestres, es en los países del sur de Europa y del norte de África donde los incendios forestales son el factor más dañino. Cada año, alrededor de la región del Mediterráneo, se queman de 300,000 a 5000,00 ha de bosques y otras tierras boscosas. (DGJRC, 2005).

Con el fin de minimizar los daños asociados a los incendios forestales, es crucial, ante todo, una buena prevención. Cuando la prevención de incendios falla, se deben seguir pasos de extinción de incendios, pero esto sólo puede suceder después de la detección. La detección de incendios se basa en una serie de actividades que persigue los siguientes objetivos: descubrir, localizar e informar al centro de comunicaciones. (Ruiz, 2000).

El análisis de los sistemas de detección de incendios en Europa y en el norte de África es uno de los objetivos del proyecto FIRE PARADOX, “Un acercamiento integrado e innovador al manejo de incendios que regula el problema de los incendios forestales mediante el sabio uso del fuego: la solución a la paradoja del fuego” (2006 al 2010). Se trata de un Proyecto Integrado, fundado por la Comisión Europea bajo el Sexto Programa Marco, que reúne a 31 socios (universidades, centros de investigación, organismos de manejo de incendios, redes internacionales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones no gubernamentales) de 13 países (Finlandia, Francia, Grecia, Alemania, Italia, Marruecos, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suiza, Túnez y el Reino Unido), coordinados por la Escuela de Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. (ISA/CEABN).

Esta ponencia tiene el objetivo de presentar cuáles son los sistemas de detección de incendios usados en Europa y en el norte de África, qué tipo de tecnologías se usan como sistemas de detección, y quiénes son los recursos humanos que trabajan en la detección y su adiestramiento específico.

Metodología

La herramienta principal para obtener la información requerida sobre la identificación y clasificación de las técnicas de detección de incendios fue una

encuesta mediante un cuestionario diseñado por el Grupo de Investigación Científica de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con los socios del FIRE PARADOX que participaron en la evaluación de las políticas y las prácticas del proyecto⁷.

En noviembre de 2006, el Instituto de Agronomía dirigió el cuestionario, a través de la Comisión Europea, a los miembros del Grupo de Expertos en Prevención de Incendios Forestales (WGFFP), un grupo de trabajo asociado al Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS) y establecido por el Joint Research Center de dicha comisión. (JRC). Este grupo de expertos está compuesto por peritos de las autoridades nacionales, nominados por los estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Puesto que se ocupan de los asuntos operacionales relacionados con la prevención y extinción de incendios forestales, estas personas tienen un conocimiento exhaustivo de los incendios forestales en sus países, y cuentan con acceso primario a las fuentes de información de dichos asuntos. Para los países del norte de África (Marruecos y Túnez) y otros estados miembros que no tienen ningún miembro representativo en el WGFFP, se les envió el cuestionario a quienes implantaban las políticas públicas mediante los socios que participaban en el proyecto FIRE PARADOX.

Las respuestas al cuestionario recibidas hasta Julio de 2007 incluyen doce países: Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Latvia, Lituania, Marruecos, Polonia, Portugal, España, Suecia y Túnez.

Para complementar las respuestas al cuestionario y para llevar a cabo un análisis más profundo en los países donde los incendios forestales constituyen un asunto importante, Portugal, Marruecos, España y Polonia elaboraron un estudio de caso para cada uno. Para los diferentes estudios de caso elaborados por cada uno de los socios, la metodología usada fue un análisis documental y entrevistas con los expertos en detección de incendios.

Resultados y Discusión

Los sistemas de detección de incendios pueden dividirse en tres grupos principales:

- Los sistemas de detección terrestre – estos incluyen la vigilancia fija en tierra (torres de vigilancia) y vigilancia móvil en tierra (brigadas móviles);
- detección aérea – helicópteros, aviones– ;
- nuevas tecnologías para la detección de incendios – cámaras infrarrojas y de

⁷ FIRE PARADOX Module 7 “Policies and practices assessment” partners: Instituto Superior de Agronomía (ISA/CEABN), European Forest Institute (EFI), Max Planck Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften (GFMC), Universidad de Lleida (UL-UFF), Institut National du Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) and Ministère de l’Agriculture, du développement Rural et des Pêches Maritimes (ENFI).

video, teledetección, detección por medio de láser, vehículos aéreos no operados (UAV's, por sus siglas en inglés), satélites.

Los resultados del cuestionario se enfocan en esta clasificación. De acuerdo con los resultados del cuestionario, Austria es el único país que no cuenta con ningún sistema de detección de incendios. Y esto se explica puesto que los incendios forestales no representan ningún problema en este país. En el año 2005, Austria tuvo 1759 incendios forestales con un área quemada total de 104 ha, y 954 incendios forestales con un total de 74 ha de tierra quemada. La mayoría de los incendios fueron menores a 1ha, y el evento de fuego más grande tuvo como resultado 5 ha de área quemada. (DGJRC 2005).

Los otros once países usan al menos uno de los sistemas de detección ya mencionados. El sistema de detección más común son las torres de vigilancia, usadas en 10 países (83%), seguido de las brigadas móviles, con ocho respuestas (67%). También en el campo de la detección terrestre, cinco países tienen programas de voluntarios que complementan la detección terrestre oficial.

Francia, Lituania, Polonia, Portugal y España usan detección con torres de vigilancia junto con vigilancia por medio de video. Esta tecnología continúa siendo algo costosa y existe una discusión internacional acerca de sus ventajas y desventajas (WFDW, 2006), lo cual podría explicar su uso en pocos países.

El empleo de aviones y helicópteros para la vigilancia aérea no es muy frecuente. Solo seis países usan aviones, y solo España usa helicópteros para dicha vigilancia.

Suecia es el único país que, aunque no utiliza sistemas de detección terrestre, utiliza aviones para acciones de vigilancia. Esta situación se debe a la reducción de la contribución del estado a la detección de incendios, junto con la ley de protección civil, donde se menciona que la responsabilidad de proteger los bosques es tarea de los propietarios de dichos bosques. Por consiguiente, los grandes propietarios o las municipalidades contratan aviones para cubrir áreas pequeñas.

Aunque los diferentes sistemas de detección se complementan mutuamente, solo cinco países usan tantos sistemas terrestres como aéreos. Como se presentó en la Tabla 1, observamos que España usa no solo torres de vigilancia sino, también, brigadas móviles, aviones y helicópteros. Portugal, Marruecos, Polonia y Francia utilizan los mismos sistemas, mas no los helicópteros. Esto se puede explicar por los numerosos incendios forestales y el área quemada en Portugal, España y Francia, y también por la extensión pertinente del área forestal que está en riesgo de grandes y medianos incendios. (DGJRC, 2005).

Aunque Polonia no pertenece al Mediterráneo, el peligro de riesgo de incendios ha aumentado en los últimos años, así como también han aumentado el número de incendios y de área quemada. (DGJRC, 2005).

Tabla 1 – *Distribución de sistemas de detección por países.*

País	Detección terrestre			Detección aérea	
	Torres de vigilancia	Brigadas móviles	Vigilancia mediante video	Aviones	Helicópteros
Bulgaria	x	x	-	-	-
Bulgaria	x	x	-	-	-
Chipre	x	x	x	x	-
Francia	x	-	-	-	-
Latvia	x	-	x	-	-
Lituania	x	x	-	x	-
Marruecos	x	x	x	x	-
Polonia	x	x	x	x	-
Portugal	x	x	x	x	x
España	-	-	-	x	-
Suecia	x	x	-	-	-

Detección Terrestre

Si se mira la Tabla 2, se muestra que el porcentaje de área boscosa en estos once países es muy diferente entre ellos, con un mínimo de 6% en el caso de Túnez, y un máximo de 61% en Suecia. Los países con mayor terreno boscoso son Suecia, España y Francia.

Tomando en consideración el número de torres de vigilancia y de terreno boscoso en cada país (Tabla 2), vemos que Chipre es el país que tiene la mayor cantidad de torres de vigilancia en cientos de hectáreas (0.161), seguido de Polonia, Latvia y Portugal, con 0.069, 0.063 y 0.062, respectivamente.

Si se toma en consideración la proporción de recursos humanos en cada torre de vigilancia, los números son muy variables, desde una persona por torre en Marruecos, hasta cuatro personas en Portugal. Todos los otros países que respondieron a esta pregunta tienen entre dos y dos personas y media por torre.

Tabla 2 – Relación entre área de tierra boscosa y la cantidad de torres de vigilancia.

País	Terreno boscoso (1000 ha) *	% Terreno boscoso*	Número de torres de vigilancia **	Número de torres de vigilancia / 1000 ha	Proporción de recursos humanos / torres de vigilancia**
Bulgaria	3625	33	90	0,025	-
Chipre	174	19	28	0,161	2,4
Francia	15554	28	645 ***	0,041	-
Latvia	2941	46	186	0,063	2
Lituania	2099	32	102	0,049	2
Marruecos	4364	10	130	0,030	1
Polonia	9192	29	637 ***	0,069	-
Portugal	3783	41	234	0,062	4
España	17915	35	741***	0,041	2,3
Suecia	27528	61	-	-	
Tunisia	1056	6	-	-	

* Fuente: FAO, Global Forest Resources Assessment 2005

** Fuente: Cuestionario FIREPARADOX Módulo 7.

*** Estudios de caso para FIREPARADOX

De acuerdo con las respuestas al cuestionario, la cantidad de brigadas móviles por país es aún más variable. El mínimo le corresponde a Chipre, que cuenta con 26 brigadas, Marruecos tiene 64, Bulgaria puede tener entre 80 y 150, Portugal tiene 389, y España tiene 551. Polonia y Francia son los países con mayor cantidad de brigadas móviles: 4213 y 1094 brigadas, respectivamente.

Estas brigadas constan de dos o tres elementos, dependiendo del país.

Detección aérea

Como se mencionó anteriormente, España usa no solo aviones sino helicópteros, también, para llevar a cabo la detección aérea. Portugal, Marruecos, Polonia y Francia utilizan solo aviones como medios aéreos.

Aunque Marruecos posee detección aérea, no se trata de un sistema de vigilancia aérea organizado para la detección de incendios forestales. Sin embargo, puesto que el bosque con mayor riesgo de incendios se encuentra cerca del corredor de navegación aérea que va a Europa (bosques Rif) y al Oriente Medio (el bosque Rif, y el Atlas medio y oriental), la Dirección de Aviación Civil concientiza a las compañías aéreas para que colaboren con la detección y la alerta de los incendios forestales.

Nuevas Tecnologías

El uso de nuevas tecnologías ha sido una de las exigencias de los guardabosques y técnicos que trabajan con los incendios forestales. (Colaço et ál. 2007). En los pasados años, se han realizado muchas investigaciones con respecto a este tema. No obstante, de los once países, solo España, Francia y Portugal utilizan ciertas tecnologías nuevas para complementar los medios tradicionales. Estas son:

- Vehículos de vigilancia y de primer ataque
- Modelos tridimensionales
- Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés)
- Fotografías panorámicas (sistema Ubifoc y sistema VIGIS)
- Cámara termográfica
- Cámara fotográfica y de grabación
- Vigilancia por medio de video
- Cámaras infrarrojas
- Asistentes personales digitales (PDA'S, por sus siglas en inglés) - comunicaciones de las alertas mediante sms (servicio de mensajes rápidos)
- Imágenes satelitales

Aunque solo Castilla y León (España) utilizan imágenes satelitales para hacer su predicción meteorológica y detectar los focos de incendios fuertes, otros países también informaron este sistema, pero para investigar el desarrollo de un incendio y para cuantificar las áreas quemadas.

Recursos humanos

Con el fin de entender la naturaleza de los recursos humanos que trabajan en estos sistemas, se le preguntó a cada país quién trabajaba en cada sistema de detección de incendios y la naturaleza de su contrato de empleo. (Tabla 3).

La Tabla 3 nos muestra cuán importantes son los trabajadores temporales para el funcionamiento de las torres de vigilancia. Todos los países que usan este sistema utilizan este tipo de trabajadores, y Portugal, España, Bulgaria y Francia los complementan con la ayuda de técnicos, los encargados de proteger la naturaleza o guardabosques.

Con respecto a las brigadas móviles, aunque varios países utilizan trabajadores temporales, estos también se complementan con los encargados de proteger la naturaleza, voluntarios, técnicos y empleados. Cuando se trabaja con vigilancia mediante video, existe una pequeña tendencia a que los recursos humanos sean más especializados. Por eso, son técnicos quienes desarrollan, predominantemente, el trabajo. A su vez, estos técnicos se complementan con trabajadores temporales o a los encargados de proteger la naturaleza.

Tabla 3 – Contrato de empleo para los sistemas de detección.

País	Detección terrestre			Detección aérea		Voluntarios
	Torres de vigilancia	Brigadas móviles	Video vigilancia	Aviones	Helicópteros	
Bulgaria	SW / T / NG	NG	-	-	-	X
Chipre	SW	SW / T	-	-	-	X
Francia	SW / T	SW / T / NG / V	T	SW / T	-	X
Latvia	SW	-	-	-	-	-
Lituania	SW	-	T	-	-	-
Marruecos	SW	Employees	-	Commercial airlines	-	-
Polonia	SW	T / NG	SW / T	T	-	-
Portugal	SW / NG	SW / NG	SW / NG	SW / T	-	X
España	SW / T / O	SW / T / NG / V / O	SW / T	SW / T / NG / M / O	SW / T / NG / M / O	X
Suecia	-	-	-	T	-	-
Tunisia	SW	SW / T	-	-	-	-

(SW – Trabajador estacional; T – Técnico; NG – Encargados de proteger a la naturaleza; O – otros; V – Voluntarios; M – Militares)

Ya que la vigilancia aérea es una vigilancia más costosa, solo se lleva a cabo en seis países que usan técnicos y trabajadores temporales o, en el caso de España, también se complementa con militares, los encargados de proteger la naturaleza y voluntarios.

Con respecto al adiestramiento específico que cada equipo de trabajadores recibe para llevar a cabo sus responsabilidades, casi todos los países, con excepción de Marruecos y Lituania, ofrecen adiestramiento. En la mayoría de los países, son las instituciones relacionadas con la protección del bosque o la protección civil las que lo ofrecen (Tabla 4).

Costos de detección

La existencia de varios sistemas de detección simultáneos puede ser muy costosa. Aunque hemos preguntado a todos los países cuánto dinero gastan en cada sistema de detección particular, las respuestas han sido muy escasas, y, para la mayoría de los países, los datos no estaban disponibles. Los países que contestaron a dicha pregunta fueron Portugal, España (solo algunas regiones autónomas), Latvia y Chipre.

Tabla 4 – Instituciones que ofrecen un adiestramiento específico por cada sistema de detección.

País	Detección terrestre			Detección aérea	
	Torres de vigilancia	Brigadas móviles	Video vigilancia	Aviones	Helicópteros
Bulgaria	Servicio forestal Estatal	Servicio forestal Estatal	-	-	-
Chipre	Servicio forestal Estatal	Servicio forestal Estatal	-	-	-
Francia	Ecole d'application de la sécurité civile de Gardanne et Office national des forêt	Ecole d'application de la sécurité civile de Gardanne et Office national des forêt	-	Ecole d'application de la sécurité civile de Gardanne	-
Latvia	Servicio Forestal Estatal	-	-	-	-
Lituania	No	-	No	-	-
Marruecos	No	No	-	No	-
Polonia	Distritos Forestales	Distritos Forestales	Distritos Forestales	Distritos Forestales	-
Portugal	Servicio Forestal Estatal, Guardia Nacional Republicana, Instituto de Conservación de la Naturaleza	Servicio Forestal Estatal, Guardia Nacional Republicana, Instituto de Conservación de la Naturaleza	Compañías de equipo privado	Servicio Forestal Estatal	-
España	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Suecia	-	-	-	La organización que provee los aviones ofrece una pequeña introducción como entrenamiento.	-
Tunisia	Protección civil	Protección civil	-	-	-

Los costos de la detección terrestre se muestran en la Tabla 5. Si se comparan los datos de las torres de vigilancia, vemos que Latvia es el país donde sale más económico tener una torre de vigilancia, y en España, más específicamente en la región de Valencia, es exactamente lo contrario.

En España, en la región de la Rioja, el uso de brigadas móviles es más costoso cuando se le compara con otras regiones y países. Pero también en España están las brigadas móviles más baratas, como en el caso de la comunidad de Castilla y León. Cuando se toma en consideración la detección aérea, solo Portugal y la comunidad de Castilla y León presentaron datos de la detección con aviones. Mientras que Portugal gastó unos cinco mil euros por avión, Castilla y León gastó doce veces más, es decir, sesenta y dos mil euros por avión. Esta enorme diferencia se puede explicar de alguna forma mediante el uso en España de cámaras infrarrojas para este tipo de vigilancia aérea, y Portugal solo usa el sistema de posicionamiento global (GPS) y una unidad de localización y comunicación (ULRA) (Germano 2007).

Tabla 5 – Costos asociados a la detección terrestre.

País	Torres de vigilancia (€) (€)	Nº de torres de vigilancia (€)	€ / LT (€)	Brigadas móviles (€)	Nº de brigadas móviles	€ / MB (€)
Chipre	1.000.000	28	35.714	700.000	26	26.923
Latvia	635.000	186	3.414			
Portugal	2.700.000	234	11.538			
Castilla y Leon (España)	2.172.114	174	12.483	7.518	27	278
La Rioja (España)	290.000	14	20.714	1.662.000	12	138.500
Madrid (España)	1.045.262	43	24.308	198.156	5	39.631
Valencia (España)	3.438.816	71	48.434	12.061.805	104	115.979

España es el único país que informa el uso de helicópteros para la detección de incendios. Madrid, Navarra y Valencia nos dieron las cifras para el uso de un helicóptero por temporada de incendios. La más costosa funciona en Navarra, con un costo de 450 mil euros, seguida de Valencia que gasta 386 mil euros, y de Madrid con 232 mil euros.

Portugal y Valencia también trabajan con voluntarios para la detección de incendios, y cada uno gasta 142 y 168 euros, respectivamente, por voluntario.

El uso de nuevas tecnologías ha sido cuantificado recientemente por la región de Castilla y León, donde el uso de satélites para la detección meteorológica y la detección de focos de incendios muy fuertes cuesta 36784 euros.

Tabla 6 – Costos de sistemas de detección por país y región autónoma de España.

País	Detección terrestre (€)	Detección aérea (€)	Otros (€)	Total (€)
Chipre	1.700.000	-		1.700.000
Latvia	635.000	-		635.000
Portugal	2.700.000	49.837	1.500.000	4.249.837
Castilla y León (España)	2.179.632	310.725	36.784	2.527.140
La Rioja (España)	1.952.000		1.645.000	3.597.000
Madrid (España)	1.243.418	232.100		1.475.518
Navarra (España)	No disponible	450.000		450.000
Valencia (España)	15.500.621	386.000	673.269	16.559.890

Con el fin de cuantificar la cantidad de dinero gastado por cada país en detección durante la temporada de incendios (Tabla 6), vemos que la región de Valencia es la que más dinero gasta. Dicha región gasta 37 veces más que su vecina, la región de Navarra, aunque los datos para dicha región no están completos. El país que gasta menos dinero en la detección de incendios es Latvia. En orden decreciente,

España es el país que más euros gasta en la detección de incendios, seguido de Portugal, Chipre y, en el último lugar, Latvia.

Observaciones finales

Luego de analizar todos los cuestionarios enviados por los once países, vemos que el sistema de detección de incendios más común continúa siendo las torres de vigilancia. Este sistema se complementa con las brigadas móviles que ayudan a cubrir las áreas de sombra que no fueron vistas por las torres.

Los países que tienen mayores problemas con los incendios forestales son los que utilizan la detección aérea.

España es el país que usa todos los recursos disponibles para detectar incendios forestales (detección terrestre y aérea, así como nuevas tecnologías), y también es el país que más dinero gasta en la detección de incendios.

El sistema de detección está basado, particularmente, en los trabajadores temporales, quienes son empleados durante la temporada de incendio. La mayoría de los países dan un adiestramiento específico a los recursos humanos, y las instituciones que prestan dicho adiestramiento son, en general, los servicios forestales y la protección civil.

Bibliografía

- Gibbs, K. 2006. Wildland Fire Detection Workshop – Discussion Notes. Net.
- Germano, A. 2007. Monitorização 2007. Direcção Geral Recursos Florestais.
- Directorate-General Joint Research Centre. 2005. Forest Fires in Europe 2005, European Communities 2006.
- FAO. 2005. Global Forest Resources Assessment. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- Colaço, M. C., Meira, P., Rego, F., 2007, Prevención de Incendios Forestales: Un estudio sobre la formación de los técnicos forestales in Investigaciones en Educación Ambiental. Naturaleza Y Parques Nacionales, Serie Educación Ambiental. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. España.
- Ruiz, E.M. 2000. Detección. In: Vélez, R. (Coord.). La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. Madrid, España: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.; pp. 17.1-17.15
- Madrid. European Commission. 2006. Forest Fires in Europe 2005, Directorate-General Joint Research Centre, European Communities, Italy.
- MCPFE Liaison Unit Vienna and UNECE/FAO. 2003. State of Europe's Forests 2003.

Análisis Regional de la Interfaz Urbano-Forestal en la Gestión del Riesgo de Incendio en España¹

Gema Herrero²

Resumen

Las áreas de transición entre masas forestales y espacios urbanizados (interfaz urbano-forestal, IU-F) están experimentando una creciente expansión en España, vinculada en muchos casos al deseo de un mayor acercamiento a los espacios naturales. Estas áreas de interfaz dan lugar a nuevos conflictos que afectan al manejo ambiental de dichos ámbitos y muy especialmente a la gestión del riesgo de incendios forestales.

La presencia de edificaciones residenciales en las zonas forestales introduce un elemento de riesgo mayor (posible pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas y otras infraestructuras) que se añade a los daños sufridos sobre las masas forestales. Como consecuencia, existe una necesidad de identificar los ámbitos de IU-F en el territorio y caracterizarlos en relación al riesgo de incendio forestal de cara a poder establecer un modelo de gestión del riesgo de incendios forestales eficaz, eficiente y adaptado a estas áreas.

Actualmente, existen varios métodos para clasificar interfaces basados en el análisis local de principalmente dos variables: los asentamientos de población y el tipo de cubierta vegetal. Sin embargo, los procesos de expansión de la IU-F son producto de dinámicas espaciales que tienen lugar a escala regional. En este contexto, el análisis de la planificación de los usos del suelo, los modelos de ordenación territorial y los instrumentos de planificación forestal son aspectos clave a la hora de caracterizar este tipo de áreas.

El objetivo del presente documento es la valoración de la situación actual del concepto de interfaz urbano-forestal en la normativa y los documentos de planificación en España. Este análisis es el primer paso de cara a la caracterización de estos espacios en el contexto territorial en el que se ubican y su evolución previsible. El objetivo final sería la identificación de posibles patrones territoriales que pueden influir en la gestión del riesgo de incendio forestal en las áreas de interfaz urbano-forestal.

Con este propósito, se plantea un análisis multiescalar y multisectorial que parte de un

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes. 29 de abril - 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico. Forma parte de la tesis doctoral de Gema Herrero Corral, desarrollada en el marco del Proyecto Integrado FIRE PARADOX “*An innovative approach of Integrated Wildland Fire Management Regulating the Wildfire Problem by the Wise use of Fire: solving the Fire Paradox*” (Sexto Programa Marco).

² Investigadora del Departamento de Geografía, facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria (Madrid) 28040. Grupo de Investigación UCM 930329 Política y Socioeconomía Forestal. geherrer@ghis.ucm.es

enfoque general de la situación de este tipo de áreas en España y una valoración a nivel autonómico.

Palabras clave: incendio forestal, España, ordenación del territorio, interfaz urbano-forestal.

1. Contextualización del problema

El concepto de interfaz urbano-forestal está cobrando cada vez mayor importancia superficial en España, en relación con un sistema de asentamientos con una marcada tendencia a la dispersión y que busca preferentemente zonas forestales de gran valor paisajístico. La ocupación creciente del medio natural por parte de la sociedad humana hace que la incidencia y consecuencias de fuegos forestales tengan tintes catastróficos, ejemplo de ello son los episodios de incendios sufridos los últimos veranos (Cataluña, 1998; Galicia, 2006).

La confluencia de zonas urbanizadas en terreno forestal da lugar a espacios especialmente conflictivos a la hora de planificar y gestionar los incendios forestales. Por un lado, la presencia de edificaciones residenciales en las zonas forestales aumenta la vulnerabilidad de los territorios ante la posible pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas y otras infraestructuras, además de los evidentes daños sobre las masas forestales. Por otro lado, el riesgo de que se produzca un incendio causado por negligencias o descuidos de personas, muchas veces ajenas a la realidad forestal, es mucho mayor.

Esta situación ha dado lugar a la necesidad de un tratamiento normativo de este tipo de espacios en relación al riesgo de incendio forestal y al establecimiento de una planificación preventiva. Sin embargo, la diversidad regional existente en España marca la necesidad de desarrollar la gestión de incendios forestales adaptándose a las necesidades y características concretas de cada territorio.

Con el objetivo de valorar hasta qué punto el contexto territorial de los espacios urbano-forestales es tenido en cuenta a la hora de planificar la gestión del riesgo de incendio en áreas urbanizadas, se presenta el análisis de los documentos normativos y de planificación más relevantes desde el punto de vista de la previsión, prevención y extinción de incendios forestales.

2. Metodología

El ámbito de estudio se centra en las Comunidades Autónomas del Estado Español. La situación particular de España, como país con una estructura político-administrativa descentralizada, establece una distribución competencial en materia forestal y de conservación de la naturaleza de acuerdo a la Constitución Española. En

este contexto, la mayor parte de las competencias para el desarrollo legislativo, la administración y gestión de los espacios forestales y naturales recaen en las Comunidades Autónomas; la Administración General del Estado mantiene la competencia para fijar el marco legislativo básico y los objetivos generales de política forestal, dentro de los cuales las Comunidades Autónomas desarrollan sus competencias. Esta situación de descentralización obliga a tener en cuenta en el análisis las directrices fijadas desde el nivel estatal, pero muy especialmente, las particularidades de la gestión de los incendios forestales en el nivel autonómico. Para el estudio, se ha tomado una muestra de Comunidades Autónomas³, que por su afección histórica de incendios así como por su desarrollo normativo, permiten hacer un análisis comparativo bastante completo sobre la situación en España.

Los incendios forestales son un tema complejo que abarca múltiples dimensiones debido a la incidencia de determinados factores ecológicos, socioeconómicos y políticos. En este sentido, políticas externas al sector forestal (políticas de conservación de la naturaleza, las referidas a agricultura y desarrollo rural, incluso la protección civil) pueden influir en el tratamiento preventivo del peligro de incendio forestal y en el comportamiento del fuego. Para el estudio concreto del riesgo de incendio en las zonas de interfaz urbano-forestal se han considerado los siguientes ámbitos de planificación:

- En primer lugar, la política forestal constituye el pilar básico sobre el que se apoyan todos los aspectos relacionados con la gestión y protección de los espacios forestales e incluye, aunque de forma muy general, el tratamiento de los incendios;
- dada la gran incidencia de incendios forestales en nuestro país, existe una amplia producción normativa y documentos de planificación específicos para la gestión de la lucha integrada contra los incendios forestales;
- la planificación de protección civil y emergencias establece los criterios a seguir en los casos concretos en que el incendio forestal amenaza la seguridad de las personas o bienes;
- por último, la ordenación del territorio y urbanística tienen la capacidad de influir de manera determinante en la planificación de los asentamientos, así como la regulación de las actividades y usos que pueden ocasionar incendios.

Las fuentes básicas de información a analizar son los textos normativos y los documentos de planificación correspondientes a las cuatro políticas territoriales identificadas (ver Anexo). Los objetivos específicos del análisis de los documentos han sido: (i) valorar la inclusión de estos nuevos espacios de interfaz y su definición por parte de los instrumentos legales y de planificación; (ii) estudiar las posibles actuaciones y medidas planteadas de cara a la gestión del riesgo de incendio forestal;

³ Andalucía, Cataluña, las Islas Canarias, Extremadura y Galicia.

y por último, (iii) identificar los vínculos existentes y los elementos de integración y coordinación entre las distintas políticas consideradas.

3. Definición del concepto y delimitación de la interfaz urbano-forestal

El concepto de IU-F, entendido como espacios de interacción hombre-monte no ligado a un aprovechamiento típicamente forestal o agrícola y que por sus características y localización pueden verse afectados por incendios forestales, se desarrolla principalmente en la legislación forestal y en la específica de incendios forestales, y subsidiariamente se adopta en otras planificaciones.

En general, la definición es muy amplia e imprecisa. La ley 10/2006 de Montes estatal se refiere a los espacios urbano-forestales como aquellos que incluyen “las urbanizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte que están situadas en terrenos forestales y en sus inmediaciones”; y queda en manos de las Comunidades Autónomas identificar con mayor precisión estos espacios, establecer las normas de seguridad necesarias, así como la regulación de actividades que puedan generar riesgo de incendio.

La normativa y documentos de planificación autonómica forestal apenas desarrollan una definición más allá de lo establecido en la Ley de Montes estatal. Sirve de ejemplo el caso de Galicia, donde cualquier núcleo de población o edificación que se ubique a menos de cuatrocientos metros del monte es objetivo para aplicar las medidas de prevención establecidas. En contraste, Cataluña ha aprobado una ley de incendios específica para zonas de IU-F donde se especifica que “las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana y que están situadas a menos de 500 metros de terrenos forestales, así como a las edificaciones e instalaciones aisladas en terrenos forestal, excluyendo a las edificaciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas” se verán afectados por medidas especiales de prevención.

De cara a establecer una correcta planificación y gestión de la defensa contra incendios forestales en las zonas de IU-F resulta imprescindible poder identificar geográficamente y delimitar estos espacios. Desde la ley de Montes estatal se introduce la figura de *Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal* definidas como “áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hacen necesarias medidas especiales de protección contra los incendios”. De acuerdo con esta definición, los espacios clasificados bajo esta categoría deberán contar con planes de defensa que, entre otros aspectos, regulen los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales. No obstante, esta definición legal no incluye los asentamientos de población como un

factor que justifique la importancia de los valores amenazados; por ello, deberán ser las Comunidades Autónomas las que profundicen y determinen qué espacios serán objeto de estas medidas especiales.

Generalmente, las Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal son delimitadas en base a variables meteorológicas, características de la masa forestal, topografía del terreno, y en determinados casos también se tiene en cuenta la frecuencia de incendios y su causalidad. En esta zonificación la variable humana no suele ser tenida en cuenta de forma directa. Sin embargo, la delimitación geográfica está evolucionando hacia la inclusión de nuevos parámetros de vulnerabilidad vinculados a la presencia de poblaciones y bienes potencialmente amenazados por incendios. La inclusión de los asentamientos y actividades humanas permitiría obtener una buena base de información para identificar espacios de IU-F y su posterior caracterización.

4. Actuaciones contempladas en los documentos normativos y de planificación

El grado de desarrollo de la planificación y gestión del riesgo de incendios forestales es variable en las distintas Comunidades Autónomas, y en gran medida, está en función de lo reciente de su normativa y del grado de incidencia que históricamente hayan tenido los incendios forestales en zonas pobladas (reacción ante episodios catastróficos).

De forma general, las alusiones a los nuevos territorios de IU-F son escasas en la normativa y documentos de planificación forestal, y en casi todos los casos se remiten casi de forma literal a lo establecido en la Ley de Montes del Estado. Dada la alta incidencia de incendios en España, todas las Comunidades Autónomas cuentan con normativa específica de incendios, y un gran número han aprobado planes de prevención y defensa frente a incendios forestales a parte de los correspondientes planes de protección civil. Las disposiciones relativas a la gestión del riesgo de incendio en la IU-F se tratan ampliamente en los documentos específicos de incendios forestales. Por otro lado, la política de ordenación territorial y urbanismo puede influir en la distribución de la población y las actividades a realizar en el territorio; de tal manera que un inadecuado planeamiento regional o urbano puede agravar los efectos negativos de los incendios forestales, mientras que una correcta organización del uso del espacio es capaz de minimizar los posibles daños.

El tipo de actuaciones identificadas en los textos correspondientes a los distintos sectores objeto de análisis se han agrupado en tres etapas en la gestión de incendios forestales: la previsión, la prevención y la extinción.

4.1 Medidas de previsión del riesgo de incendio

En la previsión de situaciones que puedan dar lugar a riesgo de incendio forestal cabe destacar el importante papel que juega la ordenación del territorio y la planificación urbanística. La ley 6/1998 del suelo Estatal y la posterior ley 8/2007 indican la necesidad de preservar de la urbanización aquellos espacios afectados por riesgos naturales según lo establezca la legislación sectorial. Las legislaciones autonómicas incorporaron este precepto y lo han desarrollado, remitiendo la responsabilidad de su clasificación a la planificación territorial de escala regional/subregional o directamente al planeamiento urbanístico de escala local.

La consideración de los diferentes riesgos naturales por parte de los instrumentos de ordenación no es homogénea. Mientras que determinados riesgos, como el de inundabilidad o el de erosión, siempre son tenidos en cuenta, los incendios forestales no siempre aparecen, incluso en zonas con una fuerte incidencia de este tipo de sucesos.

El tratamiento de los incendios forestales desde la planificación territorial parte de dos principios de actuación:

- La voluntad de incorporar objetivos de sostenibilidad, que se traducen en favorecer un uso prudente y racional del territorio, mediante la aplicación del principio de protección preventiva establecido en la normativa.
- La incorporación de las cartografías del riesgo definidas desde la planificación sectorial (aguas, protección civil, incendios forestales, etc.) como instrumento para la regulación de usos y actividades en el territorio.

El desarrollo de estos principios en los planes territoriales da lugar a un cierto desajuste entre la importancia otorgada a los incendios forestales en los capítulos de análisis y diagnóstico, incluso en la definición de objetivos y criterios de gestión territorial, y la escasa eficacia de la ordenación planteada. En general, existe un claro predominio de los instrumentos de ordenación meramente indicativos frente a la necesidad de determinaciones vinculantes.

De cara a poder realizar una correcta ordenación y planificación de los espacios (regulación de usos y actividades que pueden desarrollarse sobre los mismos) es necesario definir y delimitar cartográficamente el territorio sujeto a riesgo. En el caso de los incendios forestales, la zonificación corresponde a la Administración forestal, y sólo subsidiariamente a la ordenación territorial. Por este motivo, la cartografía que se elabora tiene una finalidad distinta a la de ordenación territorial, y se ajusta a las necesidades de prevención (actuaciones sobre las masas forestales, reacción de infraestructuras...) y extinción de incendios (asignación de recursos), pero no expresamente a la definición de un modelo territorial que tenga en cuenta el riesgo de incendios forestales.

En la mayoría de los casos, la zonificación del riesgo de incendio forestal se

basa en la probabilidad de ignición y propagación del fuego, y no siempre incluye un análisis completo de la vulnerabilidad de l espacio, que suele quedar restringida a l aafección que el incendio pueda tener sobre la masa forestal. La Comunidad de Castilla-La Mancha calcula el índice de vulnerabilidad únicamente en base al valor de las cubiertas forestales. En la Comunidad Valenciana, debido a su especial configuración “hace prácticamente inviable un análisis de vulnerabilidad a nivel global que contemple aspectos como: la vida y la seguridad de las personas; valores de protección de infraestructuras, instalaciones y zonas habitadas” para elaborar el mapa de riesgo autonómico.

Una interesante novedad al respecto es la introducida por el Plan de Prevención y Defensa frente a incendios forestal de Galicia de 2007. La zonificación del territorio gallego es resultado de la integración el riesgo de incendio y de distintos tipos de vulnerabilidad del territorio. En el cálculo del índice de vulnerabilidad no sólo se tiene en cuenta el grado de daño que pueda sufrir el sistema forestal, sino que además incluye la vulnerabilidad poblacional y la del suelo. La *vulnerabilidad poblacional* queda definida como la fragilidad de una población determinada ante un posible incendio forestal, y para su cálculo se utilizan indicadores como: la presencia de habitantes por km²; presencia de núcleos de población; porcentaje de personas mayores de 65 años; y la distancia de los núcleos urbanos a la superficie forestal.

La mayoría de las regiones no siempre tiene en cuenta la existencia de IU-F para la zonación del riesgo de incendio y de forma inversa, el riesgo de incendio tampoco prima a la hora de establecer nuevos desarrollos urbanísticos. Sin embargo, la existencia de zonas urbanizadas dentro una *Zona de Alto Riesgo de Incendio* influye a la hora de fijar las correspondientes medidas de prevención del plan de defensa.

4.2 Medidas de prevención de incendio forestal

La gestión frente al riesgo de incendio en la IU-F, en la normativa y documentos de planificación autonómicos, se centra principalmente en la adopción de medidas preventivas, planteadas desde dos puntos de vista: (i) Los espacios de interfaz como espacios vulnerables y, que por sus características especiales, son sensibles a la afección de incendios. En este sentido, los documentos autonómicos plantean la necesidad de desarrollar actuaciones para proteger las personas y bienes de los incendios. Por otro lado (ii), las áreas de IU-F también se identifican como territorios de riesgo cuya existencia y actividades asociadas son potencialmente generadoras de incendios forestales. Desde este punto de vista, las medidas a adoptar van encaminadas a evitar la ignición y posible propagación de incendios desde las zonas urbanizadas hacia las masas forestales.

La forma concreta en que se hacen efectivas estas medidas depende de cada región, y aunque generalmente las medidas se orientan en la misma línea de

actuación, existe una cierta variabilidad a la hora de llevarlas a cabo entre unas y otras Comunidades Autónomas. Las principales medidas para la prevención de incendios en las áreas de IU-F pueden resumirse en:

- a) *Gestión de combustible en torno a las edificaciones situadas en terreno forestal o en su área de influencia.* Generalmente, se trata de la creación de una faja de seguridad rodeando las viviendas que deberá estar limpia de vegetación seca. La anchura de dicha franja varía desde los 15m en Andalucía y Canarias, 25 m. en Cataluña y 80m. en Extremadura. En Galicia, además se evitarán determinadas especies vegetales que por sus características favorecen la propagación del fuego.
- b) *Creación y mantenimiento de adecuadas infraestructuras preventivas.* Las zonas urbanizadas en terreno forestal deberán disponer de suficientes puntos de agua y en determinados casos, de una red de hidrantes homologada (Cataluña). Además, los viales de acceso y las cunetas estarán limpios de vegetación seca. La interconexión de viales entorno a los núcleos de población, así como disponer de accesos adecuados a los servicios de extinción son otros de los requisitos.
- c) En contadas ocasiones se hace referencia a medidas especiales relativas a *la resistencia del edificio al paso del fuego*, debido a que los materiales empleados en España para la construcción (piedra, ladrillo) no suelen ser inflamables.
- d) *Sensibilización e información* a la población que vive en zonas de IU-F. En los documentos de planificación y textos normativos no se han encontrado referencias a protocolos de actuación específicos para la población residente en área forestal.
- e) La elaboración de *planes de prevención para áreas de interfaz urbano-forestal*. Extremadura plantea la aprobación de *planes periurbanos de prevención* municipales donde se contemplan medidas concretas de prevención en los entornos urbanos. El alcance de las acciones depende de la ubicación del núcleo de población, dentro o fuera de Zonas de Alto Riesgo de incendio.
- f) Con el objetivo de evitar el inicio de fuegos con origen en las áreas habitadas que puedan propagarse a espacios forestales, se *controlan y regulan las actividades* susceptibles de poder provocarlos (Fiestas locales: romerías, ferias; lanzamiento de cohetes) especialmente en épocas de peligro alto⁴.

Los responsables de llevar a cabo las medidas de gestión de combustibles y mantenimiento de infraestructuras preventivas suelen ser los propietarios; no obstante, se plantea la ejecución subsidiaria por parte de los Ayuntamientos en caso de que no se cumplan las obligaciones. Una novedad es la legislación Catalana, que prevé ayudas para el desarrollo de determinadas acciones preventivas obligatorias.

⁴ Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura.

4.3 Planificación de la extinción

Los espacios de IU-F juegan un papel crucial en la extinción de incendios forestales. La presencia de residencias en zona forestal puede obligar a los servicios de extinción a tomar decisiones comprometidas en defensa de la población. En este sentido, se prioriza la protección de las vidas humanas frente a la extinción del incendio en el espacio forestal, que en muchas ocasiones escapa al control de los medios de extinción, y se convierte en un incendio que afecta a grandes superficies forestales. Además, la gestión de un incendio en este tipo de espacios, en los que personas, bienes y espacios forestales se encuentran amenazados a un mismo tiempo, exige una formación, técnicas y herramientas específicas.

Los incendios forestales en su conjunto son considerados como un riesgo que debe ser incluido dentro del ámbito de la Protección Civil debido a las situaciones de grave riesgo o catástrofe pública que se pueden originar. Es más, la Norma Básica de Protección Civil determina la necesidad de que los incendios forestales sean tratados dentro de planes especiales. En este sentido, los *Planes de Emergencia por Incendio Forestal* vinculan directamente la protección de bienes y personas con el riesgo de incendio.

De forma general, en la legislación y planificación de protección civil se contemplan las actuaciones a realizar llegado el momento de la emergencia para asegurar la protección de las personas y bienes, procurando una actuación coordinada de los distintos medios participantes en la extinción. Por lo tanto, no suelen incluir acciones preventivas ni actuaciones posteriores al incendio.

La planificación de la defensa en IU-F ante un episodio de incendio viene determinada por la elaboración de *Planes de Autoprotección* que tienen como objetivo establecer las actuaciones a desarrollar en caso de emergencia por incendio forestal en espacios poblados (urbanizaciones, núcleos de población aislada, campings, empresas) situados en zonas de riesgo. Una vez más, contar con una correcta zonificación del territorio en función del riesgo de incendio y vulnerabilidad del espacio es fundamental para organizar la extinción.

Las Comunidades Autónomas han adoptado las disposiciones que establece la normativa estatal al respecto y todos los planes autonómicos de emergencia por incendio forestal incluyen la elaboración de planes de autoprotección que se integran en la planificación de ámbito superior y deberán estar homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. Los contenidos de los planes de autoprotección son similares en las distintas regiones españolas: complementan las acciones de vigilancia y detección; organizan los medios materiales y humanos propios; preparan la intervención de ayudas exteriores; establecen las medidas de protección y evacuación de personas; también pueden incluir acciones informativas para que la población adquiera conciencia sobre los riesgos que puede sufrir, al

tiempo que les permita conocer las medidas de protección que, en su caso, deba utilizar.

5. Integración de la gestión de incendios en los distintos ámbitos sectoriales

El tratamiento de los incendios forestales en las zonas de interfaz urbano-forestal integra la gestión de las áreas urbanas y del terreno forestal, la prevención de incendios y la protección civil. Ante este nuevo escenario, la vinculación y coordinación entre las distintas políticas y administraciones implicadas es clave de cara a la gestión de incendios forestales. En este sentido, la ordenación territorial se presenta como el marco ideal para integrar las consideraciones que derivan desde las distintas normativas implicadas en la gestión del riesgo de incendios forestales.

En esta línea se posiciona la normativa sobre incendios forestales de Galicia, reconociendo la necesidad de que la “política de defensa del medio rural contra los incendios no sea implementada de forma aislada, sino integrándose en un contexto más amplio de planificación del territorio y desarrollo rural”. Andalucía desarrolla una visión integrada de los riesgos a nivel regional en el Plan de Ordenación del Territorio autonómico. El *Sistema Regional de Protección del Territorio* diagnostica las causas subyacentes a la aparición y propagación del fuego y establece unos criterios territoriales que deberán ser desarrollados por parte de los planes de ordenación de ámbito subregional y municipal. Estos criterios determinan:

- La identificación de áreas con alto riesgo de incendio y la incorporación de las determinaciones necesarias derivadas de la Protección Civil y planificación forestal.

- La minimización del riesgo de incendios mediante la ordenación de usos, valorando la implantación de actividades que puedan implicar un incremento de las probabilidades de incendios en áreas especialmente sensibles.

- Los planes de ordenación subregional y municipal incluirán la implantación de infraestructuras y equipamientos para prevenir los incendios y servir de apoyo a los equipos de extinción.

Sin embargo, los planes subregionales finalmente se limitan a reproducir los preceptos procedentes de la legislación forestal y de incendios, sin establecer determinaciones vinculantes.

En el resto de regiones analizadas, la normativa forestal y propiamente de incendios únicamente subraya la necesidad de que la planificación urbanística se adapte a los requerimientos marcados desde la política sectorial específica de incendios para reducir el peligro de incendio en las zonas de IU- F. Cabe destacar la Comunidad Autónoma de Cataluña cuyo Plan Forestal (2007) vincula el riesgo de incendio forestal con la planificación urbanística, obligando a las urbanizaciones

aisladas en terreno forestal a desarrollar las medidas de prevención de incendios contempladas en la legislación de incendios. Además, los planes parciales que se aprueben en terreno forestal deberán incluir las adecuadas medidas de prevención y extinción de incendios forestales sobre la futura área urbanizada.

6. Conclusiones

- El concepto de interfaz urbano-forestal está recogido en los documentos normativos y de planificación autonómicos. Sin embargo, la falta de una definición clara y concisa de los espacios que serán considerados como “interfaz urbano-forestal” es una carencia importante de cara a la gestión del riesgo de incendio forestal vinculado a las áreas urbanizadas. Esta situación da lugar a un tratamiento genérico de los espacios que, dadas las diferencias regionales existentes en España, necesitan de una planificación adaptada a las características específicas del territorio. En este sentido, se identifica una urgente necesidad de caracterizar correctamente estos espacios y aplicar unas medidas de prevención y lucha adaptadas al contexto ecológico y socioeconómico regional existente en cada caso.

- De forma general, la legislación identifica la IU-F como espacios vulnerables a la afección de incendios forestales. Por este motivo, la mayor parte de las medidas contempladas al respecto van dirigidas a la prevención y la protección de bienes y personas. Sin embargo, hay que subrayar el papel que juegan como territorios susceptibles de ser origen de incendios forestales, y por lo tanto, la necesidad de establecer una regulación de actividades y usos.

- La normativa forestal, de incendios y de protección civil regulan las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo en los espacios urbanizados en contacto con masas forestales. Sin embargo, también es necesario prestar especial atención a los futuros desarrollos urbanísticos. Corresponde a la ordenación territorial y planificación urbanística prevenir y evitar situaciones de peligro, a través de la declaración como no urbanizable de los ámbitos sujetos a riesgo de incendio forestal o integrando las medidas de prevención necesarias en las futuras edificaciones.

- Los objetivos de zonificación del territorio frente al riesgo de incendio forestal no suelen incluir la existencia de IU-F, sino que se basan en la protección de los espacios forestales frente al fuego. Ante la aparición de nuevos espacios donde se integra espacio forestal y urbano, es necesario un replanteamiento de las variables incluidas en el análisis del riesgo y realizar una zonificación del territorio útil para adoptar medidas de prevención adecuadas y planificación urbanística.

- La gestión de incendios en la IU-F recibe un tratamiento muy similar en las distintas regiones analizadas. No obstante, se observa como aquellas regiones que han sufrido importantes tragedias relacionadas con incendios forestales en zonas

habitadas (Galicia o Cataluña) cuentan con normativa que incorpora estos nuevos territorios y establece medidas concretas para su defensa.

Referencias

- Antrop, M. 2004. **Landscape change and the urbanization process in Europe**. Landscape and urban planning 67: 9-26.
- García, A.; Carrascal, J. 2007. **Planes periurbanos de prevención de incendios forestales en la interfaz urbano forestal en la Comunidad Autónoma de Extremadura**. Libro de Resúmenes de la IV Conferencia Internacional sobre incendios forestales, Sevilla, España, 13-18 May 2007.
- Radeloff, V. C.; Hammer, R.B.; Stewart, S.I.; Fried, J.F.; Holcomb, S.S.; McKeefry, J.F. 2005. **The wildland-urban interface in the United States**. Ecological Applications 15 (3): 799-805.
- Vince, S.W.; Duryea, M.L.; Macie, E. A.; Hermansen, L.A. (ed.). 2005. **Forests at the wildland-urban interface: conservation and management**. Boca Raton: CRC Press; 293 p.

Anexo: Documentos normativos y de planificación

Estatat	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 43/2003 de Montes y su modificación en 2006. • Directriz básica de planificación de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales.
Andalucía	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 5/1999 de prevención y lucha contra los incendios forestales. • Decreto 247/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. • Adecuación del Plan Forestal Andaluz (2003). • Plan de Incendios Forestales de Andalucía. • Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Canarias	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 146/2001 de prevención y extinción de incendios forestales. • Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales. • Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.
Cataluña	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 5/2003 y Decreto 123/2005 de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana. • Plan forestal de Cataluña (2007-2016). • Plan especial por incendios forestales de Cataluña.
Galicia	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 3/2007 de prevención y defensa contra incendios forestales. • Plan de Prevención y Defensa contra los incendios forestales de Galicia. • Plan básico de lucha contra incendios forestales.
Extremadura	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 5/2004 de Prevención y Lucha contra incendios forestales. • Decreto 86/ 2006 de aprobación del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. • Decreto 123/2005 por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. • Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Usos Responsables del Fuego en el Manejo de los Incendios Forestales: Una Visión General de la Situación Europea¹

A. Lázaro²

Resumen

En la historia del uso de las tierras en Europa, el fuego ha sido un elemento importante en la silvicultura, la agricultura y el pastoreo, y un proceso importante en la formación de los patrones de paisaje de alta diversidad ecológica y cultural. Sin embargo, las crisis que surgieron en las zonas rurales durante la segunda mitad del siglo XX causaron que se perdiera la noción del fuego como una herramienta útil y que se considerara, en vez, una amenaza. El resultado de esto fue la eliminación total de las prácticas tradicionales de quema en algunas zonas. En el presente, existen nuevas oportunidades y retos al desarrollo del uso del fuego para propósitos de manejo en Europa. La meta de este trabajo es presentar una aproximación inicial al desarrollo de la quema prescrita (QP) y el fuego de supresión (FS) en Europa.

Palabras clave: Europa, manejo del fuego, prácticas, quema prescrita, fuego de supresión.

1. Introducción

El fuego puede ser una fuerza destructiva y, a la inversa, ser un componente natural y vital en la ecología así como una herramienta útil para mejorar las vidas de las personas. También puede ser cosas al mismo tiempo. Estos son los dos rostros del fuego, un asunto de mucho interés en la actualidad debido a los cambios en paradigmas en la ecología y en la conservación de la naturaleza. Su dimensión internacional se ha hecho evidente en foros tales como la 4^a Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (Sevilla, mayo 2007), mediante el reconocimiento del papel crucial del fuego dentro del marco conceptual abarcador de la Estrategia para Mejorar la Cooperación Internacional en el Manejo del Fuego y sus Directrices de Carácter Voluntario³.

Sin embargo, la paradoja del fuego no ha alcanzado el mismo desarrollo en todas partes del mundo, ni tiene las mismas características. Los cambios a largo

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes; 29 de abril - 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico. Esta investigación es parte de la tesis doctoral del autor, desarrollada en el marco de FIRE PARADOX, un Proyecto Integrado de la UE (Sexto Programa Marco, Subprioridad 6.3, Cambio Global y Ecosistemas).

² Investigador, Grupo de Investigación UCM 930329, Política y Socioeconomía Forestal, Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Facultad de Geografía e Historia, Ciudad Universitaria (Madrid) 28040 (correo electrónico: alazarog@ghis.ucm.es).

³ Estrategia de Manejo del Fuego, <http://www.fao.org/forestry/site/firemanagementstrategy/es/>.

plazo en la vegetación, ocasionados por la exclusión del fuego, así como los costos elevados de la extinción de incendios, motivaron el uso de la QP para el manejo de combustibles y propósitos ecológicos en Estados Unidos, Australia y Canadá, donde se ha reconocido la necesidad de enfocarse en el tema central del fuego en el manejo de los terrenos en vez de en la extinción de incendios⁴. Por lo tanto, la introducción de las prácticas de QP se deriva en su mayoría del papel funcional que el fuego natural ha desempeñado en los ecosistemas a través de regímenes de fuego históricos y contemporáneos.

En Europa, esta paradoja del fuego se presenta como herramienta que sustituye los sistemas tradicionales de uso y manejo de terrenos, y, por lo tanto, debe ser aplicada a paisajes culturales más que a ecosistemas de fuego. Veinticinco años después de su introducción, la implementación operacional del fuego como herramienta de manejo sigue siendo muy limitada debido a diferentes tipos de restricciones (i.e. prohibiciones de fuego, estructura del terreno, falta de experiencia profesional y percepción negativa del público) (Xanthopoulos et al, 2006). No obstante, existen nuevas oportunidades y retos al uso del fuego para propósitos de manejo en Europa. Por una parte, en cuanto al manejo de los incendios forestales, particularmente en los países mediterráneos, el creciente riesgo de incendios forestales de alta intensidad y la imposibilidad de continuar aumentando los esfuerzos de extinción a unos costos económicos muy altos requieren nuevos enfoques para mejorar las estrategias de prevención y extinción⁵. Por otra parte, los rápidos cambios socioeconómicos que han ocurrido en las últimas décadas han resultado en el abandono de las prácticas tradicionales que han formado muchos paisajes y ecosistemas valiosos; una situación que está llevando a reconsiderar las políticas de exclusión del fuego en ciertos sectores del conservacionismo, de la ciencia forestal y del manejo de paisajes (Goldammer et al, 2007).

La meta de este trabajo es presentar una aproximación inicial al desarrollo de la quema prescrita (QP) y el fuego de supresión (FS) en Europa, para demostrar la diversidad existente en las prácticas de uso del fuego dentro del continente, así como para inferir posibles patrones temporales y espaciales para su desarrollo en el tiempo y en el espacio. Para este propósito, se elaboró un resumen de las prácticas del uso del fuego a nivel nacional y regional para diferentes estados miembros de la UE, tomando en cuenta un enfoque original, basado no solamente en los objetivos para el uso del fuego, sino también en la

⁴ Autoevaluación, conclusiones y recomendaciones de la *Sesión Regional: Australasia y Norte América*, celebrada en la 4ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (Sevilla, España, 2007)

⁵ Autoevaluación, conclusiones y recomendaciones de la *Sesión Regional: Europa, Norte de África y Cáucaso*, celebrada en la 4ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (Sevilla, España, 2007)

importancia del grado de estandarización. Los resultados obtenidos han sido desarrollados dentro de FIRE PARADOX⁶, un Proyecto Integrado Europeo que forma parte del 6^{to} Programa Marco (2006-2010).

2. Métodos

La fuente principal de información para aproximarnos a la diversidad de la QP y el FS en Europa es un cuestionario diseñado dentro del proyecto FIRE PARADOX, mediante el cual se recopilaban datos cualitativos sobre las prácticas de uso del fuego referentes a cada país y georeferenciados a una escala regional⁷, en una hoja de Excel estructurada en tres categorías de prácticas de uso del fuego:

- i) Prácticas tradicionales de quema: los usos actuales y las referencias históricas.
- ii) Quema Prescrita: los propósitos de manejo, el personal que participa en estas tareas, el papel de la QP para la prevención de incendios forestales, las ventajas y desventajas de utilizar la quema prescrita como herramienta de manejo en su país o región.
- iii) Fuego de supresión: técnicas, el papel del FS en la extinción de los incendios forestales, las ventajas y desventajas de utilizar el fuego de supresión como herramienta para combatir los incendios forestales en su país o región.

Para lograr estos objetivos, el cuestionario fue dirigido a los estados miembros de la UE, mediante la Comisión Europea, a los miembros del Working Group of Forest Fire Prevención Experts⁸ (WGFFP), un grupo de trabajo informal compuesto por expertos de las autoridades nacionales nominados por los estados miembros de la UE y la Comisión Europea, quienes trabajan principalmente en asuntos operacionales relacionados con la prevención y extinción de incendios forestales en sus países⁹.

Además, la información recopilada en el cuestionario fue complementada por medio de una extensa búsqueda en bases de datos bibliográficas, revistas científicas de mucha influencia, redes de expertos, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, proyectos de investigación científica internacionales y europeos, la legislación nacional/regional y de la UE, e instrumentos de política pública.

Una vez se obtuvo la información, las prácticas existentes de QP y FS relacionadas a los estados miembros de la UE fueron clasificadas mediante su

⁶ Para más información, ver la página Web: <http://www.fireparadox.org>.

⁷ Para este propósito, se utilizaron las unidades territoriales establecidas por la comunidad europea (NUTS) en la escala NUTS3 (NUTS 2 en el caso de Holanda, Bélgica y Alemania).

⁸ Para más información, ver la página Web: <http://ec.Europa.UE/environment/forests/wgffp.htm>.

⁹ Las respuestas al cuestionario recibidas hasta la fecha corresponden a los siguientes países: Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, España y Suecia. En el caso de Alemania, aunque no recibió el cuestionario completo, envió una respuesta parcial que ha permitido incluir información pertinente de este país en la evaluación.

incorporación a una matriz en donde se consideraron dos criterios principales de clasificación (Ver Fig 1). El primer criterio de clasificación se refiere a los **objetivos para el uso del fuego (C1)**, que incluyen los siguientes: (1) la reducción de la incidencia e intensidad de los incendios forestales, (2) la silvicultura, (3) la conservación de la naturaleza, (4) las actividades rurales (esto es, agricultura, mejoras en el pastoreo de animales) y (5) otros (esto es, mantenimiento del paisaje, mejoras en el acceso, mejoras en los hábitats para la caza).

La segunda clasificación de criterios, el **grado de estandarización (C2)**, requiere que se consideren tres niveles:

- *Prácticas tradicionales*: desarrolladas por la población rural, sin ninguna intervención o regulación técnica y administrativa.
- *Prácticas renovadas o innovadoras*: reguladas y desarrolladas por los servicios de protección forestales o civiles, con la posible intervención o asistencia de profesionales. Estas podrían llevarse a cabo con el propósito de incorporar nuevos objetivos y/o técnicas de la QP en el manejo de los bosques o como instrumento para lidiar con las quemas clandestinas.
- *Prácticas experimentales*: pruebas realizadas por gobiernos nacionales o regionales, o instituciones científicas.

Figura 1—Elementos centrales y factores influyentes en las prácticas de uso del fuego. Autor: A. LÁZARO (UCM, 2007)

Finalmente, para ilustrar los diferentes patrones observados en el desarrollo de las prácticas de QP y FS en Europa, se elaboró el cartografiado de las prácticas de uso del fuego a nivel regional para el UE 27 (+ Suiza), tomando como escala de referencia la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS), establecida por la Unión Europea¹⁰. La base cartográfica que se utilizó fue la capa

¹⁰ La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) provee un solo desglose uniforme de unidades territoriales para la producción de estadísticas regionales en la Unión Europea. Ver http://ec.Europa.UE/UErostat/ramon/nuts/home_regions_en.html.

vectorial para los límites administrativos NUTS 3 para Europa (formato shapefile), uniendo las unidades NUTS 3 correspondientes para aquellos casos en los que es necesario emplear los niveles NUTS2 (Bélgica, los Países Bajos y Alemania). La capa mencionada corresponde a una escala 1: 3.000.000, y fue gentilmente provista por la Comisión Europea — Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT).

3. Resultados

3.1. El análisis comparativo de las prácticas de uso del fuego en países europeos

La información recopilada mediante el cuestionario y el examen bibliográfico complementario se sintetiza más adelante en una evaluación comparativa de las prácticas de uso del fuego para los países europeos analizada en el documento. En particular, el análisis se enfoca en la situación actual del uso del fuego en actividades rurales tradicionales y el desarrollo de las técnicas de quema prescrita y fuego de supresión en cada país, con énfasis en: i) los objetivos de su uso, ii) el alcance del desarrollo en el país, y iii) el grado de estandarización.

Austria

En cuanto a la QP, el uso del fuego para propósitos de manejo no es una técnica que se utiliza en este país. Sin embargo, varios organismos e institutos científicos austríacos han demostrado interés en el uso de la quema prescrita, pero todavía no la han practicado. En el caso del FS, el fuego no se usa como técnica para la extinción de incendios forestales.

Bulgaria

El uso del fuego para propósitos agrícolas y mejoras al pastoreo tiene una larga tradición en este país. Aunque actualmente está prohibido, la gente continúa usándolo como la manera más barata y tradicional de limpiar sus tierras. Sin embargo, no se practica el uso de la QP para diferentes propósitos de manejo. En la extinción de incendios forestales, se utilizan las técnicas de contrafuego y quema de ensanche.

Chipre

Los agricultores han utilizado tradicionalmente el fuego para quemar el retamo espinoso y las cepas con el fin de limpiar y preparar sus tierras para propósitos agrícolas. No obstante, la estructura de las zonas arboladas y los terrenos agrícolas no favorece el uso de la QP como herramienta de manejo. En casos excepcionales, el Departamento de Bosques aplica fuego prescrito en zonas adyacentes a los Bosques Estatales sólo para reducir el riesgo de incendios forestales. Desde el 1960, se han utilizado las técnicas de contrafuego y quema de ensanche para la extinción de incendios.

Francia

El fuego es una herramienta antigua en las zonas montañosas y la región mediterránea de Francia, utilizado para mejoras al pastoreo, manejo de humedales y mejoras a los hábitats para la caza. El uso del fuego en la extinción también es una tradición establecida en algunas zonas de la región mediterránea, en donde comunidades locales utilizan contrafuegos para proteger sus bienes de algún incendio forestal.

La QP se utiliza como herramienta para varios propósitos de manejo: el manejo de combustibles, las mejoras a los hábitats, el facilitar el pastoreo, el mantenimiento del paisaje y el manejo de los humedales. Varios grupos están involucrados en su desarrollo: los servicios forestales y de bomberos, los técnicos de pastoreo, las unidades de intervención para la protección civil y los agentes de áreas naturales protegidas. Desde 1989, los diferentes equipos constituyen una red de quema prescrita en la región mediterránea, coordinada por la INRA. En el presente, la investigación experimental sobre la QP está siendo desarrollada para la conservación y el manejo de terrenos y humedales. Los servicios de bomberos han adoptado las técnicas del FS desde el 2005. Tanto el contrafuego como la quema de ensanche son técnicas utilizadas para la extinción de incendios forestales en muchos departamentos mediterráneos (p. ej., Garda, Córcega, el Ardèche, Alpes Marítimos).

Alemania

El método de cultivo de tala y quema se mantuvo hasta entrado el siglo XX en algunos lugares. La quema de brezales y praderas era generalizada, pero desde el 1970 se han prohibido totalmente estas prácticas tradicionales. Se han realizado iniciativas tipo museo para mostrar el cultivo tradicional de tala y quema en el suroeste de Alemania.

La QP se utiliza para varios propósitos de manejo: el mantenimiento del paisaje, el manejo del hábitat, el manejo de la vegetación y la reducción del combustible. Aunque la mayoría de las quemas son medidas operacionales, están todavía bajo la sombra de las quemas de investigación experimental que requieren permisos especiales debido a la prohibición general para usar el fuego en el manejo de la vegetación (en todos los estados). En el caso del FS, el fuego no se utiliza como una técnica para la extinción de incendios forestales.

Letonia

El cultivo de tala y quema se mantuvo hasta el siglo XIX. Hoy día, el fuego todavía se utiliza para quemar los residuos agrícolas y las praderas durante la primavera. La QP como herramienta de manejo no se practica en Letonia. No obstante, han habido pruebas experimentales para aplicar la QP en algunos proyectos de conservación de la naturaleza (Vidzeme y Zemgale). En la extinción de incendios, el método principal utilizado por los bomberos es el ataque directo mientras que el

contrafuego se aplica solamente en algunos casos.

Lituania

La mejora al pastoreo es una práctica tradicional extendida que se mantiene en el país. La quema de la hierba marchita también es una tradición muy antigua, lo cual representa un gran problema para los incendios forestales. La QP y el FS son técnicas que no se practican en este país.

Polonia

En el presente, no se conservan prácticas tradicionales de uso del fuego en este país. En cuanto a la QP, el fuego es considerado un factor que impacta negativamente el ambiente, dadas las circunstancias en Polonia. Sin embargo, los empleados de la organización de Bosques del Estado utilizan la QP (quema al voleo) para reducir la acumulación de combustible en las zonas despejadas. El fuego de supresión rara vez se aplica.

Portugal

El uso del fuego es una práctica extendida para la eliminación de los residuos agrícolas, la renovación de pastos, y las mejoras al pastoreo en la mayoría de las provincias portuguesas.

La QP se introdujo en el noroeste de Portugal durante los años 70 para la reducción de riesgos de incendios. Hoy día, la QP se emplea para varios propósitos: manejo de combustibles, control de la sucesión vegetal, mejoras en el hábitat y para facilitar el pastoreo y la regeneración de ciertas especies vegetales. Las regiones en donde esta técnica está más consolidada son el norte y el centro de Portugal. Varios organismos están involucrados en su desarrollo: agentes de los servicios forestales, agentes del Instituto de Conservación de la Naturaleza responsables de las áreas protegidas, varios municipios y grupos especializados con deberes de prevención de incendios forestales (*Sapadors Florestais*). Los servicios forestales están desarrollando programas de quema prescrita experimental en colaboración con la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Desde la mitad del siglo XX, el fuego se utiliza en las técnicas de contrafuego y quema de ensanche.

España

El uso del fuego por la población rural es una tradición establecida en España y sigue siendo una herramienta importante para la mejora del pastoreo y la eliminación de residuos forestales y agrícolas. El uso del fuego en la extinción también es una tradición establecida que perdura en algunas regiones del norte, en donde las comunidades locales utilizan el fuego para proteger sus bienes de los incendios forestales (por ej., en Galicia y Cataluña).

Como cada región tiene la responsabilidad del manejo de los bosques y de los incendios, su desarrollo de la QP es muy diverso. Cuando se utiliza la QP, se aplica principalmente para la prevención de incendios forestales: o para el manejo de

combustibles (para dificultar la propagación) o para trabajar con quemas descontroladas en zonas de pastoreo (para evitar el inicio de un incendio forestal). Las regiones del norte son la zona en donde esta técnica está más consolidada (es decir, en Galicia, Asturias, Castilla y León, y Cataluña). Varios grupos están interesados en llevarla a cabo: los servicios forestales y de protección civil, los guarda bosques y los grupos de especialistas entrenados en el uso del fuego (esto es, desarrollado por el estado (EPRIF) así como por las regiones autónomas (GRAF, Cataluña)). Las quemas experimentales están siendo realizadas por instituciones científicas (por ej., INIA, Centro Forestal Lourizan) así como universidades (por ej., Universidad de Lleida y la Universidad de Córdoba) y los Servicios Forestales. La mayoría de las regiones incluyen el uso del fuego de supresión como técnica disponible para el ataque indirecto desde los años 60 hasta los 80. Su uso en la práctica es bastante heterogéneo, pues en la mayoría de las regiones no es una práctica común debido a la falta de personal experimentado, mientras que en otras se ha desarrollado considerable experiencia, como en Castilla y León (León y Zamora), Asturias y Cataluña.

Suecia

Tradicionalmente, Suecia utilizaba la quema para propósitos forestales y agrícolas. Sin embargo, desde la década de 1970, estas prácticas empezaron a desaparecer y hoy en día no se quema zona alguna para estos propósitos. El uso actual del fuego se limita a la quema de hierbas marchitas en la primavera por agricultores y familias que tienen casas de veraneo.

La QP se está desarrollando para propósitos de conservación en una proporción bastante pequeña: (1) En las zonas protegidas, desarrollada por los encargados del ambiente. Señales prometedoras de este trabajo son las áreas silvestres Jämtgaveln y Strommyran-Lommyran en el condado de Västernorrland (Goldammer et al, 2007). (2) La QP es desarrollada por las principales compañías forestales privadas para cumplir con los requerimientos de conservación establecidos por el Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés) para satisfacer los estándares de certificación (lograr el 5% anuales de superficie de corta a hecho). La investigación sobre el fuego se concentra principalmente en el norte (Umea) con estudios acerca de la sucesión, el comportamiento del fuego (estudios piloto) y la historia de fuego (Niklasson y Granström, 2004). Tanto el contrafuego como la quema de ensanche son técnicas consideradas para la extinción de los incendios forestales. No obstante, no están muy extendidas debido al temor de los bomberos a los accidentes y sus consecuencias.

3.2. Clasificación y Cartografiado de las prácticas del uso del fuego en los estados miembros de la UE

Se propone una clasificación de las prácticas existentes de QP y FS para los países

analizados, basada en la consideración de dos criterios principales: los objetivos para el uso del fuego y el grado de estandarización. Para este propósito, ambos aspectos han sido incorporados a la matriz, lo que arroja quince categorías. La interpretación de la información contenida en la matriz requiere tomar en consideración las premisas observadas durante el proceso de rellenado:

- Un país se incluye en todas las categorías y tipos de práctica presentes en él.
- La incorporación del país en alguna categoría no implica que la práctica sea representativa, sino que existe en al menos una región. Este asunto es especialmente importante en aquellos países de régimen federal o descentralizado que muestran una mayor diversidad en este sentido.
- Para la QP en particular, es frecuente encontrar situaciones en las que la aplicación de esta técnica persigue objetivos simultáneos. Para estas situaciones, el objetivo principal que se consideró fue el que proveyeron los países.

Tabla 1 –Clasificación de las prácticas de uso del fuego en los países europeos. Fuente: Respuestas al cuestionario de Fire Paradox. Autor: A. LÁZARO (UCM, 2007)

	Uso tradicional del fuego	Uso renovado o innovador del fuego	Uso experimental del fuego
A. Actividades rurales	Bulgaria Lituania Chipre Portugal Francia Letonia España	Francia Alemania España Portugal	Alemania España
B. Prevención del incendio forestal		Francia España Alemania Portugal	Alemania Portugal España
C. Extinción de incendio forestal	Francia España Portugal	Bulgaria Polonia Chipre Portugal Francia España Letonia Suecia	
D. Silvicultura		Polonia España Portugal Suecia	Suecia
E. Conservación de la naturaleza		Francia España Alemania Suecia	Francia España

		Portugal	Alemania Suecia Letonia
F. Otros	Francia Alemania	Francia Alemania España	Francia Alemania

Finalmente, a fin de inferir el posible patrón temporal y espacial para el desarrollo de las prácticas de QP y FS, se han obtenido cuatro mapas diferentes como resultado de la información georeferenciada recopilada en el cuestionario en el nivel NUTS3/2 para los diferentes países analizados en el trabajo. Éstos son los siguientes:

Figura 2— Mapa de prácticas tradicionales del uso del fuego en los países europeos.

Figura 3— Mapa de los objetivos de la quema prescrita en los países europeos. Diferentes objetivos: prevención de incendios forestales, manejo de vegetación, otro o ninguno.

Figura 4— Mapa de la quema prescrita para la prevención de los incendios forestales en los países europeos. Incorpora el año en que comenzó.

Figura 5— Mapa del fuego de supresión para la extinción de incendios forestales en los países europeos. Incorpora el año en que comenzó.

Discusión

Los resultados presentados en este trabajo ofrecen una primera aproximación a la diversidad de prácticas de uso del fuego en Europa, y un punto de partida para la evaluación futura del desarrollo potencial de la QP y el FS como herramientas para el manejo de los incendios forestales, así como para otros propósitos de manejo, en el caso de la QP. Algunos de los hallazgos comunes que se obtuvieron son los siguientes:

- Hay un abandono general de las prácticas rurales del fuego en los países de Europa Central y los países bálticos versus un uso arraigado del fuego como herramienta para actividades rurales en la Cuenca del Mediterráneo y otros estados miembro que se han incorporado recientemente a la UE.
- El desarrollo incipiente de las prácticas de QP en Europa se ha llevado a cabo en diferentes áreas y con diferentes objetivos: en los países mediterráneos su introducción se refiere principalmente a propósitos de prevención de incendios forestales, mientras que en el norte de Europa, la silvicultura y la conservación de la naturaleza son los objetivos principales. Sin embargo, se ha visto que estas

tendencias han evolucionado con el paso del tiempo, ya que algunos países del sur (como Francia y Portugal) han comenzado a ampliar sus objetivos al manejo de los bosques y la biodiversidad, mientras que el aumento del riesgo de incendios forestales en los países del norte y el centro de Europa podría conllevar el desarrollo de iniciativas de QP para la prevención de los incendios forestales en un futuro cercano (por ej., Alemania).

- La aplicación de la quema prescrita para la prevención de incendios forestales se concentra en los países del sur de Europa, habiéndose desarrollado de manera importante a fines de los años 90 y el principio del siglo XXI.
- El desarrollo de las prácticas de fuego de supresión se concentra principalmente en los países del sur de Europa, habiéndose desarrollado anteriormente entre los años 70 y 80 en Portugal y España, y más recientemente en el sur de Francia y otros países europeos.
- Los contextos espaciales y las dinámicas socioeconómicas actuales se han identificado como los factores influyentes determinantes para la existencia y naturaleza de las prácticas de uso del fuego en los diferentes países y regiones. Su identificación es fundamental, ya que sólo una aplicación apropiada de las técnicas de uso del fuego, de acuerdo con las especificaciones regionales, tendrá la posibilidad de lograr un acuerdo social y político necesario que permita el uso del fuego para propósitos de manejo.
- Entre estos factores influyentes, la existencia y el conocimiento del uso tradicional del fuego ha sido identificada como uno de los factores principales, lo que determinará y orientará las estrategias y las recomendaciones que han de ser aplicadas en un contexto dado.

Referencias

- Botelho, H. S.; Rego, F.C. and J.M. Silva 1987. Prescribed fire behaviour in Pinus pinaster forests of Northern Portugal. In Com. International Symposium for the formulation of an effective common strategy for the prevención and combat of forest fires in the Mediterranean Region. Athens, Greece.
- FAO/GFMC 2003. Wildland Fire Terminology. On-line update of the first edition of 1986 <http://www.fire.uni-freiburg.de/literature/glossary.htm>
- Goldammer, J. G.; Hoffmann G.; Bruce, M.; Konrashov L.; Verkhovets S.; Kisilyakhov Y. K.; Rydkvist T.; Page H.; Brunn E.; Lovén L.; Eerikäinen, K; Nikolov, N. and Chuluunbaatar T-O 2007. The Eurasian Fire in Nature Conservation Network (EFNCN): Advances in the use of prescribed fire in nature conservation, landscape management in temperate-boreal Europe and adjoining countries in Southeast Europe, Caucasus, Central Asia and Northeast Asia. In 4th International Wildland Fire Conference, Seville, Spain, 13-17 May 2007
- Pyne, S. J. 1997. Vestal Fire. An environmental history told through fire, of Europe and Europe's encounter with the world. University of Washington Press
- Rigolot, E. 2000. Le brûlage dirigé en France: outil de gestion et recherches asocies. In Vega, J. A. & Vélez, R (Coord.): Actas de la Reunión sobre quemas prescritas, Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, nº9-2000, 165-178 p.
- Xanthopoulos G; Caballero, D.; Galante M.; Alexandrian D.; Rigolot, E. & Marzano R. 2006. Forest Fuels Management in Europe, in Andrews, P. L. & Butler, Bret W. (2006): Fuels Management-How to Measure Success: Conference Proceedings (Portland, 28-30 March 2006), USDA Forest Service, 807 p.

Análisis del Manejo de Riesgo de Incendio Forestal Desde la Perspectiva de las Políticas Territoriales: Fortalezas y Debilidades del Marco Europeo¹

S. Aguilar², L. Galiana³ y A. Lázaro⁴

Resumen

El problema de los incendios forestales, especialmente la creciente importancia de los fuegos grandes, se debe a causas estructurales complejas. No se puede lidiar con el manejo del riesgo partiendo solamente de una perspectiva sectorial de las políticas convencionales tocante a incendios forestales (protección de los bosques y de la población civil). Todo lo contrario, se requiere un acercamiento global que tome en consideración diferentes políticas que afectan el territorio, lo que podría contribuir, de manera concluyente, a la prevención de incendios forestales. El propósito de este trabajo es analizar las políticas territoriales sobre el manejo de incendios forestales en Europa para poder identificar y establecer la posible influencia y/o el impacto que estas políticas podrían tener en la prevención de los incendios forestales. Para alcanzar este propósito, se ha hecho una evaluación de los principales instrumentos de regulación y planificación, los cuales fueron escogidos de una serie de políticas que se utilizan con frecuencia en el manejo de los incendios forestales: planificación espacial, políticas de desarrollo agrícola y rural, políticas energéticas y ambientales.

Palabras clave: Europa, incendios forestales, manejo de incendios, políticas públicas, territorio.

1. Introducción

Los incendios forestales son una seria amenaza para los bosques europeos,

¹ Esta investigación está siendo desarrollada en el contexto del Proyecto FIRE PARADOX (2006-2010)¹, un proyecto integrado financiado por la Comisión Europea dentro del Sexto Programa Marco. Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Soluciones Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2009; Carolina, Puerto Rico.

² Catedrático Asociado, Departamento de Sociología I. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid, Somosaguas (Madrid) (email: saguilar@cps.ucm.es). Grupo de investigación UCM 930329 Política forestal y Socioeconomía.

³ Catedrático Asociado, Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras, Campus Cantoblanco (Madrid) (email: luis.galiana@uam.es). Grupo de investigación UCM 930329 Política forestal y Socioeconomía.

⁴ Investigador, Departamento of Geografía, Facultad de Geografía e Historia, Ciudad Universitaria (Madrid) 28040 (email: alazarog@ghis.ucm.es). Grupo de investigación UCM 930329 Política forestal y Socioeconomía.

desde el punto de vista ecológico, económico y social. Esta situación se ha ido empeorando durante la segunda mitad del siglo XX, convirtiéndose en uno de los peligros principales a los bosques en Europa, junto a la contaminación, las plagas y la erosión. Sin embargo, el problema de los incendios forestales presenta incidencias territoriales diferentes en el continente europeo, ya que está determinado por diversos factores ecológicos, socioeconómicos y políticos. Los países al norte de la cuenca del Mar Mediterráneo son los más afectados, al tener el número más alto de incendios y el área quemada más extensa, de 300,000 a 500,000 ha quemadas cada año (DG JRC, 2005). En esta región, la dinámica del cambio en el uso de los terrenos ha agravado el peligro de incendios y el potencial de desastre, debido a la creciente inflamabilidad de los ecosistemas y a un modelo de asentamiento con una fuerte tendencia a la dispersión, lo que aumenta peligrosamente el riesgo de ignición. Los cambios de mayor incidencia son: el abandono de las zonas rurales, un cambio en las prioridades de las políticas forestales y el crecimiento de zonas de interfaz urbano-forestal extensas (Xanthopoulos y otros, 2006).

Para contrarrestar esta situación, la mayor parte de los países europeos ha adoptado políticas dirigidas a la extinción de incendios, aumentando grandemente los recursos destinados a la extinción de incendios, a un costo económico alto. Además, los gobiernos nacionales usualmente desarrollan sus políticas sobre incendios forestales como reacción ad-hoc a una situación específica, ya existente (FAO, 1999). De ahí que se dejen atrás factores estructurales básicos a la iniciación y propagación de los incendios forestales, que no necesariamente se encuentran dentro del sector forestal. Sin embargo, el manejo de los incendios forestales no está afectado exclusivamente por las políticas del sector, sino también por políticas públicas tocantes a otras áreas, tales como el ambiente, los recursos naturales y la economía. A menudo estas políticas “externas” tienen un impacto que puede llevar a consecuencias imprevistas fuera de los sectores en donde han sido implementadas. Tomar en cuenta un acercamiento intersectorial de políticas que inciden en el territorio ofrece la oportunidad de atender los factores sociales, legales y económicos a largo plazo que afectan la manera en que se maneja la tierra, los cuales están fuera del alcance de las políticas forestales: las causas estructurales de los incendios forestales.

El propósito de este trabajo es identificar y analizar la política pública externa al sector forestal que podría influir en la prevención y la propagación de los incendios forestales en el marco europeo. Para hacer esto, de una selección de políticas con mayor incidencia en el manejo de los incendios forestales, se ha desarrollado una evaluación enfocada en: i) identificar los impactos de las

políticas intersectoriales que influyen en la propagación y la prevención de los incendios forestales, y ii) las principales fortalezas y debilidades del Manejo Integral de Incendios Forestales.

2. El Material y los Métodos

Este trabajo se centra en una selección de políticas identificadas como importantes relativas a los incendios forestales, debido a su incidencia en el uso sustentable de la tierra y el manejo de los recursos naturales. A este tipo de políticas les hemos llamado en este trabajo *Políticas Territoriales*: (def.) Políticas de desarrollo emprendidas por las autoridades públicas —el estado central así como los gobiernos regionales y locales— con la meta de promover un uso más eficiente de los recursos dentro de unas áreas geográficas específicas (OECD, 2003).

Las políticas territoriales que se analizarán en este documento son: i) **las políticas de planificación espacial**, ii) **las políticas de desarrollo rural y agrícola**, y iii) **las políticas ambientales**. Además de las políticas públicas seleccionadas, se considera necesario incorporar las **políticas energéticas** en la evaluación, dado que en la actualidad el modelo energético europeo es un asunto importante de debate, y el uso de la biomasa forestal ha adquirido una nueva importancia como fuente de energía renovable.

La escala principal para la evaluación es el nivel de la Unión Europea (UE), donde un acercamiento intersectorial es especialmente relevante, ya que ningún tratado de la UE provee una política forestal abarcadora común a todos los países de la UE. Sin embargo, es al nivel nacional donde recae la responsabilidad de desarrollar políticas forestales y de protección civil, y donde ocurren las interdependencias más importantes entre estas políticas y otras políticas públicas. Por consiguiente, se incorporan algunas consideraciones importantes sobre los incendios forestales a nivel nacional, aunque no sea ése el propósito de este trabajo.

El análisis del impacto de las políticas territoriales en los incendios forestales se ha enfocado principalmente en el análisis de los textos de las regulaciones concernidas y los documentos de planificación que corresponden a las diferentes políticas públicas.

3. Resultados

3.1. Políticas de planificación espacial en el manejo del riesgo de incendios forestales: fortalezas y debilidades

La planificación espacial, como política pública dirigida a influir en la distribución de las personas y las actividades dentro de los espacios, incluye todos los niveles de la

planificación del uso de los terrenos (planificación urbana, planificación regional, planificación espacial nacional y al nivel de la UE). Aunque Europa no tiene una política propia de planificación espacial común, en años recientes se han desarrollado orientaciones europeas a la planificación espacial⁵. Sin embargo, el desarrollo de las políticas de planificación espacial varía bastante entre los diferentes estados miembros; por lo tanto, la opinión sobre los efectos reales del manejo de incendios forestales es muy diferente en cada país. No obstante, es posible encontrar algunas áreas en común: el papel importante de la planificación espacial en el desarrollo de medidas de prevención, y, en particular, de aquellas medidas relacionadas con el manejo de las zonas de interfaz urbano-forestal (IUF).

Los planes forestales están nominalmente integrados en el sistema de planificación espacial (Montiel y Galiana, 2005). Sin embargo, la necesidad de vincular la política forestal, especialmente la intervención en los incendios forestales, a la planificación espacial es uno de los temas más comunes en cualquier contribución bibliográfica que intenta profundizar sobre los factores estructurales que promueven los incendios forestales. Esta aproximación se hace usualmente desde la perspectiva forestal, y, particularmente, en relación con incendios extensos, en cuyos orígenes convergen causas estructurales complejas (Badia et al, 2002), las cuales no son posibles de tratar desde una visión sectorial exclusiva. Estas causas estructurales son básicamente dos (Plana, 2004): (i) un modelo de asentamiento con una fuerte tendencia a la dispersión, lo que aumenta peligrosamente el riesgo de ignición y (ii) la evolución de la vegetación forestal hacia la acumulación de sustancias combustibles que favorecen la propagación de los incendios forestales. La planificación espacial ofrece la posibilidad de participar en la organización del asentamiento urbano. Por una parte, restringe la ocupación de zonas en riesgo y, por otra, favorece una matriz territorial que dificulta la propagación. Esto se debe desarrollar en coordinación con la planificación forestal; no obstante, la ausencia de un marco coherente entre estas dos políticas limita el potencial de intervención de la planificación espacial.

La planificación espacial no solamente traduce principios que vienen de la administración de bosques, sino que introduce principios particulares y diferenciados para este tipo de áreas. Las zonas forestales tienen un gran valor en los instrumentos de planificación espacial, junto con una creciente aceptación del modelo territorial. Esto conlleva un *enfoque conservacionista* de las formaciones forestales mediante el establecimiento de zonas protegidas, lo que, además de incorporar criterios tomados en cuenta por otros tipos de planificación (ambiental, forestal), amplía los objetivos

⁵ Estas orientaciones han sido especificadas mediante la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT) de 1999, la cual está, en el presente, en la fase de desarrollo operativo.

de conservación al incorporar criterios estrechamente relacionados con el funcionamiento de los sistemas territoriales. Este enfoque puede conllevar efectos negativos, ya que la prohibición a la reducción de las zonas forestales no toma en cuenta medidas de reducción de combustibles, las cuales son absolutamente necesarias desde la perspectiva del manejo de incendios forestales dentro del contexto del abandono de las zonas rurales y la sucesión vegetal incontrolada (Badia et al, 2002). Por lo tanto, se plantea un *enfoque regulador* a las zonas forestales mediante la *zonificación*, lo que básicamente implica establecer restricciones para los usos y las actividades, dependiendo del límite de densidad máxima, el uso de los recursos y los peligros naturales. Este enfoque, establecido mediante instrumentos de planificación del uso de terrenos (también aceptado por la planificación forestal), ha sido cuestionado por otras acercamientos recientes que insisten en la necesidad de un enfoque de planificación espacial más estratégico (Davoudi, 2004).

La función de la planificación espacial en el manejo de incendios forestales está enmarcado en el enfoque más amplio de los peligros naturales asumido por esta política pública. Esta política tiene el potencial de favorecer un uso más sensato del territorio dentro de un modelo territorial sustentable, el cual incorpora la matriz biofísica y el conocimiento de la dinámica al análisis y el diagnóstico territorial.

Hay un tratamiento genérico para el uso y la ocupación de la tierra en relación con los peligros naturales, lo que usualmente tiende a limitar los usos y las actividades en las zonas afectadas por este tipo de eventos, para minimizar los daños causados por ellos. La necesidad de establecer límites precisamente en este tipo de zonas adquiere una creciente relevancia en la legislación sobre planificación espacial. La capacidad reguladora de los instrumentos de planificación espacial permite su incorporación a la categoría de *zonas protegidas* (ya sea como terrenos diferenciados o como una restricción impuesta a otras categorías de planificación).

No obstante, esta propuesta reguladora no parecer ser eficaz contra los incendios forestales. Es necesario cambiar hacia una propuesta más *estratégica*, basada en la regulación de los procesos de transformación más relevantes bajo una perspectiva global (modelo territorial) y de acuerdo con la capacidad de transformación socialmente aceptable (por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, la modificación de los paisajes, el aumento en vulnerabilidad).

Por consiguiente, se necesita un marco analítico y diagnóstico diferente de los de la planificación espacial convencional (zonificación y reguladora), con nuevas propuestas basadas en los principios de la ecología paisajista: parches, corredores, patrones (el territorio como un sistema) (Marull y Mallarach, 2002). La identificación de la funcionalidad territorial y su incorporación al modelo permitiría la definición de las herramientas para medir el impacto de los incendios forestales, las zonas sensibles a daños ecológicos, el potencial para un desarrollo urbano que impacte menos, etc.

De ahí, un marco esencialmente dinámico de la planificación espacial estaría en oposición al marco estático de la planificación del uso del territorio.

3.2 Políticas de desarrollo agrícola y rural en el manejo del riesgo de incendios forestales: fortalezas y debilidades

Desde el principio, la agricultura ha sido una de las prioridades más importantes para la UE. La Política Agrícola Común (PAC) se considera una de sus áreas principales de política pública, si consideramos su extensión, su porción del presupuesto de la UE y las controversias que ha causado. Desde hace más de cuarenta años, la PAC ha pasado por varias reformas y ha incorporado progresivamente nuevos elementos de creciente importancia en la agenda política, tales como el ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo rural. En particular, la creciente importancia de las medidas de desarrollo rural dentro de la PAC corresponde a la realidad de que, según la Comisión Europea (1997), aproximadamente 80% del territorio de la Unión Europea puede llamarse *“rural”*⁶, donde, gracias a transformaciones importantes durante las últimas décadas, la agricultura ya no es el pilar obvio del campo.

Desde el punto de vista de la política pública, la silvicultura se reconoce cada vez más como una de las actividades que se deben considerar en este tipo de desarrollo. La creciente importancia del papel que juegan los bosques en el desarrollo rural se ha reflejado en la evolución de la política de desarrollo rural: las medidas forestales asumidas por la PAC han evolucionado de ser principalmente medidas de forestación⁶, hasta constituirse en un grupo específico de medidas de silvicultura cubiertas por el Reglamento (CE) 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural⁷. El presente reglamento para el periodo 2007-2013 incluye un conjunto de medidas cuyo objetivo es el uso sustentable de las depresiones en la tierra forestal: la primera forestación de las tierras agrícolas y no agrícolas, la primera instauración de sistemas agroforestales, la restauración del potencial del bosque y la introducción de acciones de prevención, Natura 2000 y la ayuda económica a los sectores agrario y forestal, y el apoyo para las inversiones no productivas. En cuanto a la protección forestal, el Reglamento hace una mención explícita a los incendios forestales con respecto al financiamiento de medidas de prevención, así como de actividades de restauración en los bosques perjudicados por desastres naturales y para el mantenimiento de los cortafuegos mediante medidas agrícolas. Además, todas las medidas que se proponen sobre la silvicultura en zonas de medio o alto riesgo de incendios forestales, dentro

⁶ Reglamento (CEE) n° 2082/92 del Consejo. Reformulación de un sistema de ayudas para la forestación.

⁷ Reglamento (CEE) n° 1257/99 del 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), el cual enmienda y revoca ciertos reglamentos. Reglamento (CEE) n° 1698/2005 del 20 de septiembre de 2005, sobre la ayuda al desarrollo rural por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

del marco de la acción de la Comunidad para la protección contra los incendios, deben estar conforme con los planes de protección forestal establecidos por los estados miembros para estas zonas⁸.

Cuanto más aumenta el rol de los bosques en el desarrollo de comunidades locales en zonas forestales, más potencial tienen las Políticas de Desarrollo Agrícola y Rural de influir en las causas estructurales que afectan la iniciación y propagación de los incendios forestales.

Como se mencionó arriba, algunas de estas medidas están estrechamente relacionadas con la protección de los bosques y la prevención de los incendios forestales. Así, el Reglamento, junto con Forest Focus, son los dos instrumentos principales para el apoyo de actividades de prevención y restauración a ser llevadas a cabo por los Estados Miembros, con el apoyo financiero del recién creado Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el presente periodo de programación 2007-2013.

Sin embargo, el potencial de las políticas de desarrollo rural para resolver el problema de los incendios forestales es más importante en aquellas medidas que aspiran a garantizar el mantenimiento de comunidades locales viables en el sentido económico y social. El Reglamento persigue esta meta no sólo al mejorar la competitividad de los sectores rurales tradicionales (la agricultura y la silvicultura), sino también al promover la diversificación de las economías rurales (esto es, el turismo y las microempresas) y mejorar la calidad de vida en estas zonas. En este contexto, la promoción del papel multifuncional del bosque contribuye al desarrollo de las comunidades rurales que dependen de las zonas forestales, y a largo plazo constituye una garantía para la conservación de los bosques, especialmente en el contexto Europeo, donde los ecosistemas forestales son motivo de una creciente presión antropogénica. Esto es importante especialmente en zonas que tienen el problema de las quemas clandestinas, como las zonas mediterráneas, donde el fuego es una herramienta importante en las actividades rurales como medio para hacer rentables las tierras silvestres, y constituye la causa principal de inicio de incendios forestales.

Además, el mantenimiento de actividades rurales en zonas boscosas—tales como el uso de combustible del bosque, el establecimiento de sistemas de agro silvicultura, el aprovechamiento de productos no madereros (como recoger setas o cazar animales)—favorece las discontinuidades en la vegetación del bosque, lo que, a largo plazo, crea la mejor defensa contra el aumento en la frecuencia de grandes eventos de fuego.

Sin embargo, aunque los Reglamentos establecen la necesidad de asegurar la

⁸ Reglamento (CEE) n° 1783/2003 que enmienda el Reglamento (CE) No 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).

conformidad de todas las medidas cofinanciadas de silvicultura que se han desarrollado en zonas de alto o mediano riesgo de incendios forestales con los planes de protección forestal establecidos por los Estados miembro, en la práctica encontramos medidas que, al contrario, pueden empeorar el problema de los incendios forestales (es decir, el uso excesivo de la forestación, el uso de especies que crecen rápido). Además, la necesidad de asegurar la conformidad con la dinámica de los incendios forestales debe considerarse para otras medidas asumidas por la PAC, lo que puede afectar indirectamente las zonas forestales, como el efecto de separar los pagos de la producción. Esto, aunque beneficioso para el uso menos extensivo de la tierra, también puede ocasionar la desaparición del ganado y, por lo tanto, la amenaza del abandono de la tierra y una reducción en las áreas de pasto (Zdanowic et al, 2005). Por otra parte, la financiación del ganado sin el aumento necesario de zonas de pasto podría entonces tener un efecto negativo en la incidencia de fuegos forestales, debido al uso de quemas clandestinas por la población rural para crear pastizales.

Desde la perspectiva de los estados miembro, las políticas de desarrollo rural se consideran como una oportunidad para financiar sus políticas nacionales de prevención de incendios forestales (por ejemplo, el desarrollo de campañas para crear conciencia, los tratamientos de silvicultura, el mantenimiento de las infraestructuras defensivas o las medidas agroambientales). Sin embargo, si bien estas medidas preventivas pueden ser importantes desde el punto de vista técnico, es necesario conectar estas acciones con actividades económicas sustentables para garantizar su mantenimiento a largo plazo (por ejemplo, las actividades agroalimentarias o el turismo rural).

3.3 Políticas energéticas en el manejo de riesgos de incendios forestales: fortalezas y debilidades

La política energética, a diferencia de la política ambiental, no es una política de la UE legalmente vinculante en su totalidad. Se ha considerado que las decisiones relacionadas con la energía afectan los intereses cruciales de los estados miembro y, por lo tanto, todavía están sujetas a decisiones unánimes en el Consejo Europeo. Debido a este hecho, la política energética se ha europeizado solamente hasta cierto punto.

A pesar de esto, la UE reconoce claramente la relevancia de los asuntos energéticos, como se ilustra tanto en su papel de líder a nivel internacional con relación a la promoción del Protocolo de Kyoto como en su apoyo a las energías renovables (ER) a nivel europeo. La recurrencia de los incendios forestales, agravada por el calentamiento global y agravando, a su vez, el efecto invernadero, obviamente se debe fijar como objetivo de las decisiones de la UE sobre la energía. En este

sentido, el Protocolo de Kyoto, mencionado anteriormente, no solamente concibe permisos de emisión tratables sino que también promueve los bosques como zonas de absorción de CO₂. En cuanto a la energía renovable (ER), una prueba de su importancia es el reciente compromiso de la UE de aumentar su presencia en el mercado de energía europeo en 20% para el año 2010⁹. Ya que la UE depende de la importación de energía¹⁰, se ha pensado en la promoción de fuentes endógenas sustentables, tales como la biomasa (siguiendo los ejemplos exitosos de los daneses y finlandeses).

Con respecto al Protocolo de Kyoto, no ha habido el lapso necesario para evaluar su impacto, ya que no fue hasta el 16 de febrero de 2005 que se puso en vigor en la UE. Además, el principio de subsidiariedad, el cual ha otorgado un mayor papel a los estados miembro en contraposición a la Comisión de la UE, junto con el programa europeo de desarrollo sustentable (DS) —que permite muchas maneras diferentes, y, a veces, contradictorias, de lograr la sustentabilidad—, complican los problemas en torno a la evaluación de la influencia de la política energética de la UE sobre los incendios forestales. Ambos factores, el principio subsidiario y el DS, podrían agravar el desempeño desigual de los diferentes estados miembro en lo que a Kyoto se refiere. La falta de poder de la UE para obligar a que se reduzca la brecha entre los “respetuosos de la ley” y los “violadores de la ley” es, en este sentido, notable. En resumen, la falta de sanciones y el voluntarismo podrían empeorar el pobre desempeño de un tratado internacional que tiene un potencial importante para lidiar con los incendios forestales.

En cuanto a la energía renovable, se ha detectado poco progreso entre el 1997 y el 2000, aunque algunos sectores y países específicos se han desviado claramente de una norma un tanto desalentadora. El problema se encuentra, de nuevo, en la ausencia general de mandatos claros y metas compulsorias, ya que la mayoría de las decisiones de la UE en este campo adquieren forma de comunicaciones (o estrategias y documentos de trabajo). El caso de la biomasa ejemplifica claramente este punto: en una zona que se considera crucial para el suministro de energía y las reducciones de CO₂, la Comisión simplemente se ha limitado a apoyar medidas voluntarias. Una comunicación estableció que “es necesario difundir ampliamente el conocimiento y la información dentro de la Unión Europea y lanzar campañas de promoción para recalcar los aspectos energéticos, ambientales y económicos de esta tecnología”. Más aún, la falta de coordinación de la política pública y la insuficiencia del

⁹ Este compromiso ha suplantado al COM (97) 599 Energía para el Futuro: Fuentes de Energía Renovables – Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios. Este trabajo proporcionó una estrategia para los renovables, y su objetivo principal era doblar la proporción de la ER en el consumo interno bruto de energía de la UE de un 6% en el 1997 a un 12% en el 2010.

¹⁰ En el presente, la UE depende de las importaciones para satisfacer el 50% de su necesidad de energía. Se espera que este porcentaje aumente a un 70% en el 2030 con una creciente dependencia del petróleo y el gas.

financiamiento están afectando el proceso que conduce a la producción de biomásas, mientras que el apoyo a la biomasa forestal todavía es insuficiente en la mitad de los países europeos (Directiva 2001/77/CE). Esta situación es desalentadora ya que la biomasa podría ofrecer una solución al crecimiento excesivo de las masas forestales, reduciendo así el riesgo de iniciación y propagación de los incendios forestales. Además, el uso de la biomasa forestal se considera uno de los factores que puede realzar el valor de los bosques, un asunto que se contempla en las políticas nacionales de desarrollo rural elaboradas por los estados miembro.

No todos los aspectos de los recursos renovables se dejan al buen juicio de los estados miembro. Una cantidad de directrices que establecen metas vinculantes y medios discrecionales para su realización también ha sido aprobada, como es el caso de la Directiva 2003/30/CE, que promueve el uso de los biocombustibles u otros combustibles renovables para las exhibiciones de medios de transporte¹¹. Tal y como han demostrado las experiencias previas, la falta de implementación probablemente afectará la imposición de esta y otras directrices relacionadas con la energía.

3.4 Políticas ambientales en el manejo de riesgos de los incendios forestales: fortalezas y debilidades

Desde su comienzo a finales de los años 60 y principios de los 70, la política ambiental en la UE se ha dirigido gradualmente hacia la sustentabilidad. Durante este proceso, la protección ambiental logró un reconocimiento formal (en la Acta Única Europea de 1986) y aumentó su “asertividad”, como queda demostrado por el hecho de que el subsiguiente programa de acción para el medio ambiente dejó de considerar el ambiente como algo que debe ser regulado debido a las repercusiones en el mercado interno, sino más bien porque era un recurso importante por sí mismo. Relacionada con la creciente “asertividad”, estaba la ampliación de los poderes ambientales asumidos por la Comisión.

Sin embargo, el ímpetu inicial de la legislación ambiental de la Comisión empezó a ser criticado desde mediados de los 80 como resultado de la creciente popularidad del principio de subsidiariedad. Como consecuencia, se han aprobado menos directrices en tiempos recientes, mientras que se han propuesto nuevas directrices marco (por ej., la Directriz marco en el sector del agua del 2000, 60/2000). Esto implicará que la directriz, como principal instrumento legal de la política ambiental hasta ahora, perderá su enfoque específico inicial y se hará más laxa e

¹¹ Este instrumento legal fija un por ciento mínimo de biocombustibles para remplazar el diesel o el petróleo para propósitos de transporte en cada estado miembro: la parte mínima de biocombustibles vendidos en sus mercados debió ser de 2% para el 31 de diciembre del 2005, y, como tarde, de 5.75% para diciembre del 2010.

imprecisa. Un nuevo acercamiento a una mejor implementación (en vez de meramente una legislación), además de un nuevo consenso acerca de la necesidad de combinar los instrumentos de mando y control con medidas voluntarias, autorreguladoras, educativas y basadas en el mercado, forman la base de este nuevo paradigma político¹². Otro elemento de la “nueva” política ambiental de la UE se relaciona con la “condicionalidad”: la distribución de fondos—programa LIFE, fondo de cohesión, fondos estructurales— dependerá cada vez más del logro de los objetivos ambientales. El proceso de Cardiff también ha contribuido a que las preocupaciones ambientales sean incorporadas a todas las demás áreas de política pública mediante la aplicación del principio ambiental de integración; es decir, la política ambiental gradualmente dejará de ser una política sectorial tradicional, sino más bien un objetivo incorporado en todas las políticas relacionadas con el ambiente. Finalmente, el papel de la UE como parte signataria de los acuerdos ambientales internacionales es cada vez mayor.

De todas las áreas que las políticas ambientales podrían abarcar, aquellas que podrían afectar más directamente los incendios forestales son: políticas del agua que conectan la calidad del recurso con la preservación de un flujo mínimo en la unidad de la cuenca hidrográfica; políticas de aire que combaten el cambio climático mediante planes de forestación que podrían contribuir a disminuir las emisiones de CO₂ a través de la promoción del efecto sumidero; las políticas de desperdicios urbanos que aspiran a eliminar los vertederos ilegales en las poblaciones semiurbanas y rurales; y las políticas de conservación y biodiversidad que se centran en la lucha contra la desertificación y la promoción de esquemas de desarrollo sustentable en zonas forestales y semirurales. Aparte de la referencia explícita a los incendios que se encuentra en varias regulaciones¹³, muchas normas ambientales no atienden este problema de una manera explícita. Al nivel de los estados miembro, la intervención de las políticas ambientales en el manejo de los incendios forestales se limita simplemente a la fase de prevención. En particular, favorece la implementación de la legislación y los planes sectoriales (protección forestal o civil), mediante el establecimiento de principios guía para actividades que tengan riesgo de incendio, como fuente adicional para financiar actividades de prevención.

A diferencia de la política energética, la protección ambiental se basa

¹² Junto a la armonización dura (la legislación), se promueve cada vez más la difusión y la emulación (es decir, establecimiento de redes, el intercambio de mejores prácticas —los casos de IMPEL o la Red europea para el cumplimiento y la aplicación de la normativa ambiental, El Marco Comunitario de Cooperación para la Promoción del Desarrollo Urbano Sostenible—), la transferencia de pericia y una mejor gobernanza.

¹³ Por ejemplo: CE N° 2278/1999 presenta ciertas reglas detalladas para la aplicación del Reglamento (CEE) N° 3528/86 para la protección de los bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica, y el CE N° 1727/1999 presenta ciertas reglas detalladas para la aplicación de del Reglamento (CEE) N° 2158/92 para la protección de los bosques de la Comunidad contra los incendios.

principalmente en directrices, lo que implica que los objetivos ambientales disfrutaban de una fuerza legal vinculante. Sin embargo, el déficit de implementación, así como la falta de poder por parte de la UE para hacer cumplir las directrices, se han identificado tradicionalmente como los factores principales que explican la lentitud del progreso en esta área. Cuando se trata de definir, ajustar e implementar esos instrumentos legales, los actores cruciales son los estados miembro, como lo demuestra la directriz Habitats 92/43, que establece la red europea de zonas protegidas, Natura 2000 (así como la directriz anterior 79/409, sobre la conservación de las aves).

Si el déficit de implementación es un fenómeno concomitante a los instrumentos legales vinculantes, ¿qué no podría ocurrirle a los instrumentos que no tienen esta fuerza legal? (por ejemplo, la propuesta de la Comisión relacionada con el plan de acción de biodiversidad para la conservación de los recursos naturales mediante el uso de técnicas específicas de silvicultura para imitar mejor los procesos naturales, o el Sexto Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente que cubre el periodo 2002-2012 y ha identificado la naturaleza y la biodiversidad como una de sus cuatro áreas prioritarias).

Otro elemento importante en la política ambiental actual es la creciente dependencia de lo que podría denominarse como “voluntarismo”, ejemplificado en los mecanismos de intercambio de información, la transferencia de las “mejores prácticas”, el establecimiento de redes y así por el estilo. Un ejemplo claro con respecto a esto es el llamado a establecer una red para el intercambio de prácticas y herramientas de prevención con relación a los accidentes y los desastres naturales que contiene el encabezamiento de “Naturaleza y Biodiversidad” (VI EAP). Estos mecanismos reflejan la nueva actitud autorreguladora que se ha extendido a través de la UE, empujando los instrumentos más tradicionales y estrictos a una posición periférica.

En resumen, la dilución de la política ambiental de la UE en el programa de DS podría resultar negativa para las propuestas de manejo de incendios, ya que se abren nuevas posibilidades a planes y resultados nacionales divergentes. La pérdida gradual del ímpetu del proceso de europeización podría igualmente perjudicar la realización de medidas armonizadas y coherentes que luchen contra el problema de los incendios a nivel de la UE. Aunque el principio de subsidiariedad contiene un elemento de verdad importante cuando sostiene que ciertos problemas ambientales (como los incendios forestales) son mejor atendidos a nivel local o regional, la falta de participación de la UE podría tener resultados desiguales e insatisfactorios y obstáculos en términos de experiencias educativas.

6. Conclusiones

Adoptar un acercamiento intersectorial a las políticas públicas que afectan el manejo de las tierras ofrece la oportunidad de comprender las causas estructurales que afectan los incendios forestales, así como de evaluar su potencial de intervención en la prevención y propagación de los incendios forestales. Una acción directa sobre la manera en que se maneja la tierra y el análisis de las condiciones sociales, ecológicas y económicas que contribuyen al riesgo de incendios forestales son algunos de los ejemplos de este potencial.

Sin embargo, la coordinación necesaria para lograr un acercamiento intersectorial se ve obstaculizada por las diferencias en las políticas territoriales. Para superar estas dificultades, es necesario evaluar el nivel de coincidencia entre los objetivos de las políticas públicas, es decir, hasta qué punto existen relaciones complementarias o conflictivas entre ellos. El territorio debe ser puesto en el centro del debate sobre la sustentabilidad, lo que implica progresar hacia la gobernanza territorial y la coordinación de las políticas.

En general, las políticas territoriales están lejos de considerar estrictamente los objetivos relacionados con los incendios. En los casos en que se contemplan estos objetivos, un acercamiento indefinido parece constituir la norma; los incendios forestales son incluidos a menudo entre los peligros naturales en general. Además, no atender los objetivos relativos a los incendios forestales en estas políticas puede crear las condiciones para más incendios devastadores.

También se requiere la adopción de un acercamiento multinivel cuando se evalúa el impacto de las políticas públicas sobre el manejo de los incendios forestales, particularmente en el caso de países descentralizados debido a su estructura multinivel de gobernanza. Esto lleva a considerar las principales orientaciones que provienen de la UE, el marco conceptual regulador nacional de los estados miembro y su implementación a nivel regional y local. En este sentido, las políticas europeas que más directamente afectan el manejo de los incendios (es decir, las políticas relacionadas con los bosques) no son parte del *acquis communautaire* y, por ende, no tienen una naturaleza compulsoria. Es decir, los planes forestales tendrán que ser trazados por los estados miembro (por ej., Reg 2152/03) bajo el principio subsidiario, obteniéndose así resultados heterogéneos en términos de la calidad de la elaboración, la amplitud y la especificación de metas y fechas límites. En este sentido, la falta de legislación específica por parte de la UE sobre el manejo de incendios forestales, además de la poca europeización de las políticas que más directamente inciden en los incendios forestales, nos lleva a concluir que no se puede anticipar en el futuro inmediato un esfuerzo concertado en este frente. Las políticas más europeizadas analizadas en este documento (es decir, la PAC y ciertas políticas ambientales) tienen solo un efecto marginal en los asuntos relativos a los incendios.

Referencias

- Badia A; Sauri D; Cerdan R; and Llurdes J-C. 2002. Causality and management of forest fires in Mediterranean environments: an example from Catalonia. In: Global environmental change, Part B: Environmental Hazards, Vol.4 Issue.1; 23-32 p.
- DG JRC. 2005. Forest Fires in Europe 2005. Report nº6; 53 p.
- Montiel, C.; Galiana, L. 2005. Forest policy and land planning policy in Spain: a regional approach. In: Forest Policy and Economics, vol. 7/2;131-142 p.
- Plana, E.; Carlomagno, E.; De Miguel, S. 2005. Fire risk management, forest policy and territorial planning: comparative assessment and proposals for an integrated model. II International Conference on Prevention Strategies for fire in Southern Europe, Barcelona, 9-11 May 2005.
- FAO 1999. Report of meeting on public policies affecting forest fires, 14th session, Rome, Italy, 1-5 March 1999, I. Preamble 3.
- OECD, 2003. Report on innovation and effectiveness in territorial development policy. 6th Session of the Working Party on territorial indicators. Switzerland, 23-24 June 2003, page 2.
- Xanthopoulos G; Caballero, D.; Galante M.; Alexyrian D.; Rigolot, E. & Marzano R. 2006. Forest Fuels Management in Europe. In: Andrews, P. L. & Butler, Bret W.: Fuels Management-How to Measure Success: Conference Proceedings (Portly, 28-30 March 2006), USDA Forest Service; 807 p.

Análisis Comparativo de las Políticas Forestales Europeas y su Influencia en el Manejo de Incendios¹

Gema Herrero², Andrea Lázaro² y Cristina Montiel³

Resumen

Los asuntos relacionados con los incendios forestales son considerados fundamentalmente, dentro de las políticas forestales nacionales, como amenazas que afectan a los bosques. Por tanto, estos asuntos son responsabilidad de los Estados miembros de la Unión Europea, desarrollados en el marco de los programas forestales nacionales y de acuerdo a los diferentes contextos y necesidades territoriales. Además, la Unión Europea puede influenciar o completar aspectos específicos del sector forestal, a saber, los problemas de los incendios forestales. De manera que los procesos y los documentos de planificación de las políticas forestales representan una buena oportunidad para introducir nuevos enfoques en el manejo de incendios, dirigidos a una acción más eficiente, basada en la integración de los diferentes aspectos del fuego (desde los incendios forestales hasta la quema prescrita y la extinción).

El objetivo de esta ponencia es analizar la contribución de las políticas forestales al manejo integrado de los incendios. Para cumplir con este propósito, se desarrollará un análisis comparativo de las principales fortalezas y debilidades de los instrumentos de las políticas forestales en relación con los incendios, a escala europea, y en el marco de las políticas forestales nacionales. Además, se presentará cómo las distintas políticas forestales europeas visualizan el problema de los incendios con el propósito de identificar patrones comunes a escala regional.

Palabras claves: Documentos de planificación, manejo de incendios forestales, política forestal, programa forestal nacional, Unión Europea.

¹ Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto integrado *FIRE PARADOX* “An innovative approach of Integrated Wildland Fire Management Regulating the Wildfire Problem by the Wise use of Fire: solving the Fire Paradox”, financiado por el Sexto Programa Marco, Subprioridad 6.3, Cambio Global y Ecosistemas.

² Investigadora, Departamento de Geografía, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria (Madrid) 28040. Grupo de Investigación UCM 930329 Política y Socioeconomía Forestal (geherrer@ghis.ucm.es ; alazarog@ghis.ucm.es)

³ Catedrática, Departamento de Geografía, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria (Madrid) 28040. Grupo de Investigación UCM 930329 Política y Socioeconomía Forestal (crismont@ghis.ucm.es)

1. Introducción

Uno de los principales riesgos que afectan los bosques europeos son los incendios, particularmente en los países del Mediterráneo. Los cambios socioeconómicos, algunas acciones de manejo forestal (p. ej., plantaciones forestales) y otras medidas de política pública fuera del sector forestal (p. ej., políticas de protección del medioambiente y de la naturaleza) han afectado la inflamabilidad de los ecosistemas y aumentado el riesgo de incendios. Por tanto, el sector forestal tiene que adaptarse a las nuevas realidades que están provocando cambios fundamentales en Europa⁴.

Durante el pasado siglo, las políticas de control de incendios forestales adoptadas por la mayoría de los países europeos han estado basadas en la exclusión total del fuego. No obstante, no se ha llegado a reconocer el rol del fuego en los ecosistemas y a entender los aspectos socioeconómicos y culturales bajo los cuales ocurren muchos de los incendios. El fuego ha sido utilizado constantemente como una herramienta en las prácticas agrícolas y forestales en tiempos pasados y presentes (FAO, 2006). Además, el uso del fuego se ha vuelto a introducir en algunas zonas, como mecanismo para reducir combustibles peligrosos y el riesgo de daños y pérdidas (Hesseln, 2006).

Por otra parte, la tendencia reciente en la política de manejo de incendios es la de tomar acciones preventivas a largo plazo, y no simplemente medidas de extinción de emergencia cuando ocurre un incendio. Hasta ahora, el proceso de impulsar cambios en las políticas de manejo de incendios o la adopción de nuevas medidas políticas han sido una reacción rápida *ad hoc* ante una situación catastrófica que se presenta, en lugar de una mitigación proactiva antes de que surja la emergencia. (FAO, 1999).

Las medidas de política pública son influenciadas por el nivel percibido de amenaza, que varía con la intensidad y escala de los problemas relacionados con incendios en cada país. De manera que se necesitan nuevos enfoques para la protección contra incendios y así mejorar las estrategias de prevención y extinción. Un paso más allá se da con el concepto de *manejo integrado de incendios forestales*. Esto implica la consideración de varios aspectos del fuego en la extinción y la prevención, pero también el uso del fuego como una herramienta para las prácticas de manejo.

El propósito de esta ponencia es analizar las principales fortalezas y debilidades de la legislación y las políticas forestales en los países de la Unión Europea para promover nuevas prácticas de manejo y lograr un sistema integrado de manejo de incendios forestales adaptado a los contextos territoriales

⁴ IV Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, (Sevilla, España. 2007).

específicos. Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto Integrado Europeo *FIRE PARADOX* (2006-2010)⁵, el cual tiene como uno de sus objetivos finales ofrecer recomendaciones para medidas de políticas a largo plazo y promover un cambio en la actual situación de los incendios forestales.

2. Material y Metodología

El análisis de la legislación y políticas de incendios se desarrolla cubriendo dos ámbitos: (i) la escala europea y (ii) el marco nacional de varios Estados miembros de la Unión Europea⁶.

La investigación se ha basado principalmente en documentos legales y de política pública obtenidos a través de las siguientes fuentes de información:

- Un cuestionario formulado en el marco del proyecto *FIRE PARADOX*, que ha sido la fuente principal para la recopilación de información oficial. A través de la Comisión Europea, se envió el cuestionario a los miembros del *Working Group of Forest Fire Prevention Experts (WGFFP)* [Grupo de trabajo de expertos en prevención de incendios forestales]. Este grupo se compone de expertos de las autoridades nacionales nominados por los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea; ya que trabajan con los asuntos operativos relacionados con la prevención y lucha contra incendios, poseen un conocimiento total y exhaustivo de los incendios forestales en sus países.
- Contacto con expertos nacionales, entre ellos los miembros del *Fire Paradox*, *Eurasian Fire in Nature Conservation Network (EFNCN)*, representantes de la *WGFFP*, representantes de los gobiernos regionales e investigadores de universidades europeas.
- Textos de reglamentación nacional respecto al uso del fuego, legislación forestal y contra incendios; planes de bosques nacionales y documentos de planificación específicos con relación con la defensa y protección contra incendios.
- Referencias bibliográficas para suplementar los documentos oficiales se obtuvieron de páginas Web oficiales y de bases de datos de organizaciones oficiales y agencias no gubernamentales⁷, las bases de datos de proyectos de investigación europeos (p. ej.,: *EUFIRELAB* y *FIRE TORCH*) y otras bases de datos en línea (p. ej.,: *Web of Science*, *Science Direct* and *Universities*, *FAO NFP Update*⁸).

La metodología para el análisis de los datos recopilados se basa en (i) el examen

⁵ www.fireparadox.org

⁶ Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, España y Suecia.

⁷ La FAO, el Consejo Europeo, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, el Centro Global para el Monitoreo de Incendios, Joint Research Centre [Centro de Investigación Conjunta de la Unión Europea], The Nature Conservancy, the International Forest Fire News (IFFN) [Noticias Internacionales sobre Incendios Forestales]

⁸ <http://www.fao.org/forestry/site/nfp-update/en/>

de documentos oficiales y otras referencias bibliográficas, (ii) un análisis comparativo de los datos a nivel nacional y (iii) la identificación de patrones comunes entre los países a escala regional. Se desarrolla un análisis final tipo SWOT, basado en las regiones obtenidas del análisis comparativo, que identifica las fortalezas y debilidades de los instrumentos de legislación y de las políticas en relación con los sistemas de manejo integrado del fuego y el uso responsable del fuego a nivel regional.

3. Resultados

Los problemas relacionados con los incendios se tratan principalmente dentro de la política forestal como amenazas que afectan los bosques. El desarrollo de políticas forestales, y por tanto de los asuntos relacionados con los incendios, es responsabilidad de los Estados miembros de la Unión Europea. A pesar de que no existe una política forestal común entre los países de la Unión Europea, ésta puede ejercer cierta influencia sobre los Estados miembros y completar sus políticas nacionales.

Otras políticas sectoriales (protección civil, planificación espacial, desarrollo rural y políticas agrícolas) pueden ejercer cierta influencia, directa o indirectamente, en el manejo de incendios debido a la perspectiva amplia de este problema. Sin embargo, puesto que los asuntos relacionados con incendios se desarrollan en términos generales dentro del sector forestal, el análisis se centrará en el marco de la legislación y política forestal de los acercamientos nacionales y europeos.

3.1. Análisis de los instrumentos legales y de política pública de la Unión Europea relativos a los incendios forestales

La política de la Unión Europea se enfoca en el impacto negativo de los incendios forestales en la vida de las personas, las economías locales y el ecosistema forestal. La política contra incendios forestales de la Unión Europea se desarrolló a principios de la década de 1980, con las disposiciones de las ‘reglamentación relativa al fuego’, cuyo énfasis principal eran las medidas nacionales de prevención de incendios forestales y establecer un sistema de información paneuropeo de incendios forestales. El último documento importante de la Unión Europea que resume la política forestal de la Unión Europea, el *Forest Action Plan* [Plan de acción forestal] (2006), reconoce el impacto considerable de los incendios forestales en la condición ecológica y la capacidad productiva de los bosques en la UE. Los principales objetivos claves respecto a los incendios son:

- Trabajar hacia el desarrollo continuo del *European Forest Fire Information System* (EFFIS) [Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales].

- Analizar los factores principales que influyen en la evolución de la condición de los bosques en Europa (incluidos los incendios forestales).
- Fomentar que los Estados miembros formen grupos para estudiar los problemas regionales particulares de los bosques,
- Apoyar la investigación para la protección forestal.

La Agencia Europea de Medio Ambiente planteó, en su último Informe sobre el Estado del Medio Ambiente (2005), que la adopción de un enfoque integrado del manejo de incendios forestales es crucial. La UE ha reconocido el problema de los incendios forestales en una amplia gama de políticas tales como las políticas de biodiversidad, cambio climático, desertificación y energía renovable. A través de instrumentos agrícolas (*FEOGA*⁹) y ambientales (*LIFE+*), la Comisión Europea apoya a los Estados miembros con una variedad de medidas relativas a la lucha (anterior, *ad-hoc* y posterior) contra incendios

3.2. Análisis comparativo de los instrumentos nacionales de legislación y política

Los incendios forestales afectan a millones de personas en todo el mundo y causan grandes impactos económicos en todos los niveles. Sin embargo, los incendios y su frecuencia son diferentes en las regiones europeas. La mayor cantidad de incendios y las zonas quemadas más extensas se registran en los países del Mediterráneo, en el norte de la cuenca. Esta tendencia parece extenderse desde el noroeste hacia el este. Los países de Europa occidental que limitan con el Océano Atlántico, el Canal de la Mancha o el Mar del Norte tienen menos problemas de incendios forestales. Respecto a los países bálticos, el número de incendios y la zona quemada anualmente varía dependiendo mayormente de las condiciones del tiempo. En los países nórdicos (zona boreal), el fuego no es considerado como un problema y la zona quemada anualmente es bastante pequeña. De hecho, en estos países, el fuego ha sido un elemento importante para la silvicultura, la agricultura y el pastoreo.

Estas diferencias regionales justifican el análisis del problema de incendios forestales y su consideración dentro de los diferentes marcos legales y de políticas nacionales en los países europeos considerados en este informe.

3.2.1. Marcos legales para el manejo de incendios forestales

Los marcos legales de los países donde históricamente los incendios han tenido un impacto en el medio ambiente y la seguridad de la población (los países mediterráneos) cuentan con un desarrollo amplio, ya que han aprobado progresivamente instrumentos legales bastante completos para luchar contra los incendios. Sin embargo, en los países del norte, centro y este de Europa, donde los

⁹ El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola

incendios son un problema relativamente reciente, su trato legal es todavía incompleto y se limita, por lo general, a la extinción.

El análisis de los contenidos dentro de la reglamentación nacional de cada país se ha enfocado en:

a) *Reglamentación de prevención de incendios forestales:*

La reglamentación más significativa en términos de volumen e implementación es la de los países mediterráneos; en el resto de Europa (especialmente en Escandinavia), existen muchos casos de disposiciones forestales, pero su propósito explícito (aunque tácito, donde es posible) no es evitar los incendios forestales. En estos países, los esfuerzos de producción continúan prevaleciendo sobre todos los demás. No obstante, en años recientes, los países del noreste y este de Europa han comenzado a desarrollar una producción normativa significativa que busca contener la tendencia ascendente en los incendios forestales ocurridos en años recientes. En este aspecto, Suecia, Lituania, Letonia, Bulgaria, y Polonia son buenos ejemplos. Las diferentes medidas preventivas que se han aprobado pueden sistematizarse de la siguiente manera: mantenimiento del bosque para evitar incendios; división en áreas de riesgo; declaración de temporadas de alto riesgo; actividades peligrosas, medidas preventivas con respecto a infraestructuras o viviendas; quemas controladas; y medidas dirigidas a fomentar la prevención (participación social, educación e investigación).

b) *Reglamentación de la extinción de incendios:*

En general, existe cierto balance entre todos los países europeos y los de la zona del Mediterráneo. En casi todos los países, existe un marco legal relativamente completo para los recursos con los cuales luchar contra los incendios, para la organización de las autoridades pertinentes o para el adiestramiento de las personas a cargo. Los recursos a los que se refieren las normas tienden a ser tradicionales. De hecho, las técnicas de extinción de incendios están previstas de una manera casi anecdótica.

c) *Reglamentación de la quema prescrita:*

A parte de Francia y Portugal, las referencias en otros países son muy vagas (como en Suecia y Polonia). En otros países, como España, este marco legal no ha sido previsto en la legislación nacional básica, con la excepción de algunas regiones autónomas como Cataluña.

Los dos países que han hecho los mayores esfuerzos en pro de la reglamentación de esta cuestión han sido Francia y Portugal. En general, la reglamentación menciona la condiciones para la realización de la quema prescrita; la aprobación del organismo concernido; también se ha previsto la notificación obligatoria a los dueños afectados de la realización de la quema y reglamentación extensa de los conocimientos prácticos y requisitos técnicos necesarios para llevar a

cabo incendios controlados.

Finalmente, se debe llamar la atención a varios aspectos relacionados en otros países. En primer lugar, en Bulgaria esta práctica no se concibe porque cualquier tipo de quema controlada está prohibida. En segundo lugar, en Suecia parece haber algunas iniciativas en cuanto a este asunto, pero van dirigidas al paisaje y el medio ambiente.

d) *Reglamentación de extinción de incendios:*

A parte del caso de España, y con la reglamentación, que es muy limitada, y en Francia, donde los cortafuegos han sido incorporados al marco legal nacional, esta práctica no ha sido materia de reglamentación en ningún otro país. Cuando ha sido regulada, se ha considerado que el uso de cortafuegos es un poder que recae en el director de operaciones, y la intervención de las autoridades es insignificante.

3.2.2. Políticas nacionales de control de incendios

Los esfuerzos políticos han evolucionado recientemente de una política dirigida a las medidas de extinción de emergencia, con altos costos, a la promoción de acciones preventivas a largo plazo. Sin embargo, este objetivo debe estar unido al desarrollo de planes de prevención de incendios acompañados de apoyo financiero. El presupuesto destinado a la extinción y prevención nos adivinar que existe una preocupación política en cuanto a los incendios forestales; no obstante, no existen bases de datos fiables que reflejen las inversiones nacionales, y la información oficial disponible es bastante parcial e insuficiente. En términos generales, los países de la Unión Europea se dan cuenta de la importancia de prevenir incendios en lugar de combatirlos, pero los recursos económicos destinados a la prevención son todavía menos que el presupuesto gastado en la extinción, especialmente en los países mediterráneos.

Los países tienen acuerdos institucionales muy distintos para organizar el manejo de incendios. No obstante, dos tendencias han salido a relucir del análisis del cuestionario: (i) los países en los cuales el servicio forestal es responsable de la prevención y control de incendios (p. ej., Lituania, la mayoría de las regiones de España) y (ii) los países con un sistema mixto, donde las responsabilidades en las acciones de prevención y extinción son asignadas a diferentes organismos administrativos (p. ej., Francia, Portugal).

A parte de la asignación de los roles de prevención y extinción, existen varios agentes que participan en las acciones de manejo de incendios, especialmente en la extinción. En países como Portugal, Chipre y Suecia existen tres o más organismos que participan. En este contexto, la cooperación entre todos estos agentes es esencial para un manejo y control efectivo del fuego. A pesar de que en todos los países un organismo responsable de la coordinación se ha fijado dentro de su campo de acción,

todavía se percibe la falta de coordinación entre todos los agentes como una restricción y un punto sobre el que hay que trabajar.

En el momento de enfrentar un fuego, es muy importante una planificación correcta de las acciones y tener la información completa de la situación en el campo a fin de dirigir las acciones necesarias para la extinción. Todos los países, excepto Lituania, han desarrollado o están desarrollando Sistemas de Información Geográfica para la toma de decisiones.

En relación con la escasa información oficial sobre la participación y la cooperación, se puede concluir preliminarmente que todos los países han tratado de establecer mecanismos de cooperación con las poblaciones locales, principalmente con los dueños de tierras y a través de sociedades locales. En los países con un sistema político descentralizado, todos los esfuerzos para incluir a las partes interesadas en el manejo de incendios forestales se hacen a nivel regional y local (p. ej., España y Suecia). La excepción es Chipre, donde no hay casi participación comunitaria; pero se está fomentando la formación de grupos de voluntarios.

Un asunto clave en los documentos nacionales es la planificación de infraestructuras preventivas y de defensa. Se distinguen dos modelos espaciales diferentes: una red de cortacombustibles donde se reduce la vegetación totalmente y la creación de un mosaico de paisaje heterogéneo con un volumen bajo de combustible y una baja inflamabilidad resistente a la propagación del fuego. La combinación de áreas de cortafuegos con los tradicionales cortafuegos lineales es la opción adoptada por la mayoría de los países (p. ej., España, Portugal, Francia, Chipre, Polonia y Bulgaria). Los tratamientos de combustibles en la interfaz rural-urbana son considerados en Francia, Portugal, Polonia y España para proteger los asentamientos y las áreas de viviendas. Sin embargo, no hay información sobre su reglamentación en los documentos de planificación.

La necesidad de reducir los peligros del fuego a través del manejo activo de combustibles se hace más y más obvia. La silvicultura preventiva es una de las bases para un manejo de incendios exitoso y puede ayudar a entender hasta qué punto las medidas preventivas son fomentadas por los países. La elección de métodos utilizados varía dependiendo de factores tales como el tipo de vegetación y sus características, gravedad del problema del incendio, los fondos disponibles, experiencia y habilidad disponibles, tradición e inquietudes sociales, etc.

Entre los países considerados, existe una tendencia general a utilizar la limpieza mecánica para reducir la acumulación de combustible y en segundo lugar, la manual. Los fitocidos casi no se utilizan. Por otro lado, se está comenzando a promover el pastoreo controlado aunque, por el momento, no es una técnica para el manejo de combustibles muy difundida. Se da en algunas regiones de España y Portugal, y más frecuentemente en Bulgaria y Francia (países mediterráneos).

En Europa, casi no se utiliza la quema prescrita para el manejo de combustibles. Países como Austria, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia no toman en cuenta estas prácticas para el manejo de combustibles en sus documentos de política pública. Francia, Portugal y España aplican estas técnicas a través de planes de prevención de incendios regionales.

Además, se han creado equipos profesionales especializados y programas de adiestramiento. De hecho, recientemente Portugal ha enfatizado la reintroducción de la quema prescrita y para este propósito ha comenzado un amplio programa de adiestramiento de silvicultores y grupos de apoyo. Por otro lado, España ha desarrollado los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales que colaboran con las regiones autónomas en las acciones preventivas. Francia también tiene centros oficiales de adiestramiento para profesionales en el manejo del fuego.

4. Discusión: análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos de los marcos legales y políticas de incendios

Los resultados obtenidos del análisis comparativo de los marcos legales y políticas del manejo de incendios nacionales permiten identificar patrones espaciales (fig. 1) que son útiles para fundamentar el análisis de los puntos fuertes y débiles de las actividades de manejo del fuego en Europa.

Figura 1— Legislación de incendios forestales y política pública

Fuente: Propuesta de J. Goldammer & C. Montiel. Elaborado por J. Solana (UCM, 2007).

Tabla 1—Resultados del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos.

Zonas	Fortalezas & oportunidades	Debilidades & riesgos
Sur de Europa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acciones preventivas emprendidas en el manejo de incendios con un enfoque proactivo (p. ej., España). ▪ Voluntad política en la coordinación entre los distintos organismos administrativos con responsabilidades en el manejo de incendios. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitaciones institucionales en el desarrollo del sector forestal. ▪ Acercamiento burocrático de arriba hacia abajo en el estilo de la política. ▪ En general, hay una falta de procesos participatorios para permitir que las personas que tienen intereses directos en los recursos forestales participen en la toma de decisiones. ▪ Prácticas de quema tradicionales fueron ilegalizadas sin programas de educación previos.
Países nórdicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevalece la tradición consensual en los procesos de las políticas, formulación e implementación ▪ Participación de las partes interesadas. ▪ Transparencia de los procesos políticos: 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dificultades en el liderazgo político. El proceso de descentralización supone que la protección forestal ha dejado de ser responsabilidad del estado, lo que conlleva una reducción en los presupuestos del estado. ▪ Coordinación entre sectores y multinivel:
Países del Atlántico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procesos políticos claros y coherentes. ▪ Un proceso de consulta amplio que ha involucrado la discusión pública, la opinión experta y la aportación de los intereses de los distintos sectores. 	Toda debilidad específica en esta región ha sido identificada.
Países de Europa Central	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las políticas forestales se entienden como procesos iterativos, abiertos y dinámicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No es evidente la existencia de una voluntad política real para lograr un manejo de incendios forestales integrado, debido a que el riesgo de incendios no se percibe como una necesidad social ni como una prioridad política. ▪ La coherencia de los procesos políticos (períodos de tiempo específicos, asuntos y actores para los programas forestales nacionales). ▪ Coordinación. En los países descentralizados, entre el gobierno central y las autoridades regionales (p. ej., Alemania) pero también, cuando las diferentes agencias participantes en el manejo del fuego (p. ej., Austria). Existe una necesidad de mecanismos o técnicas de coordinación para clasificar las disputas jurisdiccionales.
Países del Este de Europa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparencia creciente en los procesos políticos: La nueva Ley Forestal fue aprobada por el Parlamento en Lituania. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación pobre de las partes interesadas. ▪ Falta de tradición de negociación. ▪ Coordinación efectiva: Por ejemplo, en

		Latvia, la responsabilidad del control del fuego recae sobre distintas administraciones públicas.
Unión Europea	<ul style="list-style-type: none"> La UE no tiene una política forestal común debido a que no tiene ninguna responsabilidad legal en cuanto a la política forestal, pero tiene un papel de influencia importante y puede complementar las políticas nacionales y así desempeñar un rol unificador y armonizador en la Unión Las medidas forestales son influenciadas por los desarrollos agrícolas regionales y las políticas ambientales. Sin embargo, se evita que al menos temáticamente las diferentes políticas no coincidan y que ciertamente no se contradigan. La legislación sobre incendios forestales se ha desarrollado durante las pasadas dos décadas. El problema de incendios forestales se reconoce como una amenaza al manejo forestal sostenible, pero también se considera en relación con las políticas de biodiversidad, biomasa y cambio climático. La voluntad a nivel de la UE de financiar proyectos integrados; apertura a considerar nuevos enfoques. La UE tiene organismos institucionales transparentes, abiertos y flexibles donde los expertos, los representantes de la comisión y de los países, y otras partes interesadas tienen la oportunidad de establecer el diálogo. Existen varios niveles de coordinación de políticas: dentro de la Comisión, dentro del Consejo, entre la Comisión y los Estados miembros. 	<ul style="list-style-type: none"> La UE no tiene poderes por encima de los Estados miembros. Esto se puede considerar como una debilidad en los casos en que haya una falta de implementación por parte de las autoridades nacionales/regionales. La política de la UE solo se refiere a ‘incendios forestales’ y medidas de ‘prevención’ y ‘monitoreo’. No hay una posición con respecto al manejo integrado de incendios forestales. La UE reconoce la importancia de las actividades de prevención, extinción y post fuego. Sin embargo, la rehabilitación de las tierras forestales afectadas por el fuego sufren de una baja inversión, según se informa. Existe un Grupo Experto de Incendios Forestales de la UE, compuesto por representantes de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros, pero el grupo puede ser más transparente y abierto a las partes interesadas en los asuntos sobre incendios forestales. Además del impacto de los incendios forestales en el desarrollo rural y en el manejo forestal, el apoyo de las políticas de manejo de incendios puede necesitar más diálogo entre los sectores (p. ej., los aspectos sobre el manejo de recursos, la biodiversidad y el cambio climático).

5. Conclusiones

- La legislación y las políticas son instrumentos claves para la introducción de enfoques y recomendaciones innovadoras en torno al manejo integrado de los incendios forestales.
- Los problemas de los incendios merecen una consideración diferente dentro de la legislación nacional, según: los diferentes ritmos y etapas de desarrollo

de las políticas forestales nacionales y la gravedad del riesgo de incendios en los contextos nacionales. Sin embargo, se han encontrado algunos aspectos comunes, con los matices derivados de los contextos territoriales de cada país, en los países estudiados. El resultado ha sido la identificación de patrones comunes en las políticas de manejo del fuego a escala regional.

- A pesar de las coincidencias, existe la necesidad de armonizar las regulaciones sobre los incendios en toda Europa. Esto contribuiría a lograr una reunificación de las dispersas regulaciones existentes. No obstante, deben haber variaciones según los diferentes países.
- En todos los países, el proceso de evolución del marco legal comienza con la reglamentación de la extinción. A medida que los marcos legales evolucionan y los incendios forestales se vuelven un problema grave, se da más atención a la prevención.
- Aunque la prevención de incendios está ganando importancia lentamente en el contexto de la legislación y la política pública, todavía está subvalorada en comparación con la extinción en los presupuestos nacionales. La prevención es una tarea constante durante el año que cubre varios campos de acción que a veces no tienen el reconocimiento del público; sin embargo, es la forma de evitar situaciones de emergencia y acciones de extinción costosas.
- Las políticas de manejo de incendios adoptadas por la mayoría de los países europeos se han basado en la extinción del fuego; sólo algunos países (Portugal, Francia, España) consideran el uso del fuego junto a los objetivos del manejo forestal, la prevención y la extinción dentro de sus marcos de legislación.
- Con relación a las técnicas de uso del fuego, existe la necesidad de un marco legal básico relativo a las prácticas de contrafuego y una descripción más detallada de las condiciones para desarrollar quemas prescritas.

Referencias

- Dimitrakopoulos, A. & Mitsopoulos I. (2006): **Global Forest Resources Assessment 2005-Report on fires in the Mediterranean Region**. Fire Management Working Papers FM/8/E. FAO Forestry Department. 38p.
- FAO (1999): **Report of meeting on public policies affecting forest fires**, 14th session, Roma, Italia, 28-30 octubre 1998, I. Part 1.
- FAO (2006): **Fire management: Voluntary guidelines-Principles & strategic actions**. Fire management Working Paper FM17E. Roma. 71p.
- FAO (2007): **Fire management - global assessment 2006**. FAO Forestry Paper 151. Roma, 2007. 156p.
- FAO (2001b): **Legal Frameworks for Forest Fire Management: International Agreements and National Legislation**. Follow-up Report to FAO/ITTO International Expert Meeting on Forest FIRE Management, March 2001. Working Paper FFM/3/E. FAO, Roma, Italia.
- Goldammer, J.G. (2000): **Fire Policies: Shaping the institutional Frameworks**. International Forest Fire News No.23, 3-8.
- Hesseln, H. (2006): **An assessment of domestic and foreign wildfire policy** (Inédito).
- Simorangkir, D., Moore, P., Haase, N., Moore, P. (Editors) (2003): **Fires, laws and regulations – Towards best practices for legal aspects of fire**. Project Fire Fight South East Asia (IUCN and WWF). 68p.
- Vélez, R. (2002): **Causes of forest fires in the Mediterranean Basin**. In: Risk management and sustainable forestry. Eds: Arbez, M.; Birot, Y.; Carnus, JM. EFI Proceedings N° 42. September 2001, Bordeaux (Francia). 35-42
- Working Group from the Regional Session (2007): **Self-assessment of the fire situation and fire management capabilities. Conclusions from the Regional Session C: Europe, Southeast Europe, Mediterranean North Africa and Caucasus**. 4th International Wildland Fire Conference, Sevilla, España, 15 mayo 2007.

Puesta en Vigor de un Código de Prácticas Para el Manejo del Fuego en Victoria¹

Aimee Haywood y Rachaele May²

Resumen

En 1995 se desarrolló en Victoria, Australia, un Código de Prácticas para el Manejo del Fuego en Terrenos Públicos. El reto para los encargados del manejo del fuego en Victoria ha sido equilibrar la seguridad de los humanos que viven cerca de los parques y los bosques con las necesidades de la flora y la fauna. El Código de 1995 fue una de las primeras estrategias diseñadas para establecer un marco general de gestión integrada de las actividades relacionadas con incendios forestales y fuegos en los parques y bosques de Victoria. El escrutinio público e importantes lecciones aprendidas de la temporada de incendios 2002-2003 ofrecieron una base sólida para comenzar la revisión decenal programada del Código de 1995.

Durante un período de 18 meses, se llevó a cabo una revisión comprehensiva del Código de Prácticas. La colaboración con la comunidad de Victoria, sus especialistas en incendios forestales y todas las partes interesadas fue esencial para la revisión del Código. El Código recién aprobado en 2006 se está poniendo en vigor en las siete millones de hectáreas de parques y bosques de Victoria y se ha apreciado un gran interés en una aplicación aún mayor del Código de Prácticas por parte de algunos expertos internacionales en incendios forestales. El Código de Prácticas de 2006 establece un marco para la administración pública del manejo del fuego en zonas propensas a incendios forestales, y la participación de la comunidad ofrece la base para el éxito de los esfuerzos de prevención, supresión y recuperación tras un incendio. El Código vincula el manejo de los incendios forestales con el uso activo del fuego para propósitos ecológicos y contribuye a las estrategias de manejo de los incendios forestales.

Palabras clave: Código de Prácticas, manejo de incendios, supresión, participación de la comunidad, prevención de incendios forestales.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Funcionarias de Land and Fire Management, Department of Sustainability and Environment, [Administración de Terrenos e Incendios, Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente] PO Box 500, East Melbourne, Victoria, Australia 3002 (e-mail: aimee.haywood@dse.vic.gov.au)

Introducción

El estado de Victoria está localizado en la región más austral del área sureste del continente australiano. Aunque Australia es un continente árido y propenso a incendios por naturaleza, la geografía, el clima y la vegetación de la región sureste la convierte en una de las zonas del mundo con incendios más severos, al igual que el sur de Francia y el sur de California. El fuego, tanto en su aspecto de evento natural como en su aspecto de método empleado por la población indígena de Australia, ha tenido una función importante en la formación de gran parte de los ecosistemas australianos.

Muchas de las especies australianas de flora y fauna dependen de los incendios forestales como parte de su ciclo de vida. Típicamente, los ecosistemas autóctonos de Victoria consisten de vegetación esclerófila que a menudo requiere de incendios forestales para provocar la caída de las semillas, el florecimiento o la germinación. Muchas especies de plantas han adoptado la regeneración vegetativa a través de brotes epicórmicos y raíces gruesas y resistentes de forma tal que ni los más severos incendios puedan matarlas. La interacción específica entre los ecosistemas y los incendios forestales depende de la frecuencia, la temporada y la intensidad del incendio forestal junto con la etapa de la vida en que se encuentren especies claves de ese ecosistema.

Los terrenos públicos de parques nacionales, los bosques estatales y otras reservas de Victoria son el hábitat de especies reconocidas nacional e internacionalmente que son poco comunes y están amenazadas de extinción. El manejo de los incendios tanto naturales como provocados por el hombre dentro de estas siete millones de hectáreas es responsabilidad del Victorian Department of Sustainability and Environment [Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente del estado de Victoria]. La legislación de Victoria asigna claramente al Departamento la responsabilidad de la prevención y supresión de los incendios forestales en terrenos públicos, y una responsabilidad similar con respecto a los terrenos privados rurales recae sobre el Country Fire Authority [Autoridad de Incendios Australiana].

Como administrador de los terrenos públicos, el Departamento debe reducir primordialmente la incidencia y severidad de los incendios forestales en los terrenos de propiedad pública a la vez que crea un balance entre la necesidad de proteger la vida humana y la propiedad y el uso o la exclusión del fuego para mantener la salud del ecosistema. Cada vez más personas deciden vivir en áreas adyacentes a parques y bosques; con esto, crece la expectativa de que los encargados de administrar los terrenos públicos asuman parte de la responsabilidad de los riesgos de incendios forestales asociados con el medio ambiente natural.

Por consiguiente, se requiere un abarcador conjunto de estándares y principios para asegurar que se ejecuten prácticas de manejo de incendios sólidas en los terrenos públicos de Victoria. El “Código de Prácticas para el Manejo del Fuego en Terrenos Públicos” de la ciudad de Victoria se estableció con el fin de proveer una estructura sólida para el manejo integrado de incendios. El Código ayuda a reconocer y balancear los objetivos a menudo contrapuestos del manejo de incendios forestales: la función del fuego en el mantenimiento de la diversidad biológica, las respuestas de los diferentes ecosistemas al fuego, los patrones naturales de sucesión y el riesgo que suponen los incendios forestales a la vida humana y la propiedad.

El Código de Prácticas garantiza que el Departamento cumpla con las obligaciones asignadas por ley y a la vez provee una base para replicar a los críticos y apoyar a las personas que ponen en función las medidas. También establece los estándares sobre los cuales fundamentar los planes contra incendios y esboza las instrucciones para los requerimientos operacionales.

Se desarrolla un Código de Prácticas

En 1995, comenzó a desarrollarse un Código de Prácticas para el Manejo del Fuego en los Terrenos Públicos tras un significativo número de incendios y el aumento en el interés de la comunidad acerca de cómo se manejan los incendios. Los fundamentos del primer Código de Prácticas eran:

- Establecer una política coherente y uniforme;
- Definir claramente e integrar a cabalidad los procesos de planificación para todos los usos deliberados del fuego;
- Garantizar que se considere cuán adecuados son los regímenes de incendio para el mantenimiento y vigor de la flora y fauna autóctona; y
- Promover un estándar de incendios elevado y uniforme, basado en prácticas documentadas.

Luego de un vasto proceso de desarrollo y consulta, el Código de Prácticas original se publicó en diciembre de 1995 con el propósito principal de:

“... Promover un manejo de incendios eficiente, efectivo e integrado así como actividades relacionadas con los incendios en terrenos públicos con el propósito de proteger la vida humana, la propiedad, los bienes, y los valores medioambientales de los efectos dañinos de los incendios forestales o los regímenes de incendios inadecuados...” (CNR, 1995)

El Código de Prácticas fue el documento sombilla bajo el cual se desarrollarían todos los Planes contra Incendios, y su cumplimiento fue un requisito para todas las actividades relacionadas con los incendios en los parques y bosques del estado de Victoria.

Se lleva a cabo una revisión

El Código de Prácticas fue un documento rotundo y duradero, ampliamente respetado durante los primeros diez años de su puesta en vigor, tanto en Australia como en el ámbito internacional. En un Informe de Auditoría sobre la Prevención y Preparación contra Incendios realizada en 2003, el Auditor General del estado de Victoria reconoció que el Gobierno Estatal de Victoria era "... respetado por demostrar una de las mejores prácticas en la industria a través del Código..." (Auditor General, 2003)

El Código de Prácticas de 1995 disponía que se revisara a los diez años de su aprobación. Conforme a esa obligación, en enero de 2005 comenzó una revisión del Código. Esto ocurrió tras una importante temporada de incendios forestales que abrasó más de un millón de hectáreas de terreno durante un período de cincuenta y nueve días. La Investigación posterior de los incendios forestales de los años 2002-2003 en Victoria, conducida por el Comisionado de Servicios de Emergencias de ese estado, culminó con una lista de recomendaciones relacionadas, tanto directa como indirectamente, con el Código de Prácticas.

Desde la etapa inicial se reconoció que la participación de la comunidad en la revisión del Código era esencial. Sin la ayuda de la comunidad, el Código de Prácticas no perduraría por los próximos diez años ni cumpliría con las expectativas de las partes interesadas y los propietarios de terrenos. La colaboración con la comunidad de Victoria durante la revisión establecería el estándar para la consulta continua con la comunidad más amplia de Victoria respecto a los asuntos relacionados con el manejo de incendios.

Junto al deseo de trabajar con la comunidad, era necesario emprender una serie de obligaciones legislativas como parte del proceso de revisión. El requisito de que se hicieran presentaciones públicas sobre el Anteproyecto del Código de Prácticas Revisado se satisfizo fácilmente en la estrategia de consulta general.

Grupos asesores

En los comienzos del proyecto, se estableció una lista de grupos asesores para que contribuyeran de manera activa con la revisión del Código de Prácticas. Entre sus miembros, se incluían agencias contra incendios, encargados de parques nacionales, especialistas en meteorología, en el comportamiento de los incendios, en ecología de los incendios, en planificación reglamentaria, especialistas en agua, en manejo de bosques, en operaciones contra incendios, en recuperación tras un desastre así como miembros de los grupos de interés. Todos estos representantes contribuyeron de forma directa en cada etapa del proyecto.

Se diseñó un plan de proyecto para el proceso de revisión en colaboración con estos grupos asesores. Para asegurar que se recibieran aportaciones tanto formales como informales durante todas las etapas del proceso de revisión, se identificaron al

comienzo dos pasos clave en el proyecto. Un primer documento de consulta sería seguido de un Anteproyecto de Código de Prácticas Revisado.

Propuesta

En los comienzos del proceso de revisión, se desarrolló un documento de consulta para conocer la opinión de la comunidad más amplia de Victoria, las organizaciones contra incendios asociadas y los grupos interesados. El documento se centró en los asuntos clave que, desde la implementación del Código de Prácticas en 1995, habían cambiado significativamente o se había identificado la necesidad de atender. Los temas de discusión se describieron brevemente; luego se hizo una lista de preguntas y se invitó a la comunidad a contestarlas.

Se recibieron alrededor de setenta presentaciones en torno al documento de consulta, de parte de propietarios de terrenos colindantes, universidades, grupos partidarios, organizaciones contra incendios asociadas y otros cuerpos industriales. En general, la mayoría de las presentaciones concordaron en que, aunque algunas secciones del Código de Prácticas necesitaban ponerse al día, la mayoría de los problemas surgieron a causa de la falta de uniformidad en la implementación o en la no implementación del Código. Áreas de interés particular en las respuestas de los participantes incluyeron la necesidad de mejorar la educación y la participación de la comunidad, la relación entre los encargados del manejo y sus asociados, en particular los oriundos del área, y el monitorizar y reportar los incidentes, especialmente a la comunidad.

Anteproyecto del Código de Prácticas Revisado

El análisis de las presentaciones a la Propuesta junto con la reacción de los grupos asesores y las reuniones con la comunidad culminaron en el Anteproyecto del Código de Prácticas Revisado. Este documento se distribuyó ampliamente entre las partes interesadas, los grupos de interés y la comunidad más amplia del estado de Victoria para que dieran su opinión.

Se recibieron más de 100 presentaciones formales en torno al Anteproyecto. Aunque se presentó un abanico de opiniones e ideas, los temas más comunes que surgieron para enmiendas incluyen:

- que la comunidad participe más en todas las etapas del manejo de incendios;
- que haya un mayor énfasis en buscar y utilizar el conocimiento local en la planificación para el manejo de incendios y el manejo de incidentes;
- que se definan mejor los procesos de planificación para el manejo de incendios;
- que se demuestre un vínculo con el manejo de incendios en terrenos privados;

- que se creen requisitos de auditoría más estrictos para garantizar la implementación en conformidad con el Código de Incendios Revisado; y
- que se enmienden las Zonas de Manejo de Incendios.

Figura 1– Zonas de Manejo de Incendios (Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente, DSE, 2006)

Un Código de Prácticas actualizado

El insumo de la comunidad fue un componente vital del proceso de revisión. Se fomentó la participación de las organizaciones contra incendios, los grupos interesados y la comunidad más amplia del estado de Victoria en diversas etapas a lo largo de la revisión. Para el desarrollo del documento final, se analizó y se tomó en consideración la información obtenida de los individuos, las organizaciones, las reuniones públicas, las presentaciones en torno al documento de consulta y al Anteproyecto, así como las opiniones de científicos y técnicos expertos. En febrero de 2006, el Parlamento de Victoria aprobó el Código de Prácticas revisado, y lo publicó oficialmente en septiembre de 2006, revocando el Código de Prácticas de 1995. El Código revisado establece los estándares estatales mínimos para el manejo de incendios en terrenos públicos (DSE, 2006).

El Código de Prácticas revisado incorporó la ciencia actualizada en el manejo de incendios, incluso los efectos del fuego en la biodiversidad. El Código garantiza la integración con la protección contra incendios en terrenos privados y atiende algunas de las recomendaciones surgidas tras la Investigación de 2002-2003 de los incendios forestales en Victoria realizada por el Comisionado de Servicios de Emergencias de esa ciudad.

Se presentan algunos cambios significativos en la versión revisada del Código de Prácticas para el Manejo del Fuego en Terrenos Públicos. La función dual que tiene el gobierno estatal, tanto como administrador de los terrenos públicos y como

organización de servicio para la supresión de incendios, quedó más claramente definida y se establecieron los cimientos para la participación comunitaria.

El mantener tanto un esquema de manejo de calidad (típicamente “metas-planificación-implementación-revisión”, ver figura 2) como uno de protección contra incendios (Prevención, Preparación, Respuesta y Recuperación) es un elemento clave de la integridad del Código de Prácticas revisado. La investigación es un requisito de de todas las secciones del Código de Prácticas.

Usando el esquema de manejo de calidad como base, el Código de Prácticas se desglosa en cinco secciones clave: Principios abarcadores, Planificación, Manejo de la quema de terrenos, Incendios forestales y Cumplimiento. Cada una de estas cinco secciones contiene principios fundamentales, un componente de planificación, una sección de implementación y un requisito de revisión. Este esquema de manejo de calidad aplica a todo el documento, lo que permite una realimentación y revisión constante para asegurar la efectividad de la implementación.

Figura 2— Ciclo de “Metas-Planificación-Implementación-Revisión” ilustrado al inicio de cada capítulo y que refuerza la totalidad del Código. El recuadro en negrilla indica el contenido de cada sección.

Principios abarcadores

Los principios generales del manejo de incendios en terrenos públicos quedan establecidos al comienzo del documento para tratar el riesgo que supone un incendio forestal, guiar el uso de la quema prescrita y hacer previsiones para el cumplimiento de los objetivos integrados del manejo de incendios. Específicamente, establecen los requisitos mínimos respecto al manejo del riesgo, la quema prescrita (operaciones), la protección contra incendios (prevención, preparación, respuesta y recuperación), el manejo del medio ambiente y el asociarse con la comunidad. El asociarse con la

comunidad y los principios de la participación se añadieron a los principios abarcadores para reflejar el compromiso del Departamento de mejorar su relación con la comunidad. Además de estos principios añadidos, se reconoce que debe incluirse el conocimiento local en todos los equipos de manejo de incidentes y que se debe fijar como objetivo durante las operaciones de planificación a través de todo el año.

Planificación

La sección de Planificación esboza la estructura bajo la cual se persiguen los objetivos de protección contra incendios, así como otros objetivos de manejo de terrenos, de manera planeada e integrada. Reconoce el concepto del manejo de incendios genuino que incluye tanto las estrategias de protección contra incendios como las estrategias de ecología de incendios.

Los Planes Estratégicos para el Manejo de Incendios se describen para cada sector administrativo de Victoria. Estos planes decenales deben incluir metas específicas, objetivos y estándares para el uso integrado y la exclusión del fuego y así lograr la protección de los bienes, el manejo adecuado del combustible y los objetivos ecológicos y culturales. Está establecido que los Planes para el Manejo de Incendios tienen que mostrar claros enlaces con las estrategias de protección contra incendios en la propiedad privada (la tenencia de la tierra que va más allá de la jurisdicción del Código de Prácticas) e incluir un elemento de monitorización y evaluación para examinar si se están logrando los resultados esperados del manejo de incendios.

Los Planes Operativos contra Incendios también deben ser preparados anualmente en concordancia con los Planes Estratégicos para el Manejo de Incendios para un área en particular. Los Planes Operativos contra Incendios incluyen un programa prospectivo de tres años para la quema prescrita y un programa para los otros trabajos de preparación. La naturaleza anual de estos planes ofrece mayor flexibilidad para acceder a los trabajos planificados durante un período de tres años si, por ejemplo, los trabajos del primer año no pueden cumplirse a causa de restricciones climatológicas.

La clave de la planificación contra incendios en el Código de Prácticas revisado es el concepto de dividir en zonas todos los terrenos públicos según las prioridades ecológicas y de protección contra incendios de un área en particular. Como respuesta a las recomendaciones del Comisionado de Servicios de Emergencias respecto a la revisión de las zonas establecidas en el Código de Prácticas original, se redujo la cantidad de zonas de manejo de incendios de cinco a cuatro. Según se describe en el Código de Prácticas revisado, las cuatro zonas presentan objetivos claros de manejo de incendios para la protección de bienes, la moderación estratégica de los incendios forestales, el manejo ecológico o la eliminación de la quema prescrita.

El fuego en el manejo de terrenos

El primer capítulo de “implementación” esboza los requisitos pertinentes a la quema prescrita en los terrenos públicos. En Victoria, la quema prescrita se utiliza para lograr cualquiera de los siguientes tres objetivos: reducir los niveles de combustible para la protección contra incendios, estimular la regeneración de especies de árboles tras la tala para obtener madera, y mantener o mejorar los ecosistemas nativos. Los estándares operacionales y las pautas para llevar a cabo quemas prescritas se describen en esta parte del Código de Prácticas. Esto incluye la autorización, la ignición, el patrullaje, la rehabilitación y la monitorización continua del área en donde se efectúa la quema prescrita.

Los incendios forestales

El Segundo capítulo de “implementación” establece los estándares mínimos y las pautas para lidiar con la amenaza de un incendio forestal en los parques y bosques de Victoria. Aquí se aplica la estructura de Prevención, Preparación, Respuesta (Supresión) y Recuperación para la protección contra incendios.

Prevención

En esta sección, se describen todas las actividades relacionadas con la minimización de la incidencia de incendios forestales, en particular los de origen humano. Esto incluye operaciones para educar, prevenir y velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código.

Preparación

En esta sección del Código de Prácticas, se describen todas las actividades relacionadas con la preparación contra los incendios forestales, tales como: el manejo del combustible (incluida la aplicación de las Zonas de Manejo de Incendios), los medios aéreos y de carretera, el adiestramiento del personal, las comunicaciones, los estándares de los equipos y la detección de los incendios.

Respuesta (supresión)

El capítulo acerca de la supresión de incendios forestales en el Código de Prácticas hace referencia a todas las actividades relacionadas con limitar la propagación del incendio forestal luego de su detección y lograr que el incendio forestal sea seguro. Esto incluye la salud y seguridad tanto del personal como de la comunidad, el despacho de los recursos, la planificación del incidente, la coordinación inter-organizacional, las pautas operacionales (entre ellas, los estándares medioambientales) y la investigación del incendio.

Recuperación

Esta sección del Código de Prácticas describe todas las actividades relacionadas con la recuperación tras el impacto de los incendios forestales, lo que incluye la rehabilitación tras los disturbios causados por la supresión, la normalización de la comunidad y la interrogación del personal.

Cumplimiento

El capítulo que concluye el Código de Prácticas revisado para el Manejo de Incendios en Terrenos Públicos complementa el elemento final de la estructura de manejo de calidad –la etapa de revisión –. El cumplimiento del Código de Prácticas se lleva a cabo mediante archivos, investigaciones, monitorización continua y requerimientos comprehensivos de auditoría externa. El Código de Prácticas revisado expone en detalle un proceso de auditoría más frecuente y estricto, con auditorías internas anuales y auditorías externas cada cinco años. Esto se vincula con la mejora a los aspectos de participación comunitaria del Código de Prácticas, mientras que los resultados de las auditorías se hacen públicos a la comunidad para asegurar que se lleve a cabo un proceso abierto y transparente y que se implemente el Código en todo el estado de manera adecuada y uniforme.

La nueva dirección se pone en vigor

La puesta en vigor del Código de Prácticas revisado se centró inicialmente en educar al personal del manejo de incendios acerca de las nuevas prácticas y principios comerciales. Se suministró un ejemplar del Código de Prácticas revisado y una sinopsis de los cambios clave a todos los miembros de los grupos asesores, y a aquellos individuos o grupos que hubiesen participado en cualquier etapa del proceso de revisión. Para completar el proceso de participación que comenzó durante la revisión, la implementación del Código de Prácticas revisado incluirá sesiones de información pública para brindar detalles de las enmiendas y para informar que en el futuro habrá cambios en la manera en que el Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente (y otras organizaciones asociadas) lleva a cabo las operaciones de manejo de incendios y proveerá oportunidades para plantear preguntas.

Muchos de los cambios en el Código de Prácticas revisado reflejan mejoras en la práctica operacional que ocurrieron durante los diez años transcurridos desde la aprobación y publicación del documento original. Otras reflejan hacia dónde el Departamento desea encaminarse en el futuro. El Código de Prácticas también puede utilizarse para ayudar a implementar “Las pautas voluntarias para el manejo de incendios: principios y acciones estratégicas” de la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La naturaleza integrada y abarcadora del Código de Prácticas mantiene a Victoria entre los líderes del manejo de terrenos públicos tanto en Australia como en el mundo.

La superación de los retos y el camino a seguir

El Código de Prácticas revisado fue aprobado hace más de un año, no obstante solo ha sido puesto en vigor por aproximadamente ocho meses. Estos primeros ocho meses han sido algunos de los más significativos que han vivido en tiempos recientes los administradores de los terrenos públicos y las organizaciones contra incendios de Victoria.

Durante la temporada de verano de noviembre 2006 a febrero 2007, se incendiaron más de 1.2 millones de hectáreas en una serie de incendios forestales intensos y de gran magnitud que perduraron por 69 días. La mayoría de estos incendios forestales comenzaron a causa de tormentas eléctricas y vegetación quemada y extremadamente seca producto de una sequía que afectó a muchas áreas durante diez años. Fue la segunda vez en cuatro años que Victoria sufrió la quema de más de un millón de hectáreas en un solo verano. Esto supone un gran reto a los administradores de los terrenos públicos, los servicios contra incendios y la comunidad que reside en estas zonas.

Uno de los retos de la puesta en vigor del Código de Prácticas es educar a la comunidad para minimizar la confusión acerca de los nuevos conceptos de la planificación contra incendios. El Código de Prácticas revisado describe los Planes para el Manejo de Incendios que incorporan tanto la protección contra incendios como las estrategias ecológicas. Estos son más abarcadores que los Planes para el Manejo de Incendios descritos en el Código de Prácticas original. También, se toma en consideración el manejo de los incendios forestales naturales que están siendo utilizados para alcanzar los objetivos del manejo de incendios en concordancia con el Plan para el Manejo de Incendios actual.

Además, se hace evidente que la participación, cada vez mayor, de las comunidades en el manejo de incendios en terrenos públicos está, en algunos casos, creando divisiones entre las mismas comunidades. Al iniciar la discusión acerca de los trabajos del manejo de combustible, las técnicas de supresión de incendios forestales y las necesidades ecológicas, se ha educado más a la comunidad y ha aumentado (cada vez más) su deseo de informarse. En algunos casos, esto ha sacado a la luz pensamientos encontrados dentro de una comunidad, lo que contribuye activamente a la emergente “cultura de la culpa” que se asocia con los desastres naturales.

Los períodos prolongados de poca lluvia, que aminoran la posibilidad de llevar a cabo programas de quema prescrita seguros, junto con el aumento en la migración de

las comunidades hacia los límites de la periferia urbana, han significado un aumento en el riesgo adverso que presentan los incendios forestales a la vida humana y la propiedad. En el caso de los recientes incendios en Victoria, existe mucha controversia tanto en la comunidad como en los medios de comunicación sobre la manera más efectiva de manejar los incendios en los parques y bosques. En el ámbito público, se han suscitado abiertas y fuertemente discutidas polarizadas en torno a las prácticas de reducción de combustible. Los administradores de los terrenos públicos reconocen que los eventos de incendios forestales severos, en una región que es por naturaleza propensa a incendios, posiblemente aumentarán a medida que se acentúan los efectos del cambio climático.

Resumen

La puesta en vigor absoluta del Código de Prácticas continuará con el desarrollo de la estructura de los Planes para el Manejo de Incendios y así ayudar a cambiar los Planes de Protección contra Incendios y adelantar la definición de la política pública para establecer la versión de Victoria de “las Políticas de Uso de los Incendios Forestales”. Se espera que se complete a mediados del año 2008, antes de la temporada de incendios 2008-2009. Es necesario que la comunidad más amplia de Victoria juegue un papel activo en la implementación del nuevo Código de Prácticas, el cual reconoce una responsabilidad compartida del riesgo de incendios forestales e intenta conseguir el escrutinio público con el fin de monitorear las prácticas de manejo de incendios.

Durante los próximos años, se espera reunir más información acerca del posible impacto del cambio climático sobre el manejo de los incendios forestales y los cambios ecológicos. Por lo tanto, se debe considerar adelantar la próxima revisión del Código de Prácticas para reflejar cualquier información nueva y la necesidad de hacer cambios significativos en el pensamiento estratégico relacionado con el manejo de incendios. La implementación exitosa del Código revisado dependerá de cuán dispuesto se esté a aprender de los incendios extensos y prolongados recientes, de las prácticas pasadas, a pensar en el futuro y a escuchar las expectativas de la comunidad.

Reconocimientos

Agradecemos al personal, las partes interesadas y los miembros de la comunidad que contribuyeron con sus comentarios a la elaboración del Anteproyecto del Código y a todos los que participaron en los Grupos Asesores durante la revisión del Código de 1995 en el año 2005.

Referencias

Auditor General Victoria. 2003. **Fire Prevention and Preparedness**. Melbourne, Victoria: Crown (State of Victoria).

Department of Conservation and Natural Resources (CNR). 1995. **Code of Practice for Fire Management on Public Land**. East Melbourne, Victoria: Crown (State of Victoria).

Department of Sustainability and Environment (DSE). 2006. **Code of Practice for Fire Management on Public Land (Revision No 1)**. East Melbourne, Victoria: Crown (State of Victoria).

Modelización de Decisiones para el Análisis de Incidentes de Fuego¹

Donald G. MacGregor² y Armando González-Cabán³

Resumen

Este trabajo da cuenta de los métodos de representar y modelizar los resultados de incendios basándose en conceptos y modelos de las ciencias del riesgo y la toma de decisiones. Un conjunto de técnicas de modelización se emplean para caracterizar procesos clave de decisiones de manejo del fuego, que ofrecen un análisis para el manejo del incidente. Los resultados de estos métodos pueden emplearse con el fin de ayudar a entender la estructura de la toma de decisiones en el manejo de fuegos, incluidas las influencias y los factores clave en la toma de decisiones. Los métodos se aplican a dos incidentes para ilustrar las diversas fases de la toma de decisiones en el manejo de fuegos. Ambas aplicaciones identifican puntos críticos de decisión que influyeron en el resultado de los incidentes, entre ellos (a) la importancia de generar y analizar el peor de los casos posible, (b) la accesibilidad y utilidad del conocimiento local del manejo de fuegos, (c) los efectos de las diferencias individuales en la toma de decisiones durante el ataque inicial y el ataque extendido y (d) discontinuidades en los procesos de toma de decisiones en el manejo de fuegos.

Palabras clave: Análisis de incidentes, análisis de riesgo, modelizaciones de decisiones.

Introducción

A pesar de que los incendios grandes son relativamente raros, suelen conducir a un alto nivel de análisis tras el incidente para determinar: (a) las posibles causas y atribuciones de los resultados catastróficos y (b) las medidas que se pueden tomar para prevenir o mitigar incidentes similares en el futuro. Es necesario dar cuenta del incidente desde el punto de vista de las decisiones y los factores de estas decisiones que influyeron en el resultado.

El foco principal de esta investigación es desarrollar un método para el análisis de los incidentes de fuego desde el punto de vista de los principios de la toma de

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de Abril –2 de Mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

²Presidente, MacGregor-Bates, Inc., 1010 Villard Avenue, PO Box 276, Cottage Grove, OR 97424; email: donaldrm@epud.net.

³Economista Investigador, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EE. UU., Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Riverside, California 92507; email: agonzalezcaban@fs.fed.us.

decisiones. Se utilizará el lenguaje del análisis de decisiones y de riesgo como base para representar la relación entre la toma de decisión para el manejo de fuegos y los resultados de los incidentes. El enfoque básico está plasmado en uno de los conceptos principales del análisis de decisiones, la descomposición. En el mismo, los problemas complejos se entienden mejor cuando se dividen o se “descomponen” en problemas pequeños y manejables, los que se pueden resolver o caracterizar con cierto detalle. La descomposición es el principio fundamental en el cual se basan el análisis de decisiones y el análisis de riesgos (Frohwein y Lambert 2000, Haimen 1998, Keeney y Raiffa 1976, Raiffa 1968) y se ha aplicado a otros contextos como el pronóstico de sentencias (Armstrong 2001, MacGregor 2001).

La toma de decisiones en el manejo de fuegos grandes es un fenómeno de múltiples capas y tiene características de toma de decisiones a nivel organizacional y a nivel individual. En primer lugar, se desarrolla un concepto general de la descomposición del incidente y se identifican capas escalonadas de factores sociales, organizacionales e incidentales que influyen en las decisiones específicas de los incidentes y en los resultados de las decisiones. Un grupo de teorías y modelos pertinentes, relacionados con la toma de decisiones dinámica, sirve como base para identificar conceptos y principios valiosos para explicar o caracterizar decisiones relativas a incidentes. Entonces, se aplica este desarrollo teórico a la descomposición de un incidente en términos de un modelo de esquema del incidente, en el cual los eventos relacionados con el incidente se hilvanan en una secuencia temporal y se representan conforme a un grupo de conceptos y principios identificados en la perspectiva general de los modelos. La estructura de un incidente está constituida por dos fuentes generales de información: la documentación generada como parte del incidente y un acercamiento de protocolo para personal clave del incidente. Este enfoque general se puede ver en el contexto de estudios de caso para ilustrar cómo el lenguaje y los modelos de la teoría de las decisiones pueden transferirse y aplicarse a decisiones clave en incidentes de fuego reales.

Un modelo general para la descomposición de los incidentes

La descomposición de un incidente de fuego requiere una estructura guía que identifique los factores que influyen en las decisiones y resultados de los incidentes. Un esquema de descomposición representa las decisiones y resultados de los incidentes como la consecuencia de factores específicos a un incidente al igual que factores e influencias presentes en niveles contextuales organizacionales y sociales más altos (*fig. 1*).

Figura 1 – Modelo general de descomposición de un incidente. Adaptado de Paté-Cornell (1993)

El esquema se compone de múltiples niveles de influencia, empezando en un nivel social amplio que incluye leyes, estatutos y valores culturales (S_i 's en el modelo). Estas influencias generales son exteriores a la organización pero influyen en las meta decisiones organizacionales (O_i 's en el modelo) en las que figuran: políticas públicas, planes y procedimientos que establecen una estructura contextual organizacional que muestra cómo las decisiones específicas de un incidente son estructuradas y evaluadas. Las decisiones específicas de un incidente se presentan en el modelo como un grupo de alternativas ($A_{i,j}$'s) asociadas a decisiones que están ligadas a una dimensión temporal relacionada con el incidente. En el transcurso de un incidente dado, surge una cantidad de tales situaciones de decisiones y se les puede dar una localización temporal. Igualmente, a los resultados y los efectos de las decisiones (E_i 's) se les puede dar también una localización temporal. En un análisis de incidente real, los resultados y los efectos de las decisiones están ligados a decisiones subsiguientes. Los elementos esenciales del modelo pueden ser presentados como un diagrama de influencia que muestra la relación entre los componentes de cada nivel. Los diagramas de influencia son una representación visual que ilustra la relación entre los componentes de un problema de decisión (ej. Oliver y Smith 1990). Las flechas entre los componentes indican una *influencia*, y una influencia expresa conocimiento acerca de la pertinencia. No está implícita, necesariamente, una relación causal, pero una influencia ejerce una fuerza tal que el conocer más acerca de A afecta directamente nuestras creencias o expectativas acerca de B.

Figura 2 – Representación mediante diagrama de influencia de una decisión sobre la respuesta de manejo inicial basada en el “viejo fuego” del bosque nacional de San Bernardino, octubre, 2003.

Influencias de toma de decisiones dinámicas en los resultados de las decisiones

Modelos basados en señales

El modelo de lente (Cooksey y Freebody 1985, Cooksey 1996) es un modelo general de juicio basado en múltiples señales. El modelo de lente establece una distinción entre un ambiente de información que se representa mediante una colección de señales y la representación psicológica de ese objeto desde el punto de vista de una decisión o juicio fundamentado en dichas señales.

La importancia de la modelización de decisiones basadas en el enfoque de señales es su énfasis en elementos de información discretos en el ambiente de decisión y en los procesos de reconocimiento que emplea el individuo que toma las decisiones para seleccionar y sopesar la información cuando elabora una decisión. Estos procesos dependen en gran medida de recursos de atención y a la capacidad para concentrarse en la información más pertinente en un ambiente que está en constante cambio dinámico, al igual que rechazar o filtrar información inservible, redundante o no confiable. Un aspecto importante en la toma de decisiones basada en señales es la capacidad que tiene la persona que toma las decisiones de reconocer información que no está presente en el ambiente pero que debía estarlo. Otras teorías relacionadas también conceptualizan la toma de decisiones desde el punto de vista de

la relación entre el individuo que toma la decisión y el ambiente de la decisión, dando cuenta de la ejecución de la decisión en términos de señales cruciales que suscitan el reconocimiento de situaciones de decisión que requieren comportamientos o actuaciones específicas (e.g., Klein y otros 1989).

Modelos de teoría del control

Un tipo de modelo de decisión que es importante en los ambientes dinámicos es el modelo de teoría del control (Weiner 1948, Sheridan y Ferrell 1981, Wickens y Hollands 2000). Los modelos de teoría del control conceptualizan al humano que toma decisiones como un sistema de circuito cerrado que ejerce control a través de un conjunto de procesos cuyo producto tiene un impacto en el ambiente (*fig. 3*). Los efectos ambientales de los procesos regresan a la persona que toma las decisiones a través de una curva de retroalimentación negativa, en la que se comparan con uno o más puntos de referencia. Los resultados de la comparación dan una señal de error que es interpretada por la persona que toma las decisiones en términos de opciones disponibles de control o de decisión para lograr un cambio ambiental en la dirección apropiada.

Figura 3 – Representación basada en la teoría del control de la toma de decisión de ataque inicial/ataque extendido en el incendio de Fork, Bosque Nacional de Mendocino, agosto, 1996.

Los puntos de referencia son condiciones que sirven de indicador mediante el cual se comparan los efectos en el ambiente. Los puntos de referencia pueden establecerse de distintas formas, entre ellas: directrices, políticas públicas, elementos de los escenarios de entrenamiento, señales en el ambiente (ej. el comportamiento del fuego) y condiciones afectivas y emocionales del individuo que toma las decisiones.

Un segundo concepto clave es el de *mecanismo comparador* mediante el cual la

persona que toma las decisiones evalúa el efecto del producto de los sistemas bajo su control, en lo que respecta a la magnitud y el significado de las desviaciones y diferencias con respecto a un punto de referencia. Cómo las desviaciones de los puntos de referencia se evalúan en el proceso comparador con respecto a las *ganancias versus las pérdidas* puede tener un impacto dramático en el comportamiento decisional.

Modelos de producción

Una clase de modelo importante relacionada con la teoría del control son los *modelos de producción*. Estos representan a la persona que toma decisiones en el contexto de un ambiente procesal o productivo que se orienta a una meta u objetivo. Se puede considerar que las organizaciones de manejo de fuegos actúan conforme a un modelo de producción. Los diversos procesos sistémicos (ej. procedimientos, planes, comunicaciones internas) tienen como resultado *productos* que son resultado del sistema de producción. Estos resultados incluyen decisiones, acciones y comunicaciones que se supone que tengan un efecto en el ambiente en el que opera el sistema (ej. incidentes de fuego). El impacto del sistema de producción en el ambiente actúa como un circuito cerrado de retroalimentación al insumo del sistema, controlando así sus acciones (Powers, 2005). En esencia, los sistemas de producción son un *sistema cibernético de control* para el cual el producto del sistema sirve de base a la evaluación de cuán bien los procesos sistémicos (ej. decisiones de manejo del fuego) están cumpliendo con las metas y objetivos del sistema (ej. control del perímetro).

Figura 4 – Modelo de sistema de producción de operaciones actuales de un equipo de manejo de incidentes basado en el Fork Fire, Bosque Nacional de Mendocino, agosto, 1996.

Resumen

El objetivo de esta línea de investigación es utilizar los conceptos, modelos y el lenguaje de la toma de decisiones para caracterizar los procesos de decisión en fuegos grandes. En la búsqueda de este objetivo, se ha descrito una gama de conceptos y modelos de decisión, y se han aplicado sus lenguajes de modelización a las decisiones tomadas en los dos estudios de caso que sirven como ejemplo de cómo se puede representar mejor las bases sobre las cuales el personal de manejo de fuegos toma las decisiones que toman.

Los procesos de decisión varían según los incidentes y los eventos que forman parte de dicho incidente. Como muestra nuestra modelización, ciertas decisiones son remanentes de decisiones pasadas, y el incidente mismo es un evento para el cual la toma de decisión ya ha ocurrido, pero aún no se han ejecutado las acciones. Estas clases de incidentes son incidentes anticipados, en los cuales se han previsto acontecimientos extremos y ya se han establecido acciones de contingencia. Aunque no se puede pensar en ningún fuego grande como un acontecimiento normal, es razonable verlos como “catástrofes normales”, para parafrasear la descripción de Perrow de los fracasos técnicos mayores como “accidentes normales” (Perrow 1984). Dada la combinación precursora de condiciones forestales, tiempo y clima, y propiedades privadas, puede que sea sólo cuestión de tiempo alcanzar las condiciones detonadoras necesarias para producir eventos de gran impacto. Al igual que los fracasos tecnológicos, la toma de decisiones respecto a su manejo es parte de un ciclo más amplio que supone preparación y análisis mucho antes de que ocurran los incidentes.

Aun en los incidentes en curso, los procesos de decisión pueden variar considerablemente dependiendo del escenario del incidente y de cómo se estructuran y ejecutan los procesos de manejo. Los análisis revelan que el conocimiento local juega un papel importante en las primeras etapas del manejo al igual que en la toma de decisiones durante los primeros días del incidente. También nos fijamos en que pueden existir discontinuidades fundamentales e importantes en las distintas etapas de la toma de decisiones de manejo. Mientras que el fuego es un proceso continuo y exponencial que cambia progresivamente, aunque a veces de forma abrupta, su manejo es un proceso discreto que cambia de manera lineal y en etapas relativamente discontinuas. Esta relación fundamental entre el fuego como un proceso no lineal y continuo, y su manejo como uno lineal y discontinuo, significa que las discontinuidades en el proceso de manejo tienen el efecto de retrasar su manejo. La

noción de *discontinuidades en el proceso de decisión* define y hace operacionales estos conceptos. Entender mejor cómo ocurren los desajustes entre los procesos de decisión en diferentes etapas del manejo de incidentes de fuego puede ayudar a identificar cómo mejorar los procesos de decisión y el entrenamiento para el manejo de fuegos.

Reconocimientos

Este trabajo recibió el respaldo del Departamento de Agricultura de EE. UU., Servicio Forestal, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Research Joint Venture Agreement No. 02-JV-11272165-040 con MacGregor-Bates, Inc.

Referencias

- Armstrong, J. S. (ed.). (2001). *Principles of forecasting: A handbook for researchers and practitioners*. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers.
- Cooksey, R. W.; Freebody, P. (1985). Generalized multivariate lens model analysis for complex human inference tasks. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35, 46-72.
- Cooksey, R. W. (1996). *Judgment analysis: Theory, method, and applications*. San Diego, CA: Academic Press.
- Frohwein, H. I.; Lambert, J. H. (2000). Risk of extreme events in multiobjective decision trees Part 1. Severe events. *Risk Analysis*, 20:113-123.
- Haimes, Y. Y. (1998). *Risk modeling, assessment, and management*. New York: Wiley.
- Keeney, R. L.; Raiffa, H. (1976). *Decisions with multiple objectives: Preferences and value tradeoffs*. New York: John Wiley & Sons.
- Klein, G. A.; Calderwood, R.; MacGregor, D. (1989). Critical decision method for eliciting knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19, 462-472.
- MacGregor, D. G. (2001). Decomposition for judgmental forecasting and estimation. In J. S. Armstrong (ed.). *Principles of forecasting: A handbook for researchers and practitioners*. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers.
- Oliver, R. M.; Smith, J. Q. (eds.). (1990). *Influence diagrams, belief nets, and decision analysis*. New York: Wiley.
- Paté-Cornell, M. E. (1993). Learning from the Piper Alpha accident: A postmortem analysis of technical and organizational factors. *Risk Analysis*, 13:215-232.
- Perrow, C. (1984). *Normal accidents*. New York: Basic Books.
- Powers, W. T. (2005). *Behavior: The control of perception*. New Canaan, CT: Benchmark Publications.
- Raiffa, H. (1968). *Decision analysis*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Sheridan, T. B.; Ferrell, W. R. (1981). *Man-machine systems: Information, control and decision models of human performance*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Weiner, N. (1948). *Cybernetics*. New York: John Wiley.
- Wickens, C. D.; Hollands, J. G. (2000). *Engineering psychology and human performance*. Old Tappan, NJ: Prentice Hall.

Un Esquema Basado en los Sistemas de Información Geográfica para Evaluar las Inversiones en el Manejo de Incendios: Distribución Espacial del Valor de Recreación¹

Kenneth A. Baerenklau², Armando González-Cabán³, Catrina I. Páez² y Edgar Chávez²

Resumen

El Servicio Forestal de los Estados Unidos es el responsable de desarrollar herramientas para facilitar el manejo eficiente de incendios en las zonas silvestres y en las zonas de interfaz urbano-forestal. El software actual para el manejo de incendios basado en los SIG (Sistemas de Información Geográfica), solo permite la estimación de los costos de la prevención de incendios y los esfuerzos de mitigación, así como los efectos de esos esfuerzos en el comportamiento del fuego. Esta investigación demuestra cómo los beneficios económicos de las estrategias del manejo de incendios también pueden incorporarse a una estructura de planificación basada en los SIG. En esta ponencia, se derivan valores de recreación delineados espacialmente, asignando al paisaje valores por cada viaje de excursionismo, a partir de un análisis de costo de viaje, utilizando la herramienta de visibilidad de *ArcGIS*. En el futuro, el trabajo incorporará los valores del suministro de agua y los bienes raíces, y desarrollará un esquema de análisis de costo-beneficio. Esta investigación expande las capacidades económicas del proceso de *Stewardship and Fireshed Assessment* al permitir a los encargados de tomar decisiones el sopesar los beneficios y los costos de las actividades gerenciales.

Palabras claves: Análisis de visibilidad, beneficios del manejo de incendios, recreación, SIG, valuación no comercial, zona natural protegida de San Jacinto.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó como un póster en el Tercer Simposio Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Respectivamente, Catedrático Auxiliar, Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California – Riverside; “Junior Specialist”, Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California – Riverside; estudiante graduado, Programa Graduado en Ciencias Ambientales, Universidad de California – Riverside;. Email: ken.baerenklau@ucr.edu.

³ Economista Investigador, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Riverside, California; Email: agonzalezcaban@fs.fed.us.

Introducción

El proceso del *Stewardship and Fireshed Assessment* del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos utiliza un *software* para el manejo de incendios que genera estimados de los costos de la prevención de incendios y los esfuerzos de mitigación, así como también los efectos en el comportamiento del fuego. Sin embargo, actualmente esta herramienta no puede calcular los beneficios de esos esfuerzos, lo cual dificulta la evaluación de las inversiones y las ventajas y desventajas asociadas a las estrategias de manejo de incendios. En los casos en que el fuego supone una amenaza inminente a la vida, a infraestructura pública importante o a propiedad privada valiosa, es poco probable que los encargados de tomar decisiones consideren un análisis formal de costo-beneficio antes de actuar. No obstante, considere, por ejemplo, un incendio en un lugar lejano utilizado exclusivamente para la recreación en áreas protegidas. ¿Deberían asignarse los recursos para este tipo de fuego? Si es así, ¿qué recursos y adónde deberían ser asignados? O considere la opción de emprender actividades para la prevención de incendios en un paisaje de usos múltiples. ¿En dónde debe cortarse la maleza? ¿En dónde se deben hacer menos densos los árboles? ¿Qué zonas se deben proteger en vista de los recursos limitados para la prevención de incendios? Sin la capacidad de evaluar los beneficios de las actividades de prevención y extinción de incendios en un contexto espacial, es difícil lograr utilizar los recursos de una manera eficiente.

Para poder evaluar los beneficios de las estrategias para el manejo de incendios en general, es necesario conocer los valores de mercado y los intangibles de las características del paisaje y cómo estos valores se ven afectados por los incendios. Tradicionalmente, los economistas de recursos han utilizado una tipología que clasifica los valores en valores de uso o valores pasivos (Freeman 2003). Los valores de uso incluyen el uso de extracción de un recurso, tal como la cosecha de madera o el suministro de agua, o el uso *in-situ* tal como la recreación o el turismo; mientras que los valores no comerciales incluyen el deseo de preservar un recurso por su valor intrínseco o por la opción de utilizar ese recurso en el futuro. También, los valores de uso pueden derivarse de flujos en el servicio que exhiben las propiedades de los bienes públicos o privados: los valores de uso públicos incluyen los flujos en los servicios de un ecosistema como, por ejemplo, el ciclo de nutrientes o la fijación de carbono de los cuales mucha gente se beneficia gratuita y equitativamente; los valores de uso privados incluyen las actividades de recreación o la propiedad de viviendas lo cual provee beneficios exclusivamente al individuo que realiza la actividad, a pesar de que el valor que recibe puede depender de bienes públicos como, por ejemplo, la calidad del ambiente.

Esta investigación se centra en los valores de uso privado en un paisaje boscoso, específicamente: el suministro de agua, el desarrollo de tierras (bienes raíces) y la

recreación. El valor de la infraestructura pública (ej. embalses y líneas eléctricas) se evalúa típicamente por su valor de reemplazo: ¿cuánto costaría encontrar un suministro de agua o de electricidad por un período determinado de tiempo? ¿Cuánto costaría reemplazar la infraestructura afectada? El valor de la propiedad privada se puede basar en los precios del mercado o de tasación. Ambos tipos de valores están representados en un contexto espacial, ya que se derivan de forma directa de las características del paisaje, las cuales tienen un lugar específico (ej., una cuenca hidrográfica o un edificio).

El valor de recreación puede determinarse a través de un análisis estadístico de usuarios, la frecuencia de uso y el tiempo y dinero gastado para llegar al lugar de recreación; a esto se le denomina comúnmente análisis de costo del viaje. Típicamente, es más difícil evaluar el valor de recreación que los valores de la infraestructura o la propiedad, debido a que no es posible observar de forma directa el precio de la recreación. En cambio, el precio tiene que estimarse a través de un análisis de costo del viaje u otro análisis similar. Además, los modelos tradicionales de demanda de recreación se han enfocado en una “excursión” como la unidad de análisis (Freeman 2003) sin tomar en cuenta la pregunta de cuánto del valor de la excursión se deriva del paisaje en el cual se lleva a cabo la recreación. O sea, un viaje de recreación es valioso, presuntamente, porque el usuario experimenta un paisaje atractivo; pero ¿cómo podemos utilizar los datos disponibles para determinar qué áreas son más valiosas que otras? El distribuir espacialmente el valor de recreación de una zona en estado natural en un paisaje es una parte esencial de cualquier análisis de beneficios basado en SIG, pero todavía este tema no se ha tocado en la bibliografía; esta ponencia propone una metodología para hacerlo.

Este estudio, en última instancia, proveerá un análisis del suministro de agua, los bienes raíces y los valores de recreación, y demostrará cómo estos se pueden incorporar a una estructura de planificación basada en SIG y un esquema de análisis de costo-beneficio. Tal esquema es útil para los administradores públicos, quienes tienen que distribuir recursos limitados a través de un paisaje, de una forma ideal para proporcionar el mayor beneficio del público. Esta ponencia se enfoca en la distribución espacial del valor de recreación de las zonas protegidas, ya que ésta es una de las contribuciones más novedosas y abarcadoras de la investigación. En las secciones a continuación presentamos nuestros datos, metodología y resultados preliminares. Concluimos con una discusión de los asuntos que esta investigación plantea y los planes de trabajo para el futuro.

Métodos

Este estudio examina la recreación en la zona protegida de San Jacinto en el Bosque

Nacional San Bernardino en el sur de California. El bosque está localizado a 2 horas y media en automóvil de la mayoría de las zonas metropolitanas de Los Angeles, San Diego y Palm Springs y atrae a aproximadamente 60,000 personas que visitan las zonas protegidas cada año. Otras 350,000 personas toman el *Palm Springs Aerial Tramway* (Funicular de Palm Springs) hacia el *Mt. San Jacinto State Park* (Parque Estatal del Monte San Jacinto) pero no entran a las zonas protegidas. El *Pacific Crest Trail* atraviesa el bosque de norte a sur y las alturas de las montañas oscilan entre 1,800 y 3,300 metros. La actual sequía ha dejado el bosque muy seco y vulnerable a incendios. En el 2006 el incendio de Esperanza quemó severamente una zona amplia justo al noroeste del bosque. Actualmente no se permiten las fogatas ni tan siquiera en los campamentos designados dentro del bosque.

El acceso a las zonas protegidas está regulado por dos Estaciones de Guardabosques del Servicio Forestal de los Estados Unidos y una oficina del Parque Estatal. Se permiten caballos, pero las bicicletas y los vehículos motorizados están prohibidos. El senderismo de día es, por mucho, la actividad más popular en las zonas protegidas. A todo usuario que entre a estas áreas se le requiere obtener un permiso, pero el Servicio Forestal estima el nivel de cumplimiento en cerca de 75% (Lyon 2007). Los datos necesarios para llevar a cabo un análisis de costo de viaje están disponibles a través de los recibos que guardan el Servicio Forestal y las oficinas del Parque Estatal. Cada permiso tiene la fecha de la visita, el número de personas en el grupo, los puntos de entrada y salida y la dirección residencial del líder del grupo. La mayoría de las zonas del bosque mantienen documentos similares, que explican la popularidad y la utilidad de los modelos de costo de viaje para estimar el valor de recreación.

Mediante el uso de métodos convencionales como Weber y Berrens (2003), combinamos los datos de los permisos para el 2005 con los datos más recientes del censo (Departamento de Comercio de los Estados Unidos 2000) para construir un conjunto de datos que contiene el número de visitas a las zonas protegidas, tomado de cada código postal que esté a 2 horas y media o menos del bosque y ciertas características de la población de cada código postal (ej. raza, género, distribución de edad, nivel de educación, ingreso). El precio de una visita desde cada código postal se estima que sea la suma de los costos de conducir (una función de distancia) y los costos de tiempo (evaluados a una tercera parte de la tarifa salarial). También aumentamos nuestro conjunto de datos con documentos de votaciones sobre iniciativas medioambientales de la elección del 2000 (Secretario de Estado de California 2000) para ayudar a controlar la variación en las actitudes ambientales en los distintos los códigos postales. Este enfoque se conoce comúnmente como un *Zonal Travel Cost model* (modelo de Costo de viaje por zonas) (Haab and McConnell 2002).

Las limitaciones de espacio impiden una discusión profunda de la estimación del modelo, pero nuestra regresión estándar *Poisson* indica que para los residentes del sur de California, el valor promedio de una visita de un día a las zonas protegidas en el área de San Jacinto es de alrededor \$76. Aproximadamente \$48 de este cifra corresponde a los costos del viaje, lo que deja un excedente promedio de consumo individual de \$28 por visita. Dado que aproximadamente 60,000 usuarios visitan las zonas protegidas cada año, el valor anual del acceso a estas áreas del bosque es de alrededor de \$4.5 millones. Probablemente el estimado esté por debajo del valor real, debido a que los usuarios que viven a más de 2.5 horas del bosque, quienes tienden a tener costos de viaje más altos y por lo tanto valores más altos, no se incluyeron en nuestra muestra.

Una representación espacial de este valor necesita estar distribuida en el paisaje del bosque de acuerdo a una metodología racional. Lo ideal sería recolectar información, quizás datos de preferencia indicados, para obtener los efectos de incendios severos o el cierre de senderos en las diferentes zonas del bosque para determinar los valores de las características del paisaje. Sin embargo, recolectar estos datos resulta costoso y consume mucho tiempo. Muchas veces los analistas tienen que trabajar solo con el tipo de datos que tenemos para este estudio (Moeltner 2003). Utilizando los datos de los permisos, podemos deducir no sólo el valor de una visita a las zonas protegidas, sino también cuántas personas entraron al bosque por cada sendero y, con alguna información y suposiciones sobre los destinos y la velocidad de las caminatas, podemos deducir la probabilidad de uso de varios caminos tomados en el bosque. De esta manera, podemos asignar el valor del bosque a varios segmentos de los senderos, pero aún resta resolver el problema de asignar este valor al paisaje circundante.

Para continuar, hicimos la suposición razonable de que los valores del paisaje para los senderistas de zonas protegidas están estrechamente relacionados con la calidad del paisaje. Obviamente, ciertas características únicas del paisaje podrían tener valores altos, pero en una zona relativamente homogénea como la de San Jacinto, creemos que el valor de cualquier lugar específico en el paisaje se puede aproximar tomando en cuenta la visibilidad que ofrece a los usuarios. Por ejemplo, la zona atravesada por un sendero popular es vista de cerca por muchos usuarios; por lo tanto ésta tendrá un valor más alto que el terreno que es visto a distancia y por menos usuarios. La zona que no puede verse desde ningún sendero no tendrá un valor de recreación.

Se puede calcular una función de ponderación normalizada para cada punto en el paisaje, la cual indica su valor panorámico relativo para los usuarios del bosque. Considere un bosque que tiene puntos J y segmentos de senderos K , cada uno utilizado por n_k usuarios durante una temporada de recreación. Cada segmento

puede ser representado por un camino en un espacio tridimensional desde el punto de partida t_k^s hasta el punto final t_k^e . Para cualquier punto t en el segmento k , supongamos que $S_k(t)$ es el conjunto de puntos visibles en el paisaje y $I_j(t) = 1$ si $j \in S_k(t)$, de lo contrario, es igual a 0. Supongamos que $x_j(t)$ es la distancia entre los puntos j y t , y que $w(x)$ es una función de ponderación, de manera que $w > 0$ y $dw/dx < 0$. Entonces para cada segmento k , podemos definir el “peso visual absoluto” del punto j como: $v_{jk} = \int_{t_k^s}^{t_k^e} I_j(t) w(x_j(t)) dt$, y el “peso visual normalizado” del punto j como: $V_{jk} = v_{jk} / \sum_j v_{jk}$, de manera que $\sum_j V_{jk} = 1$. Si el valor de una visita en un segmento k es p_k , entonces $\sum_K n_k p_k V_{jk}$ expresa un estimado del valor panorámico del punto j .

Para implementar este esquema de valoración, utilizamos herramientas estándares disponibles en *ArcGIS* (ESRI 2006). Nuestra área de estudio está dividida en cuadrículas de 30-por-30 metros dentro de un modelo digital de elevación (DEM, por sus siglas en inglés). Los senderos están divididos en 42 segmentos únicos y cada uno contiene dos cruces o un cruce y un camino sin salida. Cada segmento de sendero está dividido en puntos de observación que están localizados a intervalos de 60 metros a lo largo del sendero. La experiencia visual de un senderista en cada punto se simula utilizando el *Viewshed Analysis* (Análisis de visibilidad). Esta herramienta identifica y calcula el número de veces que cada parcela en el DEM se puede ver desde los puntos de observación, explorando la zona que rodea cada punto. Fijamos los ángulos del escáner para obtener un ángulo de 180 grados vertical y uno de 360 grados horizontal. El valor *offset* se fijó a 1.7 metros, lo que corresponde a la altura promedio de un adulto estadounidense. Además, limitamos el radio de búsqueda máximo a 30 km, ya que esta es la distancia máxima entre cualquier punto en los segmentos y la frontera de nuestra zona de estudio. Al igual que en los estudios de visibilidad previos (ej. Llobera 2003), nuestros análisis no toman en cuenta los efectos de las condiciones atmosféricas variables o la presencia de vegetación que podría hacer que el paisaje esté menos visible que lo que sugieren los resultados de visibilidad.

Para definir la función de ponderación, nos basamos en el trabajo empírico previo de Higuchi (1983), quien establece un método para medir la calidad de las características del paisaje visual, basado en la apariencia desde un punto de observación dado. Utilizando los árboles como el objeto estándar de análisis, Higuchi crea índices de distancia que ayudan a identificar en qué punto pueden percibirse diferencias cualitativas. Divide el paisaje en primer plano, plano intermedio y fondo. Los árboles se pueden percibir como unidades separadas a corta distancia, pero solo están visibles como contornos y más reconocibles como una unidad forestal a una distancia media. A larga distancia, solo se pueden observar las características topográficas principales, tales como las montañas y los valles; los colores se

diferencian por los contrastes de sombra.

En nuestro estudio, modificamos los índices sugeridos por Higuchi e incrementamos las distancias corta y media para tomar en cuenta árboles más grandes en nuestra área de estudio (ej., pinos amarillos y Ponderosa). Además, dividimos la clasificación de distancia larga en dos clases separadas, donde el fondo lejano comienza a 15 km, en lugar de una clasificación de larga distancia que se extiende más allá de 5 km, como lo describe Higuchi. Esto nos da cuatro clasificaciones de distancia alrededor de cada punto de observación: 0 – 0.2 km, 0.2 – 5 km, 5 – 15 km, and 15 – 30 km. Para reducir nuestra carga computacional, a cada punto en cada clasificación se le asigna el radio promedio de la clasificación desde el punto de observación. Luego calculamos el peso de cada parcela como: $w_{x_j} = e^{-\bar{x}_j/10}$, donde $\bar{x}_j$ es el radio promedio de la clasificación en km. Esto nos proporciona pesos de clasificación de 0.99, 0.72, 0.34 y 0.10, desde el más cercano al más lejano.

Por último, tenemos que especificar el número de personas que realiza caminatas en cada sendero y el valor de una excursión en cada segmento. Como ocurre a menudo con los datos de los permisos, no tenemos la información completa sobre las rutas específicas tomadas en el bosque por cada senderista; pero sí sabemos los puntos de entrada y salida de cada excursión y sabemos que todas las caminatas se hacen de día. Para continuar, supusimos una velocidad promedio de caminata de 3.3 km/h y un tiempo máximo de caminata de ida y vuelta de 8 horas, y supusimos que al encontrar un cruce existe igual probabilidad de tomar cualquiera de los dos segmentos. Esto produce una frecuencia relativa de viaje para cada segmento de sendero la cual, al combinarse con el número de entradas en cada sendero, nos da un estimado del número de senderistas en cada segmento, n_k . Para calcular el valor de una excursión en cada segmento, p_k , asignamos el valor de una excursión tomado en cada punto de entrada, a los segmentos de senderos relacionados, basado en la magnitud relativa de $\sum_j v_{jk}$ para cada segmento. Esto es porque, en igualdad de condiciones, los segmentos más largos y los que tienen más visibilidad tienden a tener una $\sum_j v_{jk}$ más grande y así, según nuestro razonamiento, puede contribuir relativamente más al valor de una excursión.

Resultados

Obtuvimos valores por parcela que oscilaban entre \$3 y \$819, lo cual corresponde a de \$36 a \$9104 por hectárea, con promedio de cerca de \$340/ha. El setenta y cinco por ciento de estos valores oscilan entre \$33 y \$644/ha. Como se muestra en la figura 1, los valores más altos se concentran en las zonas que tienen mayor altura, en particular alrededor de los picos altos en el noreste. Estos incluyen los picos San Jacinto y Jean, que tienen alturas de 3,302 m y 3,252 m. Debido a que los picos altos

tienen la mejor visibilidad desde la mayoría de los puntos a lo largo de los senderos, estas parcelas reciben mayores pesos de visibilidad y por tanto contribuyen más al valor de una excursión. Sin embargo, estos valores solo pueden ser explicados parcialmente por la visibilidad y altura de estas parcelas, ya que el valor final de la parcela también depende de la distancia desde la cual se observa y la frecuencia de uso del sendero. En contraste, las parcelas localizadas en zonas relativamente lejanas y en cuestas empinadas que están fuera de los senderos, en general tienen valores más bajos y a veces iguales a cero, por su visibilidad limitada. Dada la concentración de valores altos en un área relativamente pequeña en la figura 1, y la extensión de valores bajos a través de la mayoría del paisaje, estos resultados sugieren que el valor de recreación solo probablemente no puede justificar las actividades de prevención y extinción de incendios en la mayor parte del bosque. No obstante, en algunas zonas el beneficio de preservar oportunidades de recreación parece ser significativo.

Discusión

Claramente, esta superficie de valores surge, en parte, de nuestras suposiciones sobre cómo los valores se derivan del paisaje. Uno de nuestros próximos pasos será recolectar datos adicionales sobre las rutas atravesadas reales y tiempos y distancias recorridas, así como los efectos de los daños hipotéticos causados por incendios y los cierres de senderos, en el comportamiento de recreación, para verificar y calibrar nuestra metodología. También, planificamos aumentar nuestros datos con información sobre los valores de suministro de agua y los bienes raíces, para proporcionar una idea más completa de la distribución espacial de los beneficios derivados del paisaje. Por último, se desarrollará un marco de costo-beneficio basado en SIG que tome en cuenta el impacto del incendio en los flujos de beneficios y por tanto podría ser incorporado directamente al proceso del *Stewardship and Fireshed Assessment*.

Resumen

Esta investigación demuestra cómo los beneficios económicos de las estrategias de manejo de incendios pueden incorporarse a la estructura de planificación basada en SIG. Los valores de recreación del bosque que están delineados espacialmente surgen al asignar al paisaje los valores por excursión derivados de un análisis de costo de viaje, utilizando la herramienta de visibilidad en *ArcGIS*. Los valores encontrados oscilan entre \$36 y \$9104/ha, con un promedio de \$340/ha y la mayoría de los valores fluctuaban entre \$33 y \$644/ha. Los trabajos en el futuro incorporarán los valores de suministro de agua y bienes raíces, y desarrollarán un esquema de análisis

de costo-beneficio. Esta investigación expande las capacidades del proceso del *Stewardship and Fireshed Assessment* al permitir que los encargados de tomar decisiones sopesen los beneficios y los costos de las actividades de administración.

Agradecimientos

Esta investigación está patrocinada por el Acuerdo Cooperativo No. 05-JV-11272165-094 entre el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Universidad de California en Riverside. Yeneochia Nsor, Sunil Patel y Victoria Voss asistieron en la investigación. Los autores también desean agradecer a Melinda Lyon, Jerry Frates y Roman Rodriguez de las Estaciones de Guardabosques del Servicio Forestal de los Estados Unidos, en Idyllwild y Long Valley y a Eddie Guaracha de la Oficina del Parque Estatal del Monte San Jacinto en Idyllwild por su asistencia.

Figura 1 – Superficie del valor de recreación derivado para la zona en estado natural de San Jacinto. Los valores corresponden a parcelas de 900 m² y se basan solo en excursiones de un día a las zonas protegidas.

Referencias

- California Secretary of State. 2000. **Statement of Vote 2000 Primary Election**. Disponible en: http://www.sos.ca.gov/elections/sov/2000_primary/contents.htm. Accesado en marzo de 2007.
- ESRI. 2006. ArcMap 9.2. **Using ArcGIS Spatial Analyst**. Environmental Systems Research Institute. Redlands, CA.
- Freeman, A.M., III. 2003. **The Measurement of Environmental and Resource Values**. Washington, DC: Resources for the Future Press.
- Haab, T.C., and K.E. McConnell. 2002. **Valuing Environmental and Natural Resources**. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Higuchi, T. 1983. **The Visual and Spatial Structure of Landscapes**. Cambridge: MIT Press.
- Llobera, M. 2003. **Extending GIS-based Visual Analysis: The Concept of Visualscapes**. International Journal of Geographical Information Science 17(1): 25-48.
- Lyon, M. 2007. Wilderness/Trails Manager, San Jacinto Ranger District, San Bernardino National Forest. Personal Communication. 12 de octubre de 2007.
- Moeltner, K. 2003. **Addressing Aggregation Bias in Zonal Recreation Models**. Journal of Environmental Economics and Management 45(1): 128-144.
- United States Department of Commerce. 2000. **United States Census 2000**. Disponible en: <http://www.census.gov/main/www/cen2000.html>. Accesado en marzo de 2007.
- Weber, M., and R. Berrens. 2006. **Value of Instream Recreation in the Sonoran Desert**. Journal of Water Resource Planning and Management 132(1): 53-60.

Un Estudio de los Factores Socioeconómicos que Influyen sobre la Incidencia de Fuegos en los Países de la Cuenca del Mediterráneo

Panagiotis Koulelis¹ e Ioannis Mitsopoulos¹

Resumen

Los fuegos forestales en la cuenca del Mediterráneo son un fenómeno raro debido a factores socioeconómicos. El objetivo de este estudio fue el de examinar los efectos de los factores socioeconómicos (densidad poblacional, producto interno bruto (PIB) y densidad de ganado) en la cantidad de fuegos forestales y áreas quemadas en los países de la cuenca del Mediterráneo durante la década del 1995-2004. El análisis se llevó a cabo utilizando el método de regresión lineal por pasos. En los años 1995-2004, las variables significativas para la cantidad de incendios forestales son el producto interno bruto (España), la densidad de ganado (Grecia e Italia) y la densidad poblacional (Portugal, Israel, Chipre, Francia y Turquía). Se encontraron variables significativas, para el número de incendios forestales, entre ellas: el producto interno bruto (Turquía, España y Grecia), la densidad de ganado (Italia, Chipre, Francia y Portugal) y la densidad poblacional (Israel y Chipre). Los resultados de esta investigación muestran que los factores socioeconómicos en la cuenca del Mediterráneo tienen un efecto moderado en los incendios forestales con diferentes grados de correlación por país. El plan nacional para la prevención de incendios forestales también debería tomar en consideración los factores socioeconómicos.

Palabras clave: Áreas quemadas, cuenca del Mediterráneo, incendios forestales, factores socioeconómicos, regresión lineal por pasos.

Introducción

En la cuenca del Mediterráneo, muchos países con presión humana severa (que tiene como resultado la quema, tala y pastoreo de terrenos no arables y el desmonte, abancalamiento, cultivo y, posteriormente, abandono de las porciones arables) han creado un paisaje fuertemente influenciado por el ser humano. El cultivo de áreas marginales bajo una presión poblacional creciente ha sido una práctica común en el sur de Europa desde el siglo XVI. Es imposible entender a

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó como un póster en el Tercer Simposio Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

²

Escuela de silvicultura y del ambiente, Universidad Aristóteles Tesalónica, Grecia (e-mail: pkouleli@for.auth.gr; ioanmits@for.auth.gr)

nuestros compañeros en el campo sin tomar en consideración las actividades antropogénicas y el uso de los terrenos en el pasado. La intervención humana ha sido tan fuerte que sigue teniendo impactos significativos en los patrones de vegetación, actuales y futuros (Alexandrian et ál.1992).

Los cambios en la incidencia de incendios en las últimas décadas reflejan de cerca los recientes cambios socioeconómicos en los países europeos del Mediterráneo. Tras el desarrollo industrial, los países europeos del mediterráneo han experimentado: despoblación de áreas rurales, incrementos en la mecanización agrícola, reducciones en la presión de pastoreo y de recolecta de madera, e incrementos en la urbanización de áreas rurales. Estos cambios en el uso tradicional del terreno y en los estilos de vida han tenido como consecuencia el abandono de terrenos de cultivo, lo cual ha resultado en la recuperación de la vegetación y un aumento en el combustible acumulado (Moreno y Oechel 1994). En el sur de Europa, la actividad humana ha aumentado dramáticamente la incidencia de fuegos a consecuencia del abandono de terrenos y la presión turística. Durante este siglo, los cambios en el uso de terrenos producidos en el sur de Europa son paralelos a los cambios en el régimen de incendios, de ser pocos y provocar daños a pequeñas áreas, a ser numerosos y afectar grandes extensiones cada año. Esta tendencia no se observa en el sur de la cuenca del Mediterráneo, donde el uso tradicional de los terrenos sigue siendo el sistema socioeconómico más importante (Vélez 1993).

Jennings (1999) presentó un examen exhaustivo de la bibliografía acerca de las características socioeconómicas y su influencia en la incidencia de incendios. Él indica que la frecuencia de incendios se ve afectada por las características de la comunidad, mientras que la correlación entre la pérdida causada por los incendios y los recursos utilizados es débil.

Cardille et ál.(2001) examinaron la influencia de los factores ambientales y socioeconómicos de la incidencia de fuegos utilizando datos espaciales sobre las áreas naturales en EE.UU. Indican que la distribución espacial de los fuegos forestales se relaciona con una combinación de factores abióticos, bióticos y sociales. Sturtevant y Cleland (2007) sostienen que mientras que los factores humanos dominan la probabilidad de incendios, los factores ecológicos restringen la capacidad del fuego de propagarse. Vadrevu *et ál.* (2006) señalan que la densidad poblacional es uno de los factores principales para explicar la variación en la incidencia de fuegos en la India.

La meta de este estudio fue investigar los efectos de los factores socioeconómicos (la densidad poblacional, el producto interno bruto (PIB) y la densidad de ganado) en la cantidad de fuegos forestales y áreas quemadas

durante la década de 1995-2004, en la mayoría de los países de la cuenca del Mediterráneo.

Métodos

La información utilizada en este estudio concerniente al número de incendios y áreas quemadas ocurridos en ocho países del Mediterráneo (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Chipre e Israel) durante los años 1995-2004 se obtuvo de los informes de incendios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) (Dimitrakopoulos y Mitsopoulos 2005). Los valores de los factores socioeconómicos (la densidad poblacional, el producto interno bruto (PIB) y la densidad de ganado) de cada país se tomaron de la división de estadísticas de la FAO (2004) y la división de estadísticas de las Naciones Unidas (2004).

Se aplicó la regresión lineal múltiple por pasos para poder investigar los factores socioeconómicos estadísticamente significativos que influyen en el número de incendios y áreas quemadas en los países del Mediterráneo estudiados. La regresión lineal múltiple por pasos ha probado ser una técnica de cálculo extremadamente útil en el análisis de datos. Este procedimiento logra superar el problema agudo que se da con los métodos clásicos de cálculo de la regresión lineal múltiple. En la regresión lineal múltiple, la variable con la mayor probabilidad de F se elimina y la ecuación se vuelve a computar sin la variable, repitiéndose el proceso hasta que no es posible eliminar más variables independientes (Draper y Smith 1981).

El análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS ver.14 (Norusis 1997).

Resultados y Discusión

La tabla 1 presenta los factores estadísticamente significativos ($p=0.05$) conforme al coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de determinación (R^2), y los parámetros de regresión de la ecuación para el total de incendios en cada país estudiado durante los años 1995-2004.

La densidad poblacional fue la variable que correlacionó de forma estadísticamente significativa con la cantidad de incendios en Portugal, Francia, Turquía, Israel y Chipre. El coeficiente de relación Pearson varió de 0.33 a 0.77. La densidad poblacional, que explica la variación en la incidencia de fuego en estos países, varía de un 11% en Turquía hasta un 60% en Chipre.

La densidad de ganado fue la variable que se correlacionó de forma estadísticamente significativa con la cantidad de incendios en Italia y Grecia. El

coeficiente de correlación Pearson varió de 0.38 a 0.85. La densidad de Ganado explica la variación en la incidencia de fuegos en estos países, y va desde un 15% en Italia hasta un 71% en Grecia.

El PIB fue la variable que se correlacionó estadísticamente con la cantidad de incendios en España. El coeficiente de correlación Pearson fue de 0.57. El PIB explicó la variación en la incidencia de fuegos en España, con un valor de 33%.

Tabla 1— *Los resultados de la regresión lineal múltiple por pasos para la cantidad de incendios y factores socioeconómicos en cada país del Mediterráneo estudiado durante los años 1995-2004¹*

País	Portugal	España	Francia	Italia	Grecia	Turquía	Israel	Chipre
Factor socioeconómico	Densidad poblacional	PIB	Densidad poblacional	Densidad de ganado	Densidad de ganado	Densidad poblacional	Densidad poblacional	Densidad poblacional
Coeficiente de correlación Pearson	0.65	0.57	0.64	0.38	0.84	0.33	0.49	0.77
Coeficiente de determinación (R²)	0.42	0.33	0.41	0.15	0.71	0.11	0.24	0.60
Parámetros modelo	a) 284162 b) 2.5	a) 28309 b) 1.15	a) 102909 b) 1.61	a) -9236 b) 470.7	a) -40083 b) 2088.8	a) -817.7 b) 4.04	a) 2358.3 b) 2.25	a) -2882.7 b) 4.40

¹ ecuación: $Y=a+bX$

La tabla 2 presenta los factores estadísticamente significativos ($p=0.05$) de acuerdo con el coeficiente de correlación Pearson, el coeficiente de determinación (R^2) y los parámetros de la ecuación de regresión para las áreas quemadas en cada país estudiado, durante los años 1995-2004.

La población fue la variable que estadísticamente se correlacionó con el área quemada en Israel y Chipre. El coeficiente de correlación Pearson varió de 0.35 a 0.70. La densidad poblacional explicó la variación de áreas quemadas en estos países, y va desde un 12% en Chipre hasta un 49% en Israel.

La densidad de ganado fue la variable que se correlacionó con el área quemada en Francia, Italia y Portugal. El coeficiente de correlación Pearson varió de 0.30 a 0.46. La densidad de ganado explicó la variación de áreas quemadas en estos países, y va desde un 8% en Italia hasta un 22% en Portugal.

El PIB fue la variable que se correlacionó estadísticamente con la cantidad de incendios en España, Grecia y Turquía. El coeficiente de correlación Pearson varió de 0.13 a 0.55. La densidad de ganado explicó la variación de áreas quemadas en estos países, y va desde un 1.6% en Turquía hasta un 31% en Grecia.

Tabla 2— Los resultados de la regresión lineal múltiple por pasos para las áreas quemadas y los factores socioeconómicos en cada país del Mediterráneo estudiado durante los años 1995-2004¹

País	Portugal	España	Francia	Italia	Grecia	Turquía	Israel	Chipre
Factor socioeconómico	Densidad de ganado	PIB	Densidad de ganado	Densidad de ganado	PIB	PIB	Densidad poblacional	Densidad poblacional
Coefficiente de correlación Pearson	0.46	0.20	0.43	0.30	0.55	0.13	0.70	0.35
Coefficiente de determinación (R²)	0.22	0.04	0.18	0.08	0.31	0.016	0.49	0.12
Parámetros modelo	a) 3104699 b) 90329.6	a) 146979 b) 5.5	a) 413622 b) 8224,2	a) -140309 b) 5761.2	a) 103755.3 b) 5.12	a) 13177.8 b) 1.98	a) 30395,9 b) 4.337	a) -74802 b) 0.20

¹ ecuación: $Y=a+bX$

Los análisis estadísticos muestran que en muchos de los países estudiados el factor más importante relacionado con el fenómeno es la densidad poblacional. Una posible explicación sería que las estadísticas de las causas de incendios en la región del Mediterráneo no están completas; es evidente que las personas provocan más incendios. Los agentes naturales, como los rayos, causan incendios, pero el número de incendios ocurridos de forma natural es pequeño en comparación con aquellos causados por personas.

En Italia y Grecia, se presenta la densidad de ganado como el factor de mayor importancia que explica el número de incendios. Una importante fuente de incendios en estos países son los pastores, quienes encienden los prados para promover el crecimiento del pasto para el ganado. Los agricultores utilizan el fuego para eliminar el rastrojo y los matorrales, y para frenar el crecimiento de los bosques, para utilizar el espacio para la agricultura. El gobierno central debería dar importancia a estas acciones y dedicar sus esfuerzos a prevenirlas. España es el único país que presenta el PIB como la principal variable de correlación con la cantidad de incendios y de áreas quemadas. Puede pensarse en la explicación probable de que el PIB constituye un buen indicador de crecimiento económico, con el crecimiento del turismo, los cambios en el uso del terreno y la inmigración interna a las áreas urbanas. Otra importante causa de incendios es la quema de basura en las áreas forestales por turistas y otros usuarios. Otra importante motivación de los incendios destructivos es el intento de cambiar la clasificación del uso del terreno. También es importante relacionar el PIB con la migración desde las áreas rurales a las ciudades. No obstante,

esta migración aumenta los combustibles forestales. El cambio de población no implica la eliminación total de las actividades en las áreas forestales. La población rural restante, mayormente ancianos, continúan usando el fuego para eliminar rastrojos y renovar los pastizales y prados. Por otra parte, la escasez de la población rural hace que de la extinción de incendios una tarea difícil. Los otros países que correlacionan el área quemada con el PIB son Grecia y Turquía. El área quemada de Portugal e Italia se correlaciona con la densidad de ganado, hecho que indica lo importante que es actuar rápidamente con respecto a los pastores. Finalmente, el área quemada de Israel y Chipre correlaciona con la densidad poblacional, lo que constituye prueba clara de que la gente provoca más incendios.

Resumen

En general, se observó en los países del Mediterráneo estudiados una correlación entre los incendios forestales y los factores socioeconómicos, según lo indica la regresión lineal múltiple por pasos. El resultado de la investigación muestra que los factores socioeconómicos en los países del Mediterráneo tienen un efecto moderado en los incendios forestales con un diferente grado de correlación en cada país. Estudios adicionales sobre la influencia de otros factores (ambientales, etc.) probablemente contribuirían a explicar la variación en la incidencia de incendios y áreas quemadas en los países del Mediterráneo. Una planificación racional de la prevención de los incendios forestales en cada país debe tomar en consideración también los factores socioeconómicos.

Referencias

- Alexandrian D., Esnault F., Calabri G., 1992. **Forest fires in the Mediterranean area.** Unasylva 197, Vol.50.
- Cardille, J.; Ventura, S.; Turner, M.; 2001. **Environmental and Social Factors Influencing Wildfires in the Upper Midwest, United States.** Ecological Applications 11: 111-127.
- Dimitrakopoulos A.P., Mitsopoulos I.D. 2005 **Global Forest Resources Assessment 2005 – Report on fires in the Mediterranean Region.** Fire. Management Working Paper 8. FAO 43p.
- Draper, N.; Smith, H. 1998. **Applied Regression Analysis.** 3rd Edition. Wiley & Sons New York 706p.
- FAO 2004. **Food and Agriculture Organization, Statistics Division,** Available at: <http://faostat.fao.org>
- Jennings C. 1999. **Socioeconomic Characteristics and Their Relationship to Fire Incidence: A Review of the Literature.** Fire Technology 35: 7-35.
- Moreno J.M., Oechel W.C. 1994. **The role of fire in Mediterranean-type ecosystems.** Springer-Verlag. New York.
- Norusis M. J. 1997. **SPSS professional statistics.** Chicago: SPSS, Inc.
- Sturtevant, B.; Cleland, D. 2007. **Human and biophysical factors influencing modern fire disturbance in northern Wisconsin.** International Journal of Wildland Fire 16: 398-413.
- United Nations. 2004. **United Nations, Statistics Division,** Available at: <http://unstats.un.org/unsd/databases.htm>
- Vardaru, K.; Eaturu, A.; Badarinath, K. 2006. **Spatial Distribution of Forest Fires and Controlling Factors in Andhra Pradesh, India Using Spot Satellite Datasets.** Environmental Monitoring and Assessment 123: 75-96.
- Velez R. 1993. **High intensity forest fires in the Mediterranean Basin: Natural and socioeconomic causes.** Disaster Management 5: 16-20

La Modelización del Comportamiento del Fuego en Islas Tropicales Utilizando Datos Meteorológicos de Alta Resolución¹

John W. Benoit², Francis M. Fujioka², y David R. Weise²

Resumen

En este estudio, consideramos la simulación del comportamiento del fuego en los ambientes de islas tropicales como Hawai y Puerto Rico. Se expone el desarrollo de un sistema para proveer una predicción del comportamiento del fuego en tiempo real en Hawai. Esto conlleva obtener información de combustibles y topografía en escala fina, así como proveer diariamente datos de pronósticos meteorológicos de alta resolución a la zona de interés. El programa de simulación de incendios que utilizamos, FARSITE, trabaja con los modelos de combustibles que se encuentran comúnmente en los Estados Unidos continentales. Por lo tanto, la vegetación que se encuentra en una isla necesita ser cartografiada de acuerdo a los modelos de combustibles. Examinamos detalladamente un incidente de fuego específico, observando cuán bien puede ser modelado, dado el resultado de un sistema en desarrollo. El análisis de esos ejemplos puede ayudar en la calibración de un sistema de predicción del comportamiento del fuego para uso en tiempo real. Existen varias causas potenciales de error entre los perímetros de incendio simulados y reales. Se consideran los diferentes métodos para eliminar este error y mejorar la precisión de la simulación. Finalmente, discutimos el trabajo adicional y los retos que se presentan cada vez que un sistema de predicción de comportamiento de fuego en desarrollo se vuelve operacional.

Introducción

El comportamiento de los incendios en la mayor parte de las grandes masas terrestres del mundo se ha estado estudiando y modelando desde hace algún tiempo. Sin embargo, se conoce menos acerca de los incendios forestales que ocurren en ambientes de isla tropical, tales como Puerto Rico y las Islas Hawaianas. Se le está dedicando más atención a estos incendios por varias razones. El cambio en el uso de la tierra, como, por ejemplo, el movimiento de los límites de la interfaz urbano-

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de Incendios: Problemas y Enfoques Comunes, 29 abril – 2 mayo de 2008, Carolina, Puerto Rico.

² Especialista en Computación, Meteorólogo Investigador, e Investigador Forestal, respectivamente, Riverside Forest Fire Laboratory, Estación de Investigación del Pacífico Suroeste, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU., Riverside, CA 92507

forestal, está redundando en la necesidad de mayor prevención y supresión de incendios. Las zonas ocupadas por plantas o animales que están actualmente en peligro necesitan una protección especial contra los incendios. En algunos lugares de las islas, los recursos para extinguir fuegos podrían no estar fácilmente disponibles, lo que enfatiza la importancia de tener lapsos de preparación para el fuego más largos. Los incendios forestales en las islas tropicales parecen ser menos amenazantes en comparación con aquellos que ocurren en las masas terrestres más grandes, pero los daños pueden ser muy costosos.

El Servicio Forestal de los Estados Unidos y otras agencias han comenzado a modificar los análisis y las tecnologías existentes para adaptarse mejor a las condiciones de Hawai y ambientes similares. Se ha trabajado recientemente cartografiando y modelando los combustibles hawaianos (Weise y otros 2005, Wright y otros 2002, Clark y otros 2004). Una versión del Sistema Nacional de Evaluación de Peligro de Incendio de los Estados Unidos, diseñado originalmente para usarse en los Estados Unidos continentales, ha sido modificada para usarse en las islas hawaianas. En este trabajo, discutimos el proceso para correr un programa de simulación de comportamiento del fuego en Hawai, el cual había sido diseñado para usarse en los Estados Unidos continentales. Estas herramientas pueden ser usadas por los equipos de bomberos terrestres.

Los colaboradores del Departamento de Meteorología de la Universidad de Hawai (UH), en Manoa, están produciendo diariamente pronósticos del tiempo de alta resolución. Cada corrida del pronóstico diario se genera en un conglomerado de computadoras que corren el modelo meteorológico MM5, y se compone de 48 pronósticos consecutivos, uno por hora, en puntos alineados espacialmente en cuadrículas sobre las Islas Hawaianas (vea <http://www.soest.hawaii.edu/MET/Faculty/mm5/>). Hay cinco cuadrículas, o dominios anidados, con espacios variados (*tabla 1*). En cada punto de cuadrícula, se computan los valores pronosticados de temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, y cobertura de nubes.

Tabla 1—*Dominios para el pronóstico diario MM5 de la UH.*

Dominio	Espacio cuadrícula (km)	Puntos este-oeste	Puntos norte-sur
Estado	9	75	87
Condado de Kauai	1.5	45	51
Condado de Oahu	1.5	51	63
Condado de Maui	3	48	72
Condado de Hawai	3	69	90

Trabajamos con la UH y un colaborador del Institute of Computational Earth

System Science (ICESS) en la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB), para hacer que el resultado del modelo del pronóstico del tiempo esté disponible como insumo a un programa de computadoras, llamado FARSITE, que predice el comportamiento del fuego (Finney 1998). El programa FARSITE se ha usado por algún tiempo en los Estados Unidos continentales, pero ha tenido poca aplicación en Hawai. FARSITE requiere varios insumos, a saber, la topografía, información sobre los combustibles y las condiciones del tiempo, para simular la propagación del fuego y otras características. La topografía y la información de zonas propensas a incendios están a menudo fácilmente disponibles para los encargados del control de incendios con mucha antelación a un evento de fuego. Estas capas de datos pueden ser importadas a FARSITE para crear mapas de las zonas silvestres de interés. Sin embargo, es más difícil obtener información precisa sobre las condiciones del tiempo. En una corrida de FARSITE, los datos atmosféricos son dinámicos—una colección diferente de valores de las variables puede ser usada por cada hora que se corra la simulación. En el caso de una simulación de fuego en tiempo real, se necesitan los datos del tiempo pronosticado para predecir el comportamiento futuro del fuego. La producción diaria de datos de pronóstico del tiempo, preparados por FARSITE y provistos por la UH y la UCSB, satisface esta necesidad para las islas hawaianas.

Un Caso Específico: El Incendio de Waiohuli

Un incidente reciente de fuego nos dio la oportunidad de probar las corridas de simulación en un escenario isleño. El incendio en Waiohuli fue detectado el 23 de enero de 2007 en una zona remota de la pendiente occidental del Monte Haleakala en Maui, Hawai. Se atribuyó la causa del incendio a un cigarrillo dejado cerca de una vereda. El incendio quemó más de 930 hectáreas en siete días y contenerlo costó más de \$340,000. Ninguna estructura sufrió daños, pero muchos árboles de sándalo y plantas raras fueron destruidos. La División de Bosques y Vida Silvestre del Departamento de Tierras y Recursos Naturales del estado y otros que estuvieron presentes en el lugar, obtuvieron información valiosa durante el evento, lo que nos ayudó mucho con nuestro análisis. Con esta información, y con datos de SIG disponibles y datos meteorológicos proporcionados por la UH y la UCSB, ensamblamos algunas simulaciones de incendios para comparar con el comportamiento real.

Ya que FARSITE se usa normalmente con modelos de combustible que ocurren comúnmente en los Estados Unidos continentales, tuvimos que ajustar estos modelos de combustible para concordarlos mejor con las características de los combustibles en Hawai. Como ha sido mencionado anteriormente, se han trabajado en la clasificación de la vegetación en modelos de combustible a través de todo el estado. No obstante,

usamos información de un estudio reciente de evaluación de incendios por el Centro de Desastres del Pacífico (CDP), ubicado en Maui. El estudio del CDP proveía un análisis detallado de los combustibles específicamente para Maui, relacionándolos con los modelos de combustible que se utilizan en los Estados Unidos continentales (*tabla 2*). El CDP también había preparado mapas topográficos y de combustibles con una resolución de 30-m para Maui. Importamos ambos mapas a FARSITE.

Tabla 2—*Los combustibles de Maui según el estudio del CDP. La vegetación fue cartografiada para los modelos de combustible definidos por Anderson 1982. El programa FARSITE utiliza estos modelos de combustible, pero permite que se definan modelos de combustible hechos a la medida. También se muestran modelos de combustible equivalentes de NFDRS (Deeming y otros 1972).*

Descripción	Modelo NFDRS	Modelo Anderson
Hierba, algarrobos, arbustos	L	1
Pukiawe discontinuo / 'a'ali'i	T	2
Pennisetum setaceum / hierba de Guinea	N	3
Tojo	B	4
Pukiawe continuo / 'a'ali'i	F	5
Bosques resistentes a incendios / arbustos / matorrales	R	8
Palo fierro	H	8
Eucalipto	G	10
Datos que faltan, tierra cultivada/urbanizada, bosques deciduo, no-combustible, agua	n/a	0, 94, 95, 97, 98, 99 ^a

^atratado como zona no-quemable.

El CDP había recopilado imágenes de satélite de la zona y superpuso el perímetro de fuego observado a estas imágenes (*fig. 1*). Utilizamos esto para ayudar a verificar que el paisaje usado como insumo para FARSITE estuviera alineado con la geografía y los combustibles reales.

Figura 1—Comparación entre el paisaje digital en FARSITE (datos topográficos y de combustibles) y la imagen del satélite. El perímetro amarillo en la imagen del satélite fue observado el 27 de enero del 2007. Los perímetros similares en el paisaje de FARSITE (cyan) y la imagen de satélite (rojo) representan el perímetro observado el 28 de enero de 2007. Estos datos de los perímetros fueron hechos disponibles por el CDP en un formato en que podían ser importados a FARSITE y superpuestos al paisaje mostrado. La leyenda de modelos de combustibles que se presenta muestra los modelos de combustible asociados con los colores en el paisaje de FARSITE.

Nuestros colaboradores de la UH y la UCSB proporcionaron información de los pronósticos del tiempo diarios para los días del incendio. Como el incendio ya había ocurrido y no estaba activo, las corridas necesarias de los pronósticos fueron recuperadas del archivo. Se habían hecho corridas de pronósticos separadas por cada día del incendio—del 24 al 29 de enero del 2007—. Cada corrida de pronóstico diaria contenía 48 conjuntos consecutivos de variables atmosféricas de 1 hora de duración. Esto significaba que la última porción de cada corrida de pronóstico traslapaba la corrida del próximo día. Por lo tanto, solamente utilizamos las primeras 24 horas de cada corrida y las juntamos en una sola progresión de datos de pronóstico por cada hora. Otro esquema pudo haber sido utilizar los 48 conjuntos de datos de 1 hora de todos los demás pronósticos diarios (es decir, del 24, 26 y 28 de enero), pero se cree que la precisión del pronóstico disminuye en la última porción de cada corrida, así que parecía conveniente utilizar el último resultado del modelo para cada hora pronosticada.

Nuestro colaborador de la UCSB preparó los datos del pronóstico del tiempo para que fueran importados directamente a FARSITE. Se utilizaron valores pronosticados de temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento,

dirección del viento, y cobertura de nubes sobre una cuadrícula por cada hora que el incendio estuvo activo. El espacio entre cada punto de cuadrícula para Maui, donde ocurrió el incendio de Waiohuli, fue de aproximadamente 3 km (*tabla 1*).

En este estudio, utilizamos la versión 3 de FARSITE, aunque una versión más reciente ya está disponible (ver <http://www.farsite.org>). La versión 3 permite la importación de las áreas de temperatura y humedad relativa sobre una cuadrícula regular, y, conforme a éstas, ajusta los cálculos sobre el comportamiento del fuego. Esta característica no fue incluida en versiones posteriores porque competía por los recursos de computación con una nueva característica. En la versión 4, solamente valores individuales por hora de temperatura y humedad relativa representan el paisaje entero. Sin embargo, la información cuadriculada del viento es aceptada por todas las versiones de FARSITE.

En nuestra corrida inicial de la simulación del fuego, utilizamos el terreno, los combustibles y el pronóstico del tiempo para la isla entera de Maui. El punto de ignición del fuego simulado fue tomado como la ubicación y el tiempo del comienzo del incendio real, según determinado por DOFAW (*fig. 2*).

Figura 2—La simulación del incendio de Waiohuli usando el dominio entero de la isla. El incendio simulado comenzó en el lugar determinado como el origen del incendio real (señalado por la flecha anaranjada). También se muestra el perímetro final del incendio de Waiohuli (amarillo).

Incorporar toda la isla de Maui en la simulación nos permitió ver rasgos a gran escala, como los patrones de combustible y viento sobre toda la isla. Sin embargo, los detalles pequeños fueron difíciles de ver, y solamente se pudieron ver rasgos imprecisos del crecimiento del perímetro del incendio simulado. Los recursos de computación también se usaron a su máxima capacidad. La simulación fue lenta, desde el punto de vista computacional, y el programa FARSITE se cayó con

frecuencia durante el ejercicio.

Corrimos una segunda simulación, recortando los mapas de insumo hasta obtener un rectángulo alrededor de la zona del incendio, lo que nos permitió ver detalles más precisos del perímetro simulado (*fig. 3*). El introducir una cantidad menor de datos sobre el paisaje como insumo al programa significó una reducción en la memoria de computadora requerida, lo que hizo que la simulación se completara sin caerse.

El perímetro creció casi de forma circular en los primeros 3 días, durante los cuales quemó en el modelo de combustible 8. Cuando el incendio alcanzó una zona dominada por el modelo de combustible 10 (árboles de eucalipto), la simetría desapareció y la velocidad de propagación aumentó en esa parte del perímetro.

Figura 3—Vista de la simulación de la zona del incendio de Waiohuli. Aquí se pueden ver detalles más precisos que los de la simulación para toda la isla. El perímetro pronosticado (cyan) en la imagen es de aproximadamente un día antes del verdadero perímetro final (amarillo). Sin embargo, el tamaño y la forma del perímetro varió poco durante el resto de la simulación. Los vectores de viento pronosticados (flechas blancas) aparecen también, mostrando vientos que soplan pendiente arriba durante este punto en la corrida.

En un momento dado, el incendio creció cerca de una zona marcada como modelo de combustible 1 (hierba, algarrobos, arbustos), pero, sorprendentemente, quemó *alrededor* de esta zona, quedándose dentro de bosques más densos (modelo de combustible 8). Este comportamiento peculiar quizá deba ser investigado más a fondo. El incendio simulado se movió pendiente arriba, al noroeste, lo que coincidía con la dirección predominante de los vientos pronosticados. Sin embargo, el perímetro real de Waiohuli parece haber cubierto una zona más pendiente abajo (al suroeste) que en la simulación. Esta discrepancia podría significar una posible falta de precisión en la configuración o en la corrida de la simulación, en la grabación del comportamiento del fuego observado, o ambos.

El lugar en donde se reportó el comienzo del incendio de Waiohuli era solamente una aproximación determinada por investigadores de incendios en que estuvieron en el lugar, así que el próximo paso fue considerar el comportamiento del fuego simulado si el lugar de inicio cambiaba por un margen pequeño. Intentamos simulaciones especificando lugares de inicio que estuvieran a una distancia corta del lugar real y conservando iguales todas las demás condiciones iniciales (estado del tiempo, combustibles, topografía y momento de inicio). Los perímetros simulados de lugares de inicio diferentes variaron mucho. Por ejemplo, al ‘encender’ la simulación en un punto aproximadamente a 441 millas del lugar de inicio observado, encontramos un perímetro simulado que coincidía bastante, por momentos, con el perímetro observado a medida que crecía (*fig. 4*). Sin embargo, el perímetro simulado siguió creciendo, hasta llegar mucho más allá que el observado. Esta diferencia en el tamaño del perímetro podría deberse a los esfuerzos de supresión de incendios que impidieron el crecimiento del incendio real y que no fueron tomados en cuenta en la simulación. El simulador FARSITE es capaz de simular la actividad de supresión de incendios, pero no había suficiente información sobre qué medidas se tomaron en el incendio de Waiohuli para utilizarla en nuestras corridas.

Figura 4—La corrida de simulación con la ignición que comenzó 441 millas al sureste del lugar de inicio reportado. Los perímetros simulados (cyan) se muestran en dos momentos distintos. A la izquierda (27 de enero, 8pm), el perímetro simulado coincide más con el perímetro real que la corrida que empezó en el lugar de inicio reportado. La imagen a la derecha muestra un tiempo después (28 de enero, 3am), donde la simulación siguió más allá del perímetro observado, aunque el incendio de Waiohuli duró más (hasta el 29 de enero).

La diferencia en el tamaño y la forma del perímetro, al hacer sólo pequeños cambios, fue sorprendente. En la *figura 5*, el punto de ignición se especificó solamente 40 millas al este del que se especificó en la *figura 3*; no se cambió ninguna otra condición inicial. Obsérvese que FARSITE genera perímetros de incendios

determinados por las condiciones iniciales. Si todas las condiciones permanecen iguales en dos corridas, el resultado debería ser idéntico³. De igual manera, la discrepancia en los perímetros de un par de corridas tiene que deberse únicamente a cambios en las condiciones iniciales o las condiciones del tiempo que se importan, y no a un comportamiento al azar durante la simulación.

Figura 5—Corrida con punto de ignición establecido 40 millas al este del lugar de inicio reportado. El perímetro (blanco) era mucho más grande que el que se produjo cuando la simulación comenzó en el lugar reportado (*fig. 3*). Obsérvese que la imagen en la *figura 3* ocurrió un día *después* de la imagen en esta figura.

También intentamos modificar el *momento* de inicio. Del mismo modo que el lugar de inicio reportado, se hizo un cálculo aproximado del momento de inicio basado en investigación. Haciendo pruebas con igniciones en momentos diferentes durante el día, obtuvimos una idea de su sensibilidad. La *Figura 6* muestra el cuadro de una corrida que comenzó seis horas después que las simulaciones anteriores. De manera similar a la imagen de la izquierda en la *figura 4*, por algún tiempo durante la corrida, el perímetro coincidió con la línea de fuego observada más que en la *figura 1* (donde la simulación se comenzó en el lugar y momento de inicio reportados).

³ FARSITE puede simular incendios generados al azar, pero escogimos no utilizar este rasgo.

Figura 6—Corrida con ignición que comenzó 6 horas después del momento reportado.

No intentamos simulaciones con cambios en ninguna otra condición inicial (datos de tiempo, combustibles, o topografía). Tampoco probamos modificar más de una variable simultáneamente, como el lugar y el momento de la ignición. Se puede realizar una gran cantidad de trabajo adicional en simulaciones que corran con ambas combinaciones de cambios.

Conclusiones

En este estudio, estábamos interesados en la eficacia de la predicción del comportamiento del fuego en tiempo real en el ambiente de una isla tropical. Queríamos saber qué dificultades técnicas deben superarse, cuán bueno es el desempeño de las predicciones del tiempo y el fuego, y cómo podemos mejorar el proceso general. El caso específico que se discutió – el incendio de Waiohuli – *no* fue una prueba del proceso en tiempo real. Sin embargo, reveló los retos que hay que enfrentar en la operación de un sistema de predicción del comportamiento del fuego. También creemos que la experiencia que ganamos al observar un ejemplo como ése se puede extender a ambientes de isla similares, además de los de Hawai.

El simulador de comportamiento de fuego que utilizamos – FARSITE – es flexible y tiene varios rasgos, muchos de los cuales no utilizamos. Si la información de los combustibles, la topografía y el tiempo pueden ser especificados con precisión en FARSITE, es probable que este programa sea adecuado para usarse en un ambiente de isla tropical. Nos topamos con algunos problemas técnicos durante las corridas de simulación, en su mayoría relacionados con la memoria de las computadoras. Estos problemas se resolvieron eliminando datos del paisaje lejos de

la zona de interés antes de importarlos a FARSITE. También utilizamos la versión 3 de FARSITE, que aceptaba los valores cuadriculados de temperatura pronosticada y humedad relativa por cuadrícula. No se sabe si los datos por cuadrícula realmente mejoran la predicción del comportamiento del fuego más que los valores individuales. Esperaríamos que una mayor precisión dependiera del tamaño y la complejidad del paisaje en la simulación.

La simulación del comportamiento del fuego dentro de FARSITE era bastante susceptible a pequeños cambios en las condiciones iniciales, tales como el lugar y el momento de la ignición. Creemos que la variabilidad en el comportamiento pronosticado se extiende a pequeñas perturbaciones en otros factores también, como los parámetros de combustible y los patrones del tiempo pronosticado. Existen otras causas posibles para la discrepancia entre los perímetros simulados y reales, tales como no tomar en cuenta factores ambientales importantes, errores en la configuración de la simulación y la falta de precisión en el modelo del comportamiento del fuego y en el registro del incendio observado. No tomamos en cuenta la actividad de supresión que se llevó a cabo en el incendio de Waiohuli, lo que probablemente tuvo una gran influencia en la línea de fuego resultante. Capturar tales actividades es a menudo difícil en escenarios de tiempo real en donde los equipos de bomberos tienen otras prioridades. Sin embargo, si la localización de la verdadera línea de fuego pudiera ser capturada en intervalos de tiempo y entrada a un programa de simulación, esta información podría reiniciar la simulación para que se asemeje más a la realidad.

Observando el crecimiento simulado del fuego a través del tiempo, notamos cómo los distintos tipos de combustibles alteraban considerablemente la rapidez de la propagación del incendio. La pendiente y el viento también tuvieron una fuerte influencia en la dirección y la velocidad del perímetro en crecimiento. Probablemente necesitaremos investigar a fondo por qué el perímetro pronosticado quemó alrededor de una zona de combustible de hierba en vez de a través de ella —un comportamiento inesperado, dado que el incendio se mantuvo dentro de un modelo de combustible más denso, el de los bosques—. Esto podría indicar errores en la especificación de los parámetros de los modelos de combustibles en el programa de simulación.

En un trabajo posterior, podríamos examinar mejores maneras de cuantificar el error entre los perímetros de incendios pronosticados y los reales (por ejemplo, Fujioka 2002). Pueden usarse medidas cuantitativas para poner a prueba iterativamente las corridas de simulación con diferentes condiciones iniciales para buscar los conjuntos óptimos de valores del perímetro. Esto puede ayudar a calibrar el modelo de simulación o determinar el tiempo o lugar probable de ignición de un fuego.

Una vez que esté listo un sistema eficiente de predicción del comportamiento del

fuego para usarse en un escenario de incendio en tiempo real, los encargados del control de incendios necesitarán aprender a usarlo. Esto probablemente suponga un ciclo de interacción entre quienes participen y el modelo mismo —un bucle de realimentación para lograr la calibración—. De este modo, se requeriría una pequeña cantidad de trabajo adicional de parte de aquellos que se encuentran en la línea de fuego real, pero el resultado es una predicción más precisa del comportamiento futuro del fuego.

Referencias

- Anderson, Hal E. 1982. **Aids to determining fuel models for estimating fire behavior**. Gen. Tech. Rep. INT-122. Ogden, UT: Intermountain Forest and Range Experiment Station, USDA Forest Service; 22 p.
- Burgan, Robert E.; Fujioka, Francis M.; Hirata, George M. 1974. **A fire danger rating system for Hawaii**. Fire Technology 10(4): 275-281.
- Clark, Matthew L.; Roberts, Dar A.; Gardner, Margaret E.; Weise, David R. 2004. **Estimation of Hawaiian Islands fire fuel parameters from AVIRIS imagery**. In: Proceedings of the 2004 AVIRIS Workshop; 2004 March 31-April 2; Pasadena, CA. 10 p.
- Deeming, John E.; Lancaster, James W.; Fosberg, Michael A.; Furman, R. W.; Schroeder, Mark J. 1972. **The national fire-danger rating system**. Res. Paper RM-84. Fort Collins, CO: Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, USDA Forest Service; 165 p.
- Finney, Mark A. 1998. **FARSITE: Fire Area Simulator – model development and evaluation**. Res. Paper RMRS-RP-4. Ogden, UT: Rocky Mountain Research Station, USDA Forest Service; 47 p.
- Fujioka, Francis M. 2002. **A new method for the analysis of fire spread modeling errors**. International Journal of Wildland Fire 11: 193-203.
- Jones, Charles; Dennison, Phil E.; Fujioka, Francis M.; Weise, David R.; Benoit, John W. 2003. **Analysis of space/time characteristics of errors in an integrated weather/fire spread simulation**. In: Proceedings of the Second International Wildland Fire Ecology and Fire Management Congress and Fifth Symposium on Fire and Forest Meteorology; 2003 November 16-20; Orlando, FL. Washington DC: American Meteorological Society; 7 p.
- Roe, Kevin P.; Stevens, Duane; McCord, Carol. 2001. **High resolution weather modeling for improved fire management**. In: Proceedings of the 2001 ACM/IEEE Conference on Supercomputing; 2001 November 10-16; Denver, CO. New York: Association for Computing Machinery; 5p.
- Scott, Joe H.; Burgan, Robert E. 2005. **Standard fire behavior fuel models: a comprehensive set for use with Rothermel's surface fire spread model**. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-153. Fort Collins, CO: Rocky Mountain Research Station, USDA Forest Service; 72 p.
- Weise, David R.; Fujioka, Francis M.; Nelson, Ralph M., Jr. 2005. **A comparison of three models of 1-h time lag fuel moisture in Hawaii**. Agricultural and Forest Meteorology 133: 28-39.
- Wright, Clinton S.; Ottmar, Roger D.; Vihnanek, Robert E.; Weise, David R. 2002. **Stereo photo series for quantifying natural fuels: grassland, shrubland, woodland, and forest types in Hawaii**. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-545. Portland, OR: Pacific Northwest Research Station, USDA Forest Service; 91 p.

Regímenes de Incendios Forestales y Variabilidad Ecosistémica¹

Paolo Fiorucci², Francesco Gaetani² y Riccardo Minciardi²

Resumen

La caracterización de los regímenes de incendio es uno de los asuntos más importantes para quienes controlan incendios forestales, especialmente en áreas donde el fuego es una amenaza frecuente a las comunidades y la propiedad. La capacidad para dividir una región articulando diferencias en el manejo del tiempo, así como en la frecuencia e intensidad de los fenómenos entre las distintas zonas, puede ser de ayuda para quienes tienen la responsabilidad de definir políticas adecuadas para el manejo de incendios forestales y planificar el manejo de recursos. Varias publicaciones recientes muestran la manera en que las distribuciones por área de incendios forestales corresponden a la llamada distribución de ley potencial (power-law distribution). Sin embargo, una distribución de ley potencial, o cualquier distribución desequilibrada de un conjunto de incendios forestales en una región dada, también puede surgir de agregar zonas caracterizadas por rasgos distintos relacionados con la incidencia de incendios forestales. Partiendo de esta base, y suponiendo que una distribución de ley potencial puede ser representativa de la distribución de frecuencia por zona en un área geográfica particular, presentamos y discutimos en nuestra ponencia un procedimiento para la selección de zonas homogéneas para la caracterización de los incendios forestales, refiriéndonos a un estudio de caso real. Los resultados muestran que el cálculo de los parámetros en la distribución de ley potencial, junto a la caracterización del régimen de incendios forestales de un área determinada, ofrece un conjunto de resultados significativamente diferentes según la manera en que se divida un área en componentes. Además, se ha demostrado que es imposible distinguir, dentro de una región, distintos regímenes de incendio que caractericen las diferentes zonas.

Palabras clave: Estadísticas de frecuencia por zona, incendios forestales, power-law distribution (distribución de ley potencial), valuación de riesgos.

Introducción

En muchos ecosistemas, el fuego es fundamental para la supervivencia y la cohabitación continua de las especies existentes. En estas zonas, el ecosistema

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Fondazione CIMA, Italian Civil Protection Department, University of Genova, regione Liguria Italy. (e-mail: *name.surname@unige.it*)

forestal y el régimen de incendios suelen estar en equilibrio (Weber y Flannigan, 1997). En ecosistemas dominados por el hombre, resulta difícil identificar dicha relación de equilibrio entre el ecosistema forestal y la distribución de frecuencia de incendios por zona. En algunas áreas, la presencia del hombre ha modificado radicalmente los ecosistemas, reduciendo o eliminando especies nativas y sustituyéndolas por especies capaces de garantizar nuevos recursos para una población que crece constantemente. Los fuegos causados naturalmente son insignificantes en estas áreas. En Italia, por ejemplo, el 99% de los incendios forestales son provocados por el hombre. Muchos de estos incendios forestales ponen en riesgo zonas urbanas y requieren intervenciones complejas y costosas. La mano del hombre, al provocar y extinguir incendios forestales, afecta la frecuencia y el alcance de los mismos. En este caso, si la identificación de un régimen de incendios tiene sentido, comprender dicho régimen podría ser de utilidad para los controladores de incendios forestales. Los programas de protección contra incendios forestales requieren el diseño de elementos de infraestructura (por ejemplo, cortafuegos, redes hidráulicas, carreteras rurales, etc.) así como el uso coordinado de varios recursos móviles (por ejemplo, camiones, motores, aviones cisterna, humanos, etc.). La efectividad de estos recursos en casos de emergencia guarda relación con las temporadas de incendios, puesto que la dinámica de los fuegos se rige por las condiciones meteorológicas y el estado en que se encuentre la vegetación.

Los altos costos de adquisición, administración y mantenimiento de estos recursos solo pueden justificarse tras un análisis cuidadoso del sacrificio implicado por los costos y los beneficios reales que se pueden obtener de los recursos. Semejante análisis podría llevarse a cabo con el objetivo de articular diferencias en el tiempo, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos entre las distintas zonas de una región dada. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es desarrollar un acercamiento adecuado a la caracterización de la distribución promedio del riesgo de incendios forestales en una región particular.

Varias publicaciones, en los últimos años, han estudiado la evaluación de la distribución promedio del riesgo de incendios forestales en un área particular. Algunos autores consideraron el riesgo como la intensidad potencial que un fuego puede asumir en conexión con la topografía, la vegetación, el clima y, sobre todo, las condiciones promedio del material combustible (Núñez-Regueira y otros, 1999; Filippidis y Mitsopoulos, 2004). Otro acercamiento sería el análisis estadístico de grandes bancos de datos acerca de la incidencia de incendios forestales (Forestry Canada Fire Danger Group, 1992; McKenzie otros, 2000; Riera y Mogas, 2004; Iliadis, 2005).

Los acercamientos que se basan en la identificación de la “frecuencia de

eventos” son populares y proveen resultados sólidos. Sin embargo, vale la pena mencionar que los incendios forestales, al igual que otros fenómenos naturales (por ejemplo, deslizamientos del terreno, terremotos, inundaciones) se caracterizan por un gran número de eventos de baja intensidad y por un pequeño número de eventos extremos. Tal comportamiento se puede representar adecuadamente mediante una distribución de ley potencial. La distribución de ley potencial es una de las más usadas en la caracterización estadística de los regímenes de incendios forestales (Malamud y Turcotte, 1998; Ricotta y otros, 1999; Song y otros, 2001; Turcotte y Malamud, 2004; Telesca y otros, 2005; Malamud y otros, 2005). Sin embargo, podría obtenerse una distribución de ley potencial si se tiene un conjunto de incendios forestales en una región dada, al que se añadan zonas caracterizadas por distintos rasgos relacionados con la incidencia de incendios dentro de la región.

La meta de esta ponencia es definir un procedimiento que sea aplicable en la práctica y válido en lo conceptual, y que, a partir de la información disponible en las bases de datos históricas sobre incendios, sirva para diferenciar, en el tiempo y el espacio, distintos regímenes de incendio, como sería la combinación del cronometraje, la frecuencia y la magnitud de todos los incendios que ocurran en una región dada.

Un estudio de caso pertinente a Liguria, una Región Administrativa de la costa noroeste de Italia que a menudo se ve afectada por graves incendios forestales, ha sido seleccionado para evaluar la efectividad del acercamiento propuesto.

Métodos

En las distribuciones de ley potencial, el número de eventos de cierta magnitud que se espera en una zona geográfica y en un intervalo determinados, es proporcional a una potencia dada de dicha magnitud (Newman, 2005). En el caso particular de los incendios forestales, el tamaño de su huella es una medida de la magnitud del evento (Malamud y otros, 1998). Esta selección se justifica tras considerar que las zonas quemadas son mensurables y que sus medidas pueden obtenerse de los registros de datos relacionados con la incidencia de incendios forestales en una región dada.

Según la formulación de Malamud y otros (2005), definimos n como el número de incendios con huellas A_F que pertenecen al intervalo $[A_F - \varepsilon, A_F]$, donde ε representa la amplitud del intervalo. Por tanto, las densidades de frecuencia $f(A_F)$ de aquellos incendios que ocurren en intervalos ‘de unidad’, se obtienen de $f(A_F) = n/\varepsilon$. Malamud y otros (2005) también formularon que, en una región y periodo dados, la

densidad de frecuencia $f(A_F)$ en la zona quemada A_F estará sujeta a una relación como la que se observa en las distribuciones de ley potencial:

$$f(A_F) = \alpha A_F^{-\beta} \quad (1)$$

donde α y β son constantes adecuadas (reales). En los ejes log-log, (1) corresponde a una relación lineal $\square$

$$\log[f(A_F)] = -\beta \log[A_F] + \log \alpha \quad (2)$$

Al trabajar con datos de observaciones experimentales o de bases de datos históricas, si es que hubiera un conjunto significativo de datos, los valores de $f(A_F)$ para cada intervalo pueden registrarse en un diagrama log-log y ser interpolados linealmente, usando mínimos cuadrados ordinarios, según la estructura de la relación de ley potencial en (2). Se obtienen los “mejores” (en el sentido de los cuadrados mínimos) valores del $\log \alpha$ y β para una región y un intervalo dados.

Por lo tanto, el número esperado de incendios con una huella en el intervalo $[A_F - \varepsilon, A_F]$ en un intervalo de longitud temporal τ , y en un área A_R , nos es dado mediante $\tau A_R \alpha A_F^{-\beta}$ siempre y cuando haya homogeneidad en los factores de tiempo y espacio. Además, y aún en referencia a Malamud y otros (2005), el número esperado $N_F(A_F, A_R, \tau)$ de incendios forestales con una huella mayor o igual a un área dada A_F , dentro de una región del área A_R , y un intervalo de tiempo de longitud τ , se obtiene mediante la ecuación:

$$N_F(A_F, A_R, \tau) = \tau A_R \int_{A_F}^{\infty} f(x) dx = \tau A_R \frac{\alpha}{\beta - 1} A_F^{1-\beta} \quad (3)$$

Finalmente, la recurrencia del intervalo $T(\geq A_F)$ de incendios forestales en una región del área A_R , en un horizonte de tiempo cuya longitud sea τ , caracterizada por huellas mayores que, o iguales a, un área dada A_F , se obtiene mediante la ecuación:

$$T(\geq A_F) = \frac{\tau + 1}{N_F(A_F, A_R, \tau)} = \frac{\tau + 1}{\tau} \frac{\beta - 1}{\alpha} \frac{A_F^{\beta-1}}{A_R} \quad (4)$$

No obstante, añadir la información disponible de una región en una única relación de ley potencial podría ser engañoso, puesto que la región considerada podría contener subregiones que se caractericen por tener regímenes de incendios significativamente diferentes. Es necesario estudiar el problema de la subdivisión de una región dada, ya que puede haber razones que lleven a distintas caracterizaciones de las subregiones. Es posible que estas razones correspondan a diferencias en los tipos de cubierta vegetal, en la topografía y en las condiciones climáticas, así como al uso del terreno y a otras características socioeconómicas.

Al dividir una región, se establecen zonas que no se traslapan. Nótese que la subdivisión de una región específica en ecoregiones podría ser una manera correcta

de generar una partición significativa (Bailey, 1996; Cleland y otros, 2004; Malamud y otros, 2005). Sin embargo, una identificación clara y definida de las ecoregiones no resulta fácil, especialmente cuando se trabaja a pequeña escala y en presencia de patrones vegetales y topográficos complejos.

Se supone que la región que se va a analizar está compuesta por un conjunto de unidades de área elementales (por ejemplo, puede que correspondan a áreas administrativas de las municipalidades, pero podrían definirse arbitrariamente). Si $u_1, \dots, u_n$ corresponde a las unidades de área elementales, entonces la región considerada queda representada mediante el conjunto $U = \{u_1, \dots, u_n\}$.

Supongamos que $\{Z_i, i=1, \dots, K\}$ es un subconjunto de U . Una partición de la región en cuestión, por ejemplo, del conjunto U , se define como una selección de un conjunto de subconjuntos, a saber $\mathcal{P} = \{Z_i, i \in S\}$, con $S \subseteq \{1, \dots, K\}$, de manera que se cumplan las siguientes dos condiciones:

- a) $Z_i \cap Z_j = \emptyset$ para cada par (i, j) , de manera que $i, j \in S$, y $i \neq j$ (5)
- b) $\bigcup_{j \in S} Z_j = U$ (6)

La condición (5) implica que los subconjuntos $\{Z_j, j \in S\}$ no se traslapan en la partición, lo cual quiere decir que ninguna unidad de área puede pertenecer a dos (o más) subconjuntos en una partición. La condición (6) significa que la unión de todos los subconjuntos en una partición cubre todas las unidades de área en el conjunto U . En lo subsiguiente, la palabra zona se usará como sinónimo de subconjunto.

Hay muchas maneras de dividir una región dada (por ejemplo, el conjunto U). El objetivo principal de esta ponencia es proveer criterios para evaluar la calidad de una partición, fundamentados en la meta general de discernir entre aquellas áreas caracterizadas por tener regímenes de incendio diferentes.

Para poder evaluar la calidad de una partición, primero es necesario definir un índice de calidad para una zona Z_i . Sea $A_{F,h}$, $h = 1, \dots, H$ el intervalo de discretización a la extrema derecha definido *a priori* para la relación de ley potencial, y sea $n_{i,h}$ el número de incendios que ocurren en la zona Z_i (normalizado en relación al área de la zona y a la duración del periodo de observación) cuyas huellas se encuentran en el intervalo $[A_{F,h-1}, A_{F,h}]$ $h = 1, \dots, H$. Por tanto, m_i se define como el número de intervalos $[A_{F,h-1}, A_{F,h}]$ para el cual $n_{i,h} \neq 0$, y $B_i = \{h: n_{i,h} \neq 0\}$. Esto es, B_i es el conjunto de índices que corresponden a intervalos en los que se ha registrado al menos un incendio, y m_i es el número de sus elementos. Además, sea $N_i = \sum_{h \in B_i} n_{i,h}$ el número total de incendios ocurridos en la zona Z_i . Ahora bien, un posible índice de calidad para un subconjunto Z_i sería el siguiente

$$\Phi_i = \frac{1}{m_i - 2} \sum_{h \in B_i} [n_{i,h} + \beta_i \log(A_{F,h}) - \log \alpha_i]^2 \quad (7)$$

Si los parámetros de (2) se determinasen mediante una simple regresión lineal, y suponiendo que la ecuación (2) fuese perturbada por una secuencia de errores independientes con una media de cero y distribución normal, entonces Φ_i , que se define en (7), sería un estimador imparcial de la varianza residual.

El valor de Φ_i puede usarse como índice de calidad del subconjunto Z_i (a mayor valor de Φ_i , más pobre la calidad de Z_i , de manera que Φ_i puede verse como el costo de Z_i). Se puede obtener un índice de calidad para toda la partición si sumamos los índices de calidad Φ_i de los elementos en dicha partición. No obstante, la definición del índice de calidad de una partición como la suma de los índices provistos por (7) para los diversos subconjuntos en la partición podría favorecer incorrectamente aquellas particiones que tengan mayor número de subconjuntos, cada uno de los cuales es caracterizado por un número muy pequeño de intervalos. Esto no proveerá resultados muy significativos desde un punto de vista estadístico. Una manera de superar tal inconveniente sería la imposición de un número mínimo de intervalos que correspondan a un subconjunto viable. A pesar de ello, la dificultad de seleccionar un valor factible para tal límite implica que sería más apropiado el uso de algún método alternativo.

Usamos la suma de las varianzas estimadas de los parámetros estimados para el subconjunto Z_i , por ejemplo,

$$\Theta_i = \sigma_{\beta_i}^2 + \sigma_{\log \alpha_i}^2 \quad (8)$$

donde

$$\sigma_{\beta_i}^2 = \frac{\Phi_i}{\sum_{h \in B_i} \left(A_{F,h} - \sum_{h \in B_i} \frac{A_{F,h}}{m_i} \right)^2} \quad (9)$$

$$\sigma_{\log \alpha_i}^2 = \Phi_i \left(\frac{1}{m_i} + \frac{\left(\sum_{h \in B_i} \frac{A_{F,h}}{m_i} \right)^2}{\sum_{h \in B_i} \left(A_{F,h} - \sum_{h \in B_i} \frac{A_{F,h}}{m_i} \right)^2} \right) \quad (10)$$

A mayor valor en la suma de las varianzas estimadas Θ_i (8), peor será la selección del conjunto Z_i , puesto que se asocia con un conjunto para el cual la relación de ley potencial estimada se caracteriza por una regresión lineal con mayor varianza de parámetros. Θ_i puede usarse como medida de calidad (el costo) del

subconjunto Z_i , y en consecuencia, el costo de la partición $\mathcal{P} = \{Z_i, i \in S\}$ puede definirse mediante

$$\Psi = \frac{1}{|S|} \sum_{j \in S} \Theta_j \quad (11)$$

donde $|S|$ representa la cardinalidad del conjunto S , por ejemplo, el número de elementos en la partición.

Definido así el índice de calidad (costo) de una partición, es posible elegir, del conjunto de particiones posibles, una partición que pueda representar mejor el régimen de incendios del área estudiada.

Resultados

La región administrativa de Liguria (Italia) ha sido elegida para este estudio de caso. Liguria comprende 5400 km² ubicados entre la Costa Azul (Francia) y la Toscana (Italia) al noroeste, en la costa del Tirreno (Figura 1). En esta región mediterránea, de topografía compleja y densa vegetación, los incendios forestales son fenómenos recurrentes tanto en verano como en invierno porque, en promedio, ocurren aproximadamente 365 incendios de tamaño ≥ 0.01 km² y que queman un área de 55 km² al año. Esta alta densidad de fuegos se debe principalmente a la extensa cubierta vegetal (que cubre un 90% de la zona administrativa), a la recurrencia de condiciones climáticas apropiadas para la propagación rápida de los frentes de fuego y, finalmente, a la presencia de una interfaz urbano-forestal cada vez más amplia y continua, que cual atraviesa la región por toda la costa. A pesar de su pequeñez, Liguria representa un área de estudio interesante para el método que proponemos. De hecho, la región comprende diversidad de cubiertas vegetales, que van desde los *maquis* mediterráneos de la costa y los bosques de hoja ancha del interior, hasta los bosques de pino y abeto alpino.

Figura 1— Mapa de ubicación del área de estudio seleccionada, Liguria (Italia), indicada en rojo. Esta región de 5400 km² ubica entre los 43.7° y 44.7° N y entre 7.5° y 10,1° O.

En nuestro análisis, usamos dos conjuntos de datos diferentes. El primero se refiere al número de fuegos por municipio (o sea, unidad de área), y a la huella de cada incendio ocurrido entre los años 1987 y 2004. En esta base de datos, aparecen 6201 incendios forestales que quemaron un total de 1077 km² de terreno boscoso y de arbustos. La segunda está relacionada con la frontera de las zonas quemadas entre los años 1996 y 2006.

A partir del primer conjunto de datos, los parámetros de la relación de ley potencial fueron evaluados teniendo en cuenta toda Liguria. En la Tabla 1, se informan los valores de los parámetros β , $\log \alpha$ y la correlación del coeficiente r^2 , así como el valor del costo de Θ que se calculó mediante (8), el número m de intervalos $[A_{F,h-l}, A_{F,h}]$ para los cuales $n_h \neq 0$, y la recurrencia del intervalo T dada en (4) para que $A_F \geq 0.01$ km² y $A_F \geq 1$ km².

Tabla 1— Valores de los parámetros al usar la partición correspondiente a toda la región de Liguria.

β	$\log \alpha$	r^2	función costo Θ	N	A_R [km ²]	m	$T(\geq 0.01 \text{ km}^2)$ [días]	$T(\geq 1 \text{ km}^2)$ [días]
-1.86	-2.92	-0.960	0.0051	6201	5408.6	29	5.2	274.8

Puesto que esta partición cuenta con un sólo subconjunto, el costo de la partición, Ψ , definido mediante (11), representa el costo del subconjunto Θ , determinado en (8).

Se llevó a cabo un segundo análisis usando 10000 particiones aleatorias de Liguria, cada una de las cuales se componía de dos subconjuntos. Para realizar las particiones, no se consideraron límites de conectividad entre los subconjuntos. El valor promedio de Ψ en las 10000 particiones fue $\Psi = 0.0050$, con un valor mínimo de $\Psi = 0.0028$ y uno máximo de $\Psi = 0.0073$. Para entender mejor la variabilidad en la función de costo Ψ en relación con las 10000 particiones, usamos el histograma de los resultados obtenidos de la aplicación del procedimiento, que se muestra en la Figura 2.

Figura 2— Histograma de la función de costo Ψ obtenida de las 10000 particiones aleatorias de Liguria. Cada partición se componía de dos subconjuntos. La escala representa los valores de Ψ .

Del histograma en la Figura 2 se desprende que los valores de la función de costo Ψ están distribuidos bimodalmente, lo cual sugiere la coexistencia de, al menos, dos regímenes de incendio en la zona estudiada.

La información perteneciente al segundo conjunto de datos se usó para analizar cuidadosamente el tipo de vegetación vinculada con la ignición de los fuegos y al proceso de propagación subsiguiente. El análisis demostró que los incendios en el conjunto de datos estudiado se propagaban principalmente por medio de los arbustos. Sobre estas bases, el conjunto completo de municipios de Liguria fue dividido en dos subconjuntos, o sea, los 67 municipios cuyo territorio estaba cubierto de arbustos en más de 2 km² fueron clasificados en el primer subconjunto, llamado Z_1 , (representado en verde oscuro en la Figura 4), mientras los restantes fueron asignados al segundo subconjunto, llamado Z_2 . Por lo tanto, las 10000 particiones aleatorias se realizaron para Z_1 y para Z_2 . Los histogramas de la Fig. 3 muestran la variabilidad de la función de costo Ψ en relación con las 10000 particiones generadas aleatoriamente para el primer (izquierda) y segundo subconjunto (derecha), respectivamente.

Figura 3— Histogramas de la función de costo Ψ obtenida de las 10000 particiones generadas aleatoriamente en referencia al primer (izq.) y segundo (der.) subconjunto, respectivamente.

Merece la pena observar en la Figura 3, así como en los resultados numéricos de la Tabla 2, la diferencia aparente en términos de la distribución de la función de costo Ψ en ambos subconjuntos. El subconjunto Z_2 se caracteriza por una distribución unimodal de varianza reducida. Por el contrario, el subconjunto Z_1 todavía muestra una distribución bimodal denotada en el hecho de que los valores mínimos y máximos son más bajos que los obtenidos para el subconjunto Z_2 .

Tabla 2— Distribución de los parámetros de función de costo en referencia a la región de Liguria, subconjunto Z_1 y subconjunto Z_2 , respectivamente.

Función de costo	Cost function Θ				
	min	max	media	stdev	desviación estándar
Liguria	0.0028	0.0075	0.005	0.00084	
Z_1	0.0021	0.0077	0.0043	0.001	
Z_2	0.0029	0.0103	0.0044	0.00072	

La Fig. 4 muestra una representación gráfica de los dos subconjuntos, así como la huella de los incendios ocurridos en el periodo estudiado. Nótese que la mayoría de los incendios (> 1 hectárea) comenzó en municipios que pertenecen al subconjunto (zona) Z_1 , cuya vegetación está significativamente compuesta por arbustos.

Figura 4— Una representación gráfica de dos subconjuntos diferentes, junto a las áreas quemadas por incendios ocurridos en el periodo estudiado. Los municipios marcados con verde oscuro pertenecen a la zona Z_1 , que en su cubierta vegetal contienen más de 2 km^2 de arbustos. Los marcados con verde claro pertenecen a la zona Z_2 . Las regiones rojas representan las áreas quemadas entre los años 1996 y 2006.

La Tabla 3 presenta los valores de los parámetros β , $\log \alpha$, y el coeficiente de correlación r^2 pertinente a las diferentes zonas. También muestra el valor de costo Θ según calculado en (8), el número m de intervalos $[A_{F,h-1}, A_{F,h}]$ para los que $n_h \neq 0$, y el intervalo de recurrencia temporal T dado en (4) para $A_F \geq 0.01 \text{ km}^2$ y para $A_F \geq 1 \text{ km}^2$, respectivamente.

Tabla 3— Valores de parámetros mediante el uso de la partición correspondiente a las zonas Z_1 y Z_2 .

zona	β	$\log \alpha$	r^2	Función costo	N	A_R [km ²]	m	$T(\geq 0.01 \text{ km}^2)$ [días]	$T(\geq 1 \text{ km}^2)$ [días]
Z_1	-1.79	-2.75	-0.991	0.0483	3244	2294.3	29	4.5	168.7
Z_2	-1.81	-2.98	-0.990	0.0445	2957	3114.3	25	7.0	294.9

La Tabla 3 evidencia las diferencias en el comportamiento de las dos zonas con respecto al intervalo de recurrencia de incendios mayores de 1 km^2 . De hecho, aunque las dos zonas se caracterizan por un intervalo de recurrencia similar en el renglón de incendios menores de 0.01 km^2 , la zona Z_1 muestra un intervalo de recurrencia que es casi la mitad del de la zona Z_2 .

Conclusión

Esta ponencia presenta una herramienta matemática útil para la identificación de zonas caracterizadas por tener regímenes de incendio diferentes. Su aplicación en un

estudio de caso real muestra cómo regímenes de incendio diferentes podrían ser identificados simplemente a partir de la variabilidad en la función de costo. En investigaciones futuras, se llevarán a cabo análisis comparativos de los resultados provistos mediante la aplicación de la herramienta matemática propuesta, con información a priori relacionada con el uso del terreno, la densidad poblacional, asuntos sociales y los rasgos de los sistemas de respuesta en casos de incendio. La meta de este análisis será la identificación de los principales factores de riesgo.

Referencias

- Bailey, R.G. 1996. **Ecosystem Geography**. Springer-Verlag.
- Cleland, D.T., Crow T. R.; Saunders S. C., Dickmann D. I., Maclean A. L., Jordan J. K., Watson R. L., Sloan A. M., Broszofske K. D. 2004. **Characterizing historical and modern fire regimes in Michigan (USA): a landscape ecosystem approach**. *Landscape Ecol.* 19, 311-325.
- Filippidis, E.J., and I. D. Mitsopoulos 2004. **Mapping forest fire risk zones based on historical fire data in Mount Olympus, Greece, using Geographical Information Systems**. *Management Information Systems*, 9, 613-625.
- Forestry Canada Fire Danger Group 1992. **Development and structure of the Canadian Forest Fire Behavior Prediction System**. Information Report ST-X-3 Forestry CA, Ottawa, ON.
- Iliadis, L.S. 2005. **A decision support system applying an integrated fuzzy model for long-term forest fire risk estimation**. *Environmental Modelling & Software*, 20, 613-621.
- Malamud, B. D., G. Morei, and D. Turcotte 1998. **Forest fires: An example of self-organized critical behaviour**. *Science*, 281, 5384, 1840-1842.
- Malamud, B. D., and D. Turcotte 1998. **Self organized criticality applied to natural hazards**. *Natural Hazard*, 20, 93-116.
- Malamud B. D., J. D. A. Millington, and G. L. W. Perry 2005. **Characterizing wildfire regimes in the United States**. *PNAS*, vol. 102, 13, 4694-4699.
- McKenzie, D., D. L. Peterson, and J. K. Agee 2000. **Fire frequency in the Columbia River Basin: building regional models from history data**. *Ecological Applications*, 10, 1497-1516.
- Newman, M.E.J. 2005. **Power laws, Pareto distributions and Zipf's law**. *Contemporary Physics*. 46, 5, 323-351.
- Núñez-Regueira L., J. Rodriguez, J. Proupin, and B. Mourino 1999. **Design of forest biomass energetic maps as a tool to fight forest wildfires**. *Termochimica Acta*, 328, 111-120.
- Ricotta, C., G. Avena, and M. Marchetti 1999. **The flaming sandpile: self-organized criticality and wildfires**. *Ecological Modelling*, 119, 73-77.
- Riera P., J. Mogas 2004. **Evaluation of a risk reduction in forest fires in a Mediterranean region** *Forest Policy and Economics*, 6, 6, 521-528
- Song, W.G., W.C. Fan, B. H. Wang, and J. J. Zhou 2001. **Self-organized criticality of forest fire in China**. *Ecological Modelling*, 145(1), 61-68.
- Telesca, L., G. Amatulli, R. Lasaponara, and M. Santulli 2005. **Time-scaling properties in forest-fire sequences observed in Gargano area (southern Italy)**. *Ecological Modelling*, 185, 531-544.
- Turcotte, D. L., and B. D. Malamud 2004. **Landslides, forest fires, and earthquakes: examples of self-organized critical behavior**. *Physica A*, 340 (4), 580-589.
- Weber M. G., and M. D. Flannigan 1997. **Canadian boreal forest ecosystem structure and functioning in changing climate: Impact on fire regimes**. *Environmental Reviews*, 5, 3-4, 145-166.

Evaluación de los Incendios y Conservación de la Biodiversidad en los Estados Unidos Contiguos¹

K. Blankenship², J. Smith², A. Shlisky³, D. Johnson², y R. Swaty²

Resumen

La alteración del régimen de incendios representa una amenaza para la conservación de la diversidad biológica. Específicamente, los regímenes de incendios alterados a menudo causan cambios en la composición de plantas y animales, y en la estructura de los ecosistemas. El proyecto LANDFIRE Rapid Assessment (LFRA) diseñó recientemente una serie de mapas, entre ellos el Fire Regime Condition Class (Tipo de condición del régimen de incendios, una medida de la desviación de la vegetación actual de las condiciones referenciales de la vegetación), Fire Regime Groups (Grupos de Regímenes de Fuego) y Potential Natural Vegetation Groups (Grupos Potenciales de Vegetación Natural) para los Estados Unidos contiguos, que pueden ayudar a evaluar la amenaza contra los regímenes naturales de incendios y pueden ayudar a establecer prioridades de conservación. Presentamos los hallazgos de una evaluación del rol ecológico y de la integridad de los regímenes de incendios a través de los Estados Unidos contiguos, basada en los datos del LFRA. Además, presentamos ejemplos de posibles aplicaciones de los modelos de condición de referencia del LFRA y datos espaciales que podrían ser aplicados fuera de los Estados Unidos. Nuestros análisis de los datos destacan que períodos sin incendios frecuentes dominan los regímenes de incendios referenciales a través del área de evaluación y que aproximadamente el 80% de los ecosistemas y de los principales tipos de hábitat están de moderada a altamente desviados de sus condiciones ecológicas de referencia. Además, los resultados indican que las condiciones del régimen de incendios en las zonas de conservación o las tierras administradas por las agencias federales, no difieren sustancialmente de las condiciones en las zonas que están fuera.

Palabras claves: conservación de la biodiversidad, régimen de fuego, condiciones de clase de régimen de fuego, LANDFIRE, condiciones de referencia.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales, 29 de abril – 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² La Iniciativa Global para el Manejo del Fuego de The Nature Conservancy, Boulder, CO 80302 USA (email: kblankenship@tnc.org, Jim_Smith@tnc.org, Darren_Johnson@tnc.org, rswaty@tnc.org)

³ Ayn Shliskyera empleada de la Iniciativa Global para el Manejo del Fuego de The Nature Conservancy cuando se escribió esta ponencia, pero ahora trabaja en el Departamento del Interior de los Estados Unidos, Oficina para el Manejo de Tierras, Prineville, OR 97754 USA.

Introducción al Fuego y a la Conservación

El fuego es un proceso clave en muchos ecosistemas alrededor del mundo (Agee 1993; Hardesty et al. 2005; Myers 2006; Pyne et al. 1996). El fuego también puede destruir la ecología, por ejemplo, en lugares donde la exclusión del fuego ha causado una acumulación de combustible y un comportamiento alterado del fuego, o en donde la frecuencia de incendios ha aumentado en ecosistemas con especies que no han evolucionado ante la presencia del fuego. El exceso, la falta o el tipo inadecuado de fuego puede poner en riesgo la salud de la biodiversidad, muchas veces con consecuencias negativas para la sustentabilidad ecológica, social y económica (Brown & Smith 2000; Smith 2000; Hardesty et al. 2005; UN FAO 2006). Debido a que el fuego influye en procesos tales como el ciclo de nutrientes, las dinámicas de la vegetación y la composición de las especies, la alteración de los regímenes de incendios pueden eliminar las especies nativas, acelerar la erosión del suelo, degradar la calidad del agua y el hábitat de los peces, catalizar la desertificación y alterar la estructura del ecosistema y el hábitat de la fauna y la flora (Brown & Smith 2000; Smith 2000, Hassan et al. 2005). Los cambios en los patrones y políticas de uso de las tierras, tales como el desarrollo rural en tierras silvestres, la exclusión del fuego, las plantaciones de árboles y la conversión agrícola, han contribuido a los cambios en los regímenes de incendios en muchas áreas de los Estados Unidos (Weaver 1943; Cooper 1960; Covington & Moore 1994; Keane et al. 2002; Dellasala et al. 2004; Stephens & Ruth 2005). Los cambios en las dinámicas del fuego pueden también sumarse a otras amenazas a los ecosistemas, tales como el cambio climático, las especies invasivas, la cría de animales, el aclareo del terreno, la explotación maderera inapropiada y la fragmentación del terreno (Keane et al. 1999; Dale et al. 2001; Brooks et al. 2004; Hardesty et al. 2005; Myers 2006), lo cual frustra los esfuerzos hacia la conservación efectiva de la biodiversidad.

Debido a que la mayoría de los ecosistemas en los Estados Unidos dependen del fuego (Shlisky et al. 2007), este es necesariamente un proceso clave cuando se considera el manejo de tierras y se planifica la conservación. Las organizaciones de conservación y las agencias para la administración de tierras utilizan el fuego como herramienta para manejar los ecosistemas adaptados al fuego y los dependientes del fuego, e intentan reducir la amenaza de incendios en los ecosistemas sensibles al fuego y proteger la salud humana y el sustento. Entre julio del 2005 y junio del 2006 The Nature Conservancy, la organización de conservación más grande de los Estados Unidos, quemó más de 90,000 acres para favorecer la biodiversidad en sus propias tierras (Blankenship et al. 2007). Durante los años naturales 2005 y 2006 las agencias federales y estatales para la administración de tierras quemaron aproximadamente 2.8 millones de acres por año a través de la quema prescrita o del

uso de incendios forestales (<http://www.nifc.gov/nicc>). Sin embargo, no empecé estos y otros esfuerzos de parte de The Nature Conservancy y otros organismos para la administración de tierras, no está claro si se ha logrado un progreso significativo en cuanto a la restauración de ecosistemas adaptados al fuego y dependientes del fuego en zonas que se consideran críticas para la conservación de la biodiversidad o zonas administradas por agencias federales.

Este trabajo representa una sinopsis parcial de un informe técnico más amplio titulado *An Ecological Assessment of Fire and Biodiversity Conservation Across the Lower 48 States of the U.S.* (Una Evaluación Ecológica de los Incendios y la Conservación de la Biodiversidad a través de los 48 Estados Contiguos de EE.UU.) (Blankenship et al. 2007). La meta de este informe era mejorar nuestra comprensión científica de los roles ecológicos del fuego y la integridad de los regímenes de incendios en los Estados Unidos contiguos. Nuestro informe se basaba, principalmente, en los resultados del Rapid Assessment phase del Landscape Fire and Resource Management Planning Tools Project (LANDFIRE). LANDFIRE es un proyecto de cinco años de múltiples colaboradores que produce mapas y datos uniformes y exhaustivos que describen la vegetación y los regímenes de incendios en Estados Unidos, que pueden ser utilizados para la planificación estratégica y la evaluación a nivel nacional (para más información visite el sitio web www.landfire.gov). La fase Rapid Assessment (LFRA) del proyecto LANDFIRE, completada en 2006, produjo rápidamente una evaluación a nivel nacional, empleando mapas y modelos de grupos potenciales de vegetación natural, regímenes de incendios de referencia y desviaciones de las condiciones de referencia del régimen de incendios (o tipo de condición del régimen de incendios) para los Estados Unidos contiguos. Utilizamos los datos del LFRA para evaluar los roles ecológicos del fuego y la integridad de los regímenes de incendios en los Estados Unidos contiguos y en cada uno de los principales tipos de hábitat (Dinerstein et al. 1995). También contrastamos la integridad de los regímenes de incendios dentro y fuera de las áreas designadas por The Nature Conservancy como zonas de conservación por la importancia de su biodiversidad⁴ y de las tierras administradas por las agencias federales.

Datos y Métodos

Se pueden utilizar tres métricas —las condiciones de referencia, los grupos de

⁴ Las áreas de conservación por la importancia de su biodiversidad (áreas de conservación) son áreas identificadas mediante un proceso de planificación ecoregional que representa colectivamente ejemplos viables de todas las especies y comunidades vegetales nativas en una ecoregión. The Nature Conservancy ha tomado acción directa para conservar algunas, aunque no todas, las áreas de conservación.

regímenes de incendios y los tipos de condición de régimen de incendios — para describir los roles ecológicos del fuego y determinar el estado ecológico actual en los paisajes, regiones y principales tipos de hábitat.

Las condiciones de referencia son estimados de la escala de variabilidad en la composición, la estructura (p. ej., altura y cubierta arborea) y el proceso de la vegetación, con los cuales se pueden comparar las condiciones actuales y cuya desviación ecológica se puede calcular. Para el LFRA, las condiciones de referencia se basaron en condiciones de vegetación estimadas antes de la colonización europea e incluía la influencia de la quema por parte de los indígenas. Las condiciones de referencia para grupos potenciales de vegetación natural en los Estados Unidos contiguos fueron descritas y modeladas cuantitativamente por más de 250 expertos regionales en incendios y vegetación. Estos modelos cuantifican la frecuencia y severidad del fuego y otras alteraciones y las tasas de crecimiento de la vegetación. Los modelos de condiciones de referencia del LFRA se utilizaron para determinar los grupos de régimen de incendios y calcular el tipo de condición del régimen de incendios.

Los grupos de régimen de incendios (FRG, por sus siglas en inglés) son una clasificación de las características de los fuegos recurrentes —incluidas la frecuencia y severidad promedio de incendios— para un ecosistema en específico y puede utilizarse para describir el rol histórico o ecológico del fuego (Agee 1993; Brown 1995; Myers 2006). Para el LFRA, los FRG se definieron como sigue: Régimen de Incendios I: 0–35 frecuencia anual, severidad baja y mixta; Régimen de Incendios II: 0–35 frecuencia anual, severidad de reemplazo; Régimen de Incendios III: 35–200 frecuencia anual, severidad baja y mixta; Régimen de Incendios IV: 35–200 frecuencia anual, severidad de reemplazo; y Régimen de Incendios V: 200+ frecuencia anual, severidad de reemplazo.

El tipo de condición del régimen de incendios (FRCC, por sus siglas en inglés) es una medida relativa de la desviación de la vegetación actual y (cuando hay datos disponibles) las condiciones del régimen de incendios, de las condiciones ecológicas de referencia (Hann et al. 2004). A pesar de que el FRCC puede indicar el estado ecológico de los regímenes de incendios, éste puede utilizarse más ampliamente como medida de la desviación ecológica, ya que incluye las condiciones de la vegetación. Para el LFRA, las condiciones actuales de la vegetación fueron cartografiadas por las imágenes Landsat alrededor del 1998 al 2001 y de los datos de la National Land Cover Database, mientras que las condiciones de referencia se definieron por los modelos de condición de referencia del LFRA. Los FRCC se definen de la siguiente manera: FRCC 1: 0–33% desviado o dentro de la escala natural de variabilidad; FRCC 2: 34–66% desviado o desviación moderada de la escala natural de variabilidad; y FRCC 3: 67–100% desviado o desviación alta de la

escala natural de variabilidad.

Realizamos los siguientes pasos de análisis espacial para generar los resultados presentados en esta ponencia:

1. Para calcular los FRG y los FRCC en los Estados Unidos contiguos, resumimos las cuadrículas sin analizar de los LFRA FRG (USFS 2006a) y FRCC (USFS 2006b).
2. Para calcular los FRG y los FRCC en los principales tipos de hábitat (Figura 1) en los Estados Unidos contiguos, combinamos las cuadrículas de los FRG y los FRCC del LFRA con una cuadrícula de los tipos de hábitat principales que creamos utilizando un shapefile de ecorregiones terrestres obtenido de The Nature Conservancy.
3. Para calcular las FRCC dentro y fuera de las tierras administradas por las agencias federales (Figura 2) realizamos una combinación espacial de la cuadrícula de los FRCC del LFRA y la cuadrícula de tierras de origen desconocido administradas por las agencias federales.
4. Para calcular los FRCC dentro y fuera de las zonas de conservación, combinamos la cuadrícula de los FRCC del LFRA con la cuadrícula de las zonas de conservación que creamos utilizando un shapefile de zona de conservación del 2005 y actualizado para 12 ecorregiones. Luego, se combinó esta cuadrícula con la cuadrícula del hábitat principal para calcular el FRCC dentro y fuera de las zonas de conservación dentro de los tipos principales de hábitat (ver Blankenship et al. 2007 para una descripción completa de los datos y métodos).

Figura 1 –a Tipos de hábitat principales en los Estados Unidos contiguos

Figura 2 – Tierras administradas por las agencias federales en los Estados Unidos contiguos

Análisis de los datos

Los datos del LFRA proporcionan una evaluación de resolución moderada, rápida y de toda la nación. La interpretación de los datos del LFRA debe basarse en el hecho de que los datos fueron diseñados para la planificación estratégica a escala nacional y regional, las evaluaciones ecológicas exhaustivas y la distribución de recursos. Por ello, hemos restringido nuestra presentación de los datos a los niveles nacionales y

regionales, y nos hemos enfocado en los porcentajes y las comparaciones relativas entre las regiones, en lugar de presentar e interpretar valores absolutos.

Debido a que no hay disponibles datos espaciales uniformes de las características actuales del régimen de incendios (frecuencia y severidad del fuego) para todo los Estados Unidos, los resultados de FRCC del LFRA solo miden la desviación de la estructura y composición actual de la vegetación, de la condición de referencia. Esta medida puede ser interpretada de manera más amplia como un indicador de la desviación ecológica o como una representación imperfecta, pero la mejor disponible, de la desviación de los regímenes de incendio a lo largo de grandes extensiones geográficas. A pesar de que los regímenes de incendio alterados ciertamente influyen en la composición y estructura de la vegetación, otros factores también pueden causar cambios similares en la vegetación. Por ejemplo, ciertas prácticas del manejo forestal y la cría de animales domésticos, el cambio climático y las especies invasivas pueden alterar las características de la vegetación e influir en los cálculos del FRCC del LFRA. Dado que no hay disponible, a nivel nacional, información actual sobre regímenes de incendios (incluidas la distribución, frecuencia y severidad de los fuegos), la desviación de la vegetación es la mejor aproximación a las condiciones del régimen de incendios que existen hoy día en los Estados Unidos.

Los FRCC en el LFRA solo se calcularon para zonas que tienen vegetación natural o semi-natural. No se calcularon para zonas clasificadas como zonas de agua, de nieve, de hielo, de transportación, de minas, de canteras, o zonas agrícolas, urbanas o áridas. Tampoco se calculó para humedales, ya que estos no pueden ser cartografiados de manera confiable utilizando los métodos del LFRA o zonas alpinas, debido a su pequeña extensión. En esta evaluación, discutimos los resultados solo para esas áreas clasificadas como FRCC 1, 2 ó 3.

En algunos casos la condición de referencia se basa en la información histórica, la cual podría no reflejar las condiciones climatológicas o biofísicas actuales y podría no ser equivalente a la condición futura deseada para un área en particular, debido a las restricciones sociales. En estos casos, el FRCC podría necesitar ser complementada, para ser útil para el desarrollo de metas de conservación o medir estados o resultados de conservación.

Dos tipos principales de hábitat (las praderas y sabanas inundables y las praderas, sabanas y matorrales tropicales y subtropicales) que cruzan los Estados Unidos contiguos fueron excluidos de esta evaluación ya que su distribución principal está fuera de los Estados Unidos contiguos y a que éstos no representan un área suficiente para proveer resultados significativos, dada la resolución de los datos del LFRA. La capa espacial que representa las zonas de conservación de *The Nature Conservancy* utilizadas en este análisis no incluía las zonas de conservación de tres

ecorregiones (*Aspen Parkland*, *Dakota Mixed-Grass Prairie* y *Fescue-Mixed Grass Prairie*).

Resultados

Estados Unidos contiguos

Los análisis de la ecología y el estado de las condiciones del régimen de incendios en los Estados Unidos contiguos muestran varios resultados importantes para la conservación de la biodiversidad:

1. Los regímenes de incendios frecuentes dominan aproximadamente el 65% de los Estados Unidos contiguos (Tabla 1), aunque existen variaciones regionales.
2. Aproximadamente el 80% de los Estados Unidos contiguos tiene una desviación de las condiciones de referencia entre moderada y alta, lo que deja solo un 20% dentro de la escala de variabilidad descrita por la condición de referencia (Figura 3).
3. Existe muy poca diferencia entre las condiciones del FRCC dentro de las zonas de conservación (Figura 4) o las tierras administradas por el gobierno federal (Figura 5) en comparación con las condiciones fuera de estas zonas. Sin embargo, ya que los datos de FRCC del LFRA se calcularon para áreas geográficas grandes, estos pueden ocultar la variación local. Dentro de las zonas de conservación y las tierras administradas por el gobierno federal, donde ya se han tomado acciones para restaurar y mantener los regímenes de incendios, esperamos que las condiciones sean mejores que las indicadas por los datos del LFRA.

Tabla 1—*Grupos de régimen de incendios en los Estados Unidos contiguos.*

<i>Grupo de Régimen de Incendios</i>	<i>%</i>
1	33
2	32
3	11
4	9
5	15

Figura 3 –Tipo de condición del régimen de incendios en los Estados Unidos Contiguos.

Figura 4 – Tipo de condición del régimen de incendios dentro y fuera de las zonas de conservación de *The Nature Conservancy* en los Estados Unidos contiguos.

Figura 5 – Tipo de condición del régimen de incendios dentro y fuera de las tierras administradas por el gobierno federal en los Estados Unidos contiguos.

Principales tipos de hábitat

Los análisis de la ecología y el estado de las condiciones del régimen de incendios en los principales tipos de hábitat de los Estados Unidos contiguos muestran varios resultados importantes para la conservación de la biodiversidad:

1. A pesar de que una escala de grupos de régimen de incendios está presente en cada uno de los principales tipos de hábitat, los regímenes de incendios frecuentes dominan en tres de los cinco tipos. Los desiertos y formaciones arbustivas xéricas y los bosques, pastizales y matorrales mediterráneos tienen una mayor proporción de regímenes de incendios de baja frecuencia y alta severidad, comparados con otros tipos de hábitat (Tabla 2).
2. La desviación del FRCC es de moderada a alta (ej. FRCC 2 y 3) en los principales tipos de hábitat (Figura 6).
3. Existe poca diferencia entre las condiciones de la FRCC dentro y fuera de las zonas de conservación en los principales tipos de hábitat (Figura 7).

Tabla 2—*Grupos de régimen de incendios en los principales tipos de hábitat en los Estados Unidos contiguos.*

<i>Tipo de hábitat principal</i>	<i>Grupo de régimen de incendios (%)</i>				
	1	2	3	4	5
Desiertos y Formaciones Arbustivas Xéricas	11	24	11	25	29
Bosques, Pastizales y Matorrales Mediterráneos	29	21	4	42	5
Bosques Templados Latifoliados y Mixtos	57	7	12	1	23
Bosques Templados de coníferas	48	9	19	13	11
Praderas, Sabanas & Matorrales Templados	15	79	3	2	1

Figura 6 – Tipo de condición del régimen de incendios en los principales tipos de hábitat en los Estados Unidos contiguos.

Figura 7 – Contraste entre los tipos de condición de regímenes de incendios dentro y fuera de las áreas de conservación de *The Nature Conservancy* en los principales tipos de hábitat en los Estados Unidos contiguos. En cada par, las barras de la izquierda representan la distribución de FRCC dentro de las áreas de conservación; las barras de la derecha representan la distribución de FRCC fuera de estas áreas.

Posibles aplicaciones

La evaluación que presentamos aquí demuestra claramente varios usos de los datos del LFRA para el análisis dentro de los Estados Unidos. No obstante, existe una variedad de usos potenciales para estos datos fuera de los Estados Unidos:

1. Los modelos de condición de referencia que no están explícitos espacialmente pueden adaptarse a sistemas ecológicos similares fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, el modelo de condición referencial *Spruce Fir* de los Grandes Lagos (LFRA 2005), a pesar de haber sido desarrollado para las regiones de los Grandes Lagos, representa un tipo de vegetación extensa que se extiende hacia el norte en las regiones boreales de Canadá y Alaska. Se puede esperar una variabilidad considerable a través de toda la gama de sistemas *spruce fir* en el hemisferio norte, pero el modelo de los Grandes Lagos podría proporcionar un punto de partida para adaptar el modelo a otras regiones. De igual manera, la similitud entre algunos de los ecosistemas de praderas y coníferas del suroeste de los

Estados Unidos y los sistemas en su vecino, México, así como la similitud entre algunos ecosistemas de pinos en Florida y los sistemas de pinos en el Caribe, también convierten a los modelos estadounidenses en puntos de partida razonables para modelar estos sistemas más allá de los límites de los Estados Unidos. Estos modelos también podrían adaptarse a ecosistemas similares que no son geográficamente contiguos. Por ejemplo, los modelos de pradera del centro de los Estados Unidos podrían proporcionar un punto de partida para crear modelos para las sabanas africanas o las praderas mongoles.

2. Los modelos de condiciones de referencia pueden utilizarse para predecir las condiciones de la vegetación bajo diferentes manejos o climas. Por ejemplo, Forbis y otros (2006) usaron modelos de dinámicas de vegetación, similares a los producidos por el proyecto *LANDFIRE*, para probar múltiples escenarios de restauración, incluidos la supresión total del incendio, el uso de incendios forestales en áreas designadas, el uso de incendios forestales en tipos de vegetación designados, la ausencia de ganadería y la restauración con un presupuesto mayor en la Gran Cuenca (Great Basin). El modelo les permitió analizar el impacto que cada escenario tendría, al pasar el tiempo, en la distribución de la vegetación en el área estudiada. Forbis y otros investigadores concluyeron que a pesar de que los modelos estaban limitados por el conocimiento general de las dinámicas de la vegetación, estos proporcionaron una herramienta para evaluar el impacto potencial de los diferentes escenarios de planificación de uso de tierras. En un análisis realizado por Shlisky y otros investigadores (2005) para comparar los resultados de un modelo menos elaborado del LFRA con un modelo local similar basado en los datos de incendios históricos locales, los autores concluyeron que —las condiciones de referencia validadas, tales como aquellas descritas aquí, proveen mayor certeza científica para la toma de decisiones en la conservación y administración de tierras locales y contribuyen a las justificaciones para usar y refinar modelos menos elaborados en otros lugares (Shlisky et al. 2005).”
3. Los métodos de *LANDFIRE* para desarrollar modelos de condición de referencia no son específicos en cuanto a la geografía y por tanto, podrían ser utilizados para desarrollar condiciones de referencia para otras regiones. Los modelos de condición de referencia del LFRA se desarrollaron en talleres de expertos celebrados por todo el país y refinados a través de un proceso de revisión del modelo que se efectuó durante talleres, via email y en pequeñas reuniones. Los modelos cuantitativos se construyeron utilizando la *Vegetation Dynamics Development Tool* (Herramienta de desarrollo para las dinámicas de la vegetación) (Beukema et al. 2003), un *software* de dominio público. Los documentos adjuntos de descripción del modelo se crearon utilizando la base de

datos del *ModelTracker*, una herramienta disponible al público desarrollada por el proyecto *LANDFIRE*. Este proceso requiere participantes comprometidos, insumo cuantitativo, por parte del usuario, acerca del ritmo y las vías a la sucesión y las perturbaciones, un *software* gratis y una computadora que contenga el programa Microsoft Windows 2000, o una versión más adelantada, y 512 megabytes de memoria.

4. Los métodos de cartografiado de *LANDFIRE*, incluidos los modelos de predicción de paisajes, la detección a distancia y la simulación de ecosistemas, pueden utilizarse para obtener información sobre incendios y vegetación en otras áreas geográficas. Son necesarios conocimientos tecnológicos, recursos suficientes de *hardware* y *software* y la disponibilidad de datos e imágenes detectadas a distancia para utilizar los métodos de cartografiado de *LANDFIRE* en otras partes.

Conclusión

Estos análisis reafirman el hecho de que el fuego es un factor ecológico dominante en los ecosistemas de los Estados Unidos contiguos y que los regímenes de incendios han sido alterados en la mayor parte del país y en todos los tipos de hábitat principales. Además, nuestros análisis indican que el nivel de la desviación del régimen de incendios en las áreas de conservación de *The Nature Conservancy* o las tierras administradas por el gobierno federal no difiere de la desviación en las zonas que están fuera de esas áreas. Estos resultados sugieren que aun en las zonas conservadas o protegidas se necesita trabajar para mejorar las condiciones del régimen de incendios. También, a pesar de que las zonas de conservación identificadas por *The Nature Conservancy* pueden ser importantes por su biodiversidad, muchas de ellas podrían estar en una condición ecológica pobre, como lo demostró su nivel de desviación del FRCC. El trabajo de conservación dentro de las áreas que tienen una desviación de su condición de referencia de moderada a alta podría requerir un aumento en los esfuerzos de restauración para conservar la biodiversidad que contienen. A pesar de los esfuerzos de *The Nature Conservancy* y las agencias federales para la administración de tierras, así como otras agencias, para restaurar y mantener los regímenes de incendios de referencia, existe una distancia entre la escala de regímenes de incendios alterados y la escala de esfuerzos de restauración en los Estados Unidos contiguos.

Los conjuntos de datos a nivel nacional, tales como los datos del LFRA utilizados en esta evaluación, brindan una herramienta útil para realizar análisis estratégicos y una planificación de alto nivel que pueda informar las decisiones sobre política pública y la distribución de recursos. Los usuarios deberían recordar que la resolución de los datos espaciales del LFRA es probablemente insuficiente para el

trabajo a nivel de este tipo de proyecto. Sin embargo, los datos del LFRA pueden utilizarse para detectar lugares donde se necesita una mejor resolución y evaluaciones de paisajes en el terreno, para identificar los lugares en los que los regímenes de incendios podrían estar degradados y en donde sería viable su restauración. Aunque los datos del LFRA fueron diseñados para los Estados Unidos contiguos, los modelos de condición de referencia que no son espacialmente explícitos, así como los métodos de cartografiado del proyecto *LANDFIRE*, podrían ser adaptados para el uso en áreas fuera de los Estados Unidos.

Referencias

- Agee, J.K. 1993. *Fire Ecology of Pacific Northwest Forests*. Island Press, Washington D.C., USA.
- Beukema, S.J., W.A. Kurz, C.B. Pinkham, K. Milosheva & L. Frid. 2003. *Vegetation Dynamics Development Tool User's Guide, Version 4.4c*. Prepared by ESSA Technologies, Ltd., Vancouver, BC. 239 pp. Available at: www.essa.com.
- Blankenship, K., A. Shlisky, W. Fulks, E. Contreras, D. Johnson, J. Patton, J. Smith and R. Swaty. 2007. *An Ecological Assessment of Fire and Biodiversity Conservation Across the Lower 48 States of the U.S. Global Fire Initiative Technical Report 2007-1*. The Nature Conservancy, Arlington, VA.
- Brooks, M.L., C. M. D'Antonio, D. M. Richardson, J. B. Grace, J. E. Keeley, J. M. DiTomaso, R. J. Hobbs, M. Pellant & D. Pyke. 2004. Effects of invasive alien plants on fire regimes. *BioScience* 54(7): 677-688.
- Brown, J. K. 1995. Fire regimes and their relevance to ecosystem management. Pp. 171-178 in *Proceedings of Society of American Foresters National Convention*; 1994 Sept. 18-22; Anchorage, Alaska. Society of American Foresters, Bethesda, Maryland, USA.
- Brown, J.K. & J. Smith (eds.). 2000. *Wildland Fire in Ecosystems: Effects of Fire on Flora*. General USDA Forest Service Technical Report RMRS-GTR- 24, Ogden, Utah, USA.
- Cooper, C.F. 1960. Changes in vegetation, structure, and growth of southwestern pine forests since white settlement. *Ecological Monographs* 30:129-164.
- Covington, W.W. & M.M. Moore. 1994. Postsettlement changes in natural fire regimes and forest structure: ecological restoration of old-growth ponderosa pine forests. *Journal of Sustainable Forestry* 2:153-181.
- Dale, V.H., L.A. Joyce, S. McNulty, R.P. Neilson, M.P. Ayres, M.D. Flannigan, P. J. Hanson, L.C. Irland, A.E. Lugo, C.J. Peterson, D. Simberloff, F.J. Swanson, B.J. Stocks & B.M. Wotton. 2001. Climate change and forest disturbances. *BioScience* 51(9): 723-734.
- Dellasala, D.A., J.E. Williams, C.D. Williams & J.F. Franklin. 2004. Beyond smoke and mirrors: a synthesis of fire policy and science. *Conservation Biology* 18(4):976-986.
- Dinerstein, E., D.M. Olson, D.H. Graham, A.L. Webster, S.A. Primm, M.P. Bookbinder & G. Ledec. 1995. *A conservation assessment of the terrestrial ecoregions of Latin America and the Caribbean*. World Wildlife Fund and the World Bank, Washington D. C.
- Forbis, T.A., L. Provencher, L. Frid & G. Medlyn. 2006. Great Basin land management planning using ecological modeling. *Environmental Management* 38(1):62-83.
- Hann, W., A. Shlisky, D. Havlina, K. Schon, S. Barrett, T. DeMeo, K. Pohl, J. Menakis, D. Hamilton, J. Jones & M. Levesque. 2004. *Interagency Fire Regime Condition Class Guidebook*. Interagency and The Nature Conservancy fire regime condition class web site. USDA Forest Service, US Department of the Interior, The Nature Conservancy, and Systems for Environmental Management. www.frcc.gov.
- Hardesty, J., R.L. Myers & W. Fulks. 2005. Fire, ecosystems, and people: a preliminary assessment of fire as a global conservation issue. *The George Wright Forum* 22:78-87.
- Hassan, R., R. Scholes & N. Ash (eds). 2005. *Findings of the Condition and Trends Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, Volume 1*. University of Pretoria Council for Science and Industrial Research UNEP World Conservation South Africa, South Africa Monitoring Centre, United Kingdom. Island Press Washington, D.C.

- Keane, R.E., K.C. Ryan & M.A. Finney. 1999. Simulating the consequences of fire and climate regimes on a complex landscape in Glacier National Park, Montana. *Fire in Ecosystem Management: Shifting the Paradigm from Suppression to Prescription*. 20th Tall Timbers Fire Ecology Conference Proceedings, No. 20.
- Keane, R.E., K.C. Ryan, T.T. Veblen, C.D. Allen, J. Logan & B. Hawkes. 2002. *Cascading Effects of Fire Exclusion in Rocky Mountain Ecosystems: A Literature Review*. General Technical Report RMRS-GTR-91.
- LANDFIRE Rapid Assessment (LFRA). 2005. Potential Natural Vegetation Group R6GLSF- Northern Mixed Grass Prairie: Description, [Online]. In: Rapid assessment reference condition models. In: LANDFIRE. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Lab; U.S Geological Survey; The Nature Conservancy (Producers). Available: <http://www.landfire.gov/ModelsPage2.html>. [2007, January 9].
- Myers, R.L. 2006. *Living with Fire: Sustaining Ecosystems and Livelihoods through Integrated Fire Management*. The Nature Conservancy. Tallahassee, FL.
- Pyne, S. J., P.L. Andrews & R.D. Laven. 1996. *Introduction to Wildland Fire*. 2nd ed. John Wiley and Sons, New York, New York, USA.
- Shlisky, A.J., R.P. Guyette, & K.C. Ryan. 2005. Modeling reference conditions to restore altered fire regimes in oak-hickory-pine forests: validating coarse models with local fire history data. *EastFire conference Proceedings*. George Mason University, Fairfax, VA. May 12-13, 2005.
- Shlisky, A., J. Waugh, P. Gonzalez, M. Gonzalez, M. Manta, H. Santoso, E. Alvarado, A. Ainuddin Nuruddin, D.A. Rodríguez-Trejo, R. Swaty, D. Schmidt, M. Kaufmann, R. Myers, A. Alencar, F. Kearns, D. Johnson, J. Smith, D. Zollner and W. Fulks. 2007. *Fire, Ecosystems and People: Threats and Strategies for Global Biodiversity Conservation*. GFI Technical Report 2007-2. The Nature Conservancy. Arlington, VA.
- Smith, J.K. 2000. *Wildland Fire in Ecosystems: Effects of Fire on Fauna*. General USDA Forest Service Technical Report RMRS-GTR-42-vol. 1, Ogden, Utah, USA.
- Stephens, S.L. & L.W. Ruth. 2005. Federal forest-fire policy in the United States. *Ecological Applications* 15: 532-542.
- UN Food and Agriculture Organization (UNFAO). 2006. *Global Forest Resource Assessment: Progress Toward Sustainable Forest Management*. FAO Forestry Paper 147, Rome Italy. ISBN 92-5-105481-9.
- United States Forest Service. 2006a. *LANDFIRE Rapid Assessment Reference Fire Regimes (rarfrg)*: USDA Forest Service/Fire Science Laboratory, Rocky Mountain Research Station, Missoula MT.
- United States Forest Service. 2006b. *LANDFIRE Rapid Assessment Fire Regime Condition Classes (rafrcc)*: USDA Forest Service/Fire Science Laboratory, Rocky Mountain Research Station, Missoula MT.
- Weaver, H. 1943. Fire as an ecological and silvicultural factor in the ponderosa pine region of the Pacific slope. *Journal of Forestry* 41:7-14.

Reflexiones Acerca de la Eficiencia de los Tratamientos de Combustible¹

Philip N. Omi²

Resumen

Los tratamientos de combustible pueden clasificarse según el objetivo (p. ej, la reducción del peligro en contraposición a la restauración ecológica), el tipo de tratamiento (mecánico frente a la quema prescrita u otras actividades que utilizan el fuego), y la escala (el proyecto en contraposición al paisaje), entre otros criterios. Sus ventajas y desventajas con respecto a las actividades de extinción de incendios dependen, en parte, del régimen histórico de incendios y de la intensidad del tratamiento. En algunos ecosistemas, como en los bosques de pino amarillo (*Pinus ponderosa*), que históricamente han sufrido una baja severidad de quema, los tratamientos que reducen el peligro pueden satisfacer metas de restauración a la vez que reducen la futura severidad de quema. En dichos sistemas existe el potencial para la reducción de los costos y las pérdidas por extinción siempre y cuando se apliquen estratégicamente tratamientos intensivos en todo el paisaje. En otros ecosistemas –por ejemplo, los chaparrales o bosques de alta elevación, que normalmente arden con una alta severidad de quema- los tratamientos para la reducción de peligro pueden resultar incompatibles con los objetivos de restauración y, a su vez, pueden tener poco impacto en la reducción de las pérdidas y los costos de extinción de incendios. De manera similar, el uso de los incendios forestales y las respuestas de manejo apropiadas puede que no reduzcan los peligros ni restauran los ecosistemas, por ejemplo, si la quema de baja severidad o las estrategias de pastoreo son incongruentes con los regímenes históricos de incendio. Quizás sea necesario reconsiderar nuestro entendimiento de la efectividad de los tratamientos de combustible a la luz de los cambios climáticos. Tal vez lo que parecen transacciones ventajosas en los ambientes de hoy no sigan siéndolo en el futuro. Las estrategias de manejo adaptativo parecerían tener sentido al evaluar las ventajas y desventajas con respecto a las actividades de extinción de incendios, especialmente a la luz de un aumento en la incertidumbre.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas Comunes y Aproximaciones, 29 de abril al 2 de mayo, 2008, Carolina, Puerto Rico Carolina, Puerto Rico.

² Catedrático Emérito, Colorado State University, Department of Forest, Rangeland, y Watershed Stewardship, Fort Collins, CO 80523-1472 (Philip.Omi@ColoState.edu).

Palabras claves: Efectividad de los tratamientos de combustible, manejo de combustible, tratamientos de combustible.

Introducción

Durante décadas, los administradores de tierras públicas de EE.UU. han desarrollado actividades de tratamiento de combustibles, principalmente la reducción de peligro con el objetivo facilitar los esfuerzos de una eventual extinción de incendios. El fundamento que comúnmente se asoció con aquellos primeros esfuerzos fue el de la reducción de las cargas de combustible que se habían acumulado en las tierras boscosas, debido a las prácticas de exclusión de fuego del siglo XX. A medida que aumentó la conciencia ecológica a partir de los años setenta, las razones para tratar los combustibles llegaron a ser más abarcadoras, y pretendían incluir la restauración o el mantenimiento de la salud de los ecosistemas, o ambas cosas. Otras preocupaciones incluyen la interfaz urbano-forestal, las tierras silvestres no madereras, como las praderas y los matorrales, y la seguridad de las personas que extinguen incendios. El fuego desempeña un papel incluso en el manejo de las zonas ribereñas y en las charcas primaverales intermitentes. El punto es que las motivaciones para el tratamiento del combustible se han expandido considerablemente junto con la comprensión del papel ecológico del fuego en la dinámica de los ecosistemas.

Los métodos de tratamiento del combustible no han cambiado mucho, a pesar de la expansión en las motivaciones para manipular las camas de combustible. Básicamente, los tratamientos comprenden las aplicaciones con fuego y sin este (incluidas las mecánicas, las biológicas y las químicas) en la escala de paisaje y de rodal. Sin embargo, conforme se ha extendido la motivación para los tratamientos de combustible, también se ha expandido la necesidad de herramientas analíticas que evalúen los impactos económicos y políticos de las alternativas del manejo de dichos combustibles.

Mi propósito es examinar algunos principios básicos de los tratamientos de combustible para la reducción del peligro y para la restauración ecológica, como mecanismo conducente a otros problemas relacionados con las evaluaciones económicas y de política pública. Para mantenerme en el tema de esta sesión, también hablaré, al final, acerca de si los efectos del tratamiento de combustibles para la reducción del peligro son ilusorios o no.

Una perspectiva histórica de la planificación del manejo del combustible en EE. UU.

En el pasado, las organizaciones federales, estatales y locales de EE.UU. han seguido sus propios procedimientos en la planificación de los tratamientos de combustible. Durante gran parte del siglo XX, los bosques nacionales se administraban, principalmente, para el manejo de madera, y el manejo del fuego se veía como una actividad en función de la madera y de otros recursos naturales (pastizales, agua, vida silvestre, etc). Los temores a una escasez de madera a principios de siglo dieron paso a una preocupación por el impacto ambiental de la explotación forestal y de otras actividades de manejo. Después del Día de la Tierra en 1970. Dependiendo de la ecología forestal de la región, hasta hace poco la planificación de los bosques estuvo fuertemente inclinada a un abastecimiento perpetuo de madera, con un énfasis secundario en los usos múltiples y en el desarrollo de la comunidad humana. El cortar los árboles de los bosques, entre ellos “los rodales maduros”, alteró drásticamente las camas de combustible y los microambientes asociados a ellas.

De esta forma, en las áreas boscosas se requería el manejo de combustibles a fin de reducir los peligros para la regeneración (disposición de maleza), o para disponer de los residuos de corta. En lugares como el sur de California, lugar con relativamente poca producción de madera, los tratamientos de combustible se llevaban a cabo con la justificación de la protección y del manejo de las cuencas hidrográficas. Además, los parques nacionales se enfocaron cada vez más en la restauración de los ecosistemas en los cuales se había excluido el fuego, junto con la reducción del peligro cerca de las áreas desarrolladas. Más recientemente, otras instituciones federales han reconocido este doble mandato del manejo de la tierra. En contraste, las jurisdicciones locales y estatales han llevado a cabo tratamientos de combustible principalmente para la reducción de peligro con el propósito de facilitar los objetivos de extinción.

Uno de los primeros experimentos federales documentados con la quema prescrita ocurrió en las praderas de *cladium jamaicense* del Parque Nacional de los Everglades, con el fin de controlar las especies de frondosas tropicales que, en ausencia del fuego, reemplazaban a los pinos nativos. Los objetivos secundarios incluían la reducción de los peligros del combustible y el control de plantas exóticas. (Kilgore 1975). Anteriormente, los combustibles se manipulaban en el Bosque Nacional Angeles, principalmente mediante el establecimiento y el mantenimiento, desde los años 30, de corta combustibles y corta fuegos, para cuya instalación usaban trabajadores disponibles de organismos como el Civilian Conservation Corps.

El tratamiento de combustibles creció mucho durante los años 70, cuando el Servicio Forestal de los EE.UU. llevó a cabo esfuerzos masivos de replanificación de incendios, que incluían la reducción del peligro en los bosques nacionales. (Omi 1977). Además, en esos mismos años los administradores comenzaron a distinguir diferentes estrategias de tratamiento en camas de combustible en actividad (esto es, tras la cosecha o el aclareo de árboles) o naturales (Hirsch y otros 1981).

En 1978, el Servicio Forestal de EE.UU. revisó su política de incendios, e incluyó, entre otras cosas, la rentabilidad del manejo de incendios, y el aumento de la quema prescrita como parte de los planes del manejo de incendios. Dicha revisión de la política pública condujo al desarrollo del National Fire Management Analysis System [Sistema Nacional de Análisis y Manejo de Incendios] (NFMAS, por sus siglas en inglés), y proporcionó una herramienta para justificar los gastos del presupuesto de preextinción. El Fire Economics Evaluation System [Sistema de Evaluación de la Economía de Incendios] (FEES, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por los investigadores del Servicio Forestal en el Laboratorio del Fuego en Riverside, en parte, como respuesta a las deficiencias percibidas en el NFMAS (Omi y otros 1986).

En los primeros años de la década de los 80, luego de reconocer la importancia de presupuestar para la prescripción, el Servicio de Parques Nacionales desarrolló su propio proceso de programación de incendios (FIREPRO, por sus siglas en inglés), un sistema de análisis diseñado para asignar fondos tanto para la reducción de peligro como para los proyectos de manejo de recursos. Los proyectos de reducción del peligro se aplican a las áreas de un parque nacional que estén bajo amenaza de incendio (p. ej., áreas desarrolladas), mientras que los proyectos de manejo de recursos tienen que ver con la restauración ecológica que emplea el fuego en áreas de tierras silvestres de los parques.

Otros organismos federales que tienen responsabilidades de manejo de incendio han tomado prestadas herramientas del NFMAS o del FIREPRO, según lo requirieran sus necesidades analíticas. Por ejemplo, los negociados de Administración de Tierras y de Asuntos Indígenas adoptaron trozos de la porción del NFMAS que tiene que ver con el análisis de la preparación, mientras que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre modificó el FIREPRO. Como consecuencia, la planificación de los planes federales de preparación estaba inconexa. Además, ningún sistema consideraba todos los aspectos del programa sistemático de manejo de incendios implementado por los organismos. (Fire Program Analysis website 2005).

Con el nuevo milenio, las iniciativas federales como la Estrategia Cohesiva, el Plan Nacional de Incendios y el Programa Conjunto de Ciencia del Fuego aumentaron sustancialmente su énfasis en el manejo de incendios. Las revisiones de la política pública durante este período de tiempo también expresaron la necesidad de mejorar e integrar la planificación de los programas de incendios, incluidas las capacidades para evaluar la rentabilidad de los gastos en el tratamiento de combustibles.

El Análisis de Programas de Fuego (APF) representa un intento de unir varios análisis de programas (y recursos) de organismos federales para responder a los vacíos en los procesos de presupuesto de cada organismo, incluido el manejo de combustibles. Se han desarrollado, también, otras herramientas que examinan los aspectos económicos y políticos del manejo de combustibles, incluidas varias de las ponencias presentadas en este simposio.

Sin duda alguna, los desarrollos analíticos de un manejo positivo de los combustibles continuará durante el futuro previsible y deberá añadir considerablemente a nuestro base de conocimiento acerca de los tratamientos de combustible. Aún así, es pertinente que en este simposio se planteen preguntas acerca de qué tan lejos pueden llevarnos estos desarrollos. Además, a medida que seguimos el camino del énfasis expandido en los tratamientos de combustible, es lógico preguntarse si la ciencia cumplirá alguna vez con todos los requisitos para tomar decisiones de manejo importantes. Algunas de las preguntas que podrían hacerse serían: ¿Cuánta reducción en los costos de extinción de incendios se puede alcanzar mediante la implementación de una unidad de tratamiento de combustible (no importa cómo se defina)? ¿Puede un procesador evaluar cabalmente las implicaciones económicas y políticas de los tratamientos de combustible? ¿Cuán pertinentes y confiables son los procesadores disponibles para evaluar la planificación de los tratamientos de combustible; (esto es, sujeto a cambios climáticos, la retención de carbono, y otros asuntos)? Sin lugar a dudas, existen aún otras preguntas destacadas pero estas, al menos, sugieren ciertos asuntos significativos que deben resolverse.

Cómo se entiende hoy la eficiencia en el tratamiento de combustibles

Aunque los combustibles han estado sujetos a tratamiento durante décadas, la bibliografía acerca de la eficacia del tratamiento es sorpresivamente escasa. Omi y Martinson (2002) señalan algunos de los vacíos significativos en el entendimiento, basados en la bibliografía acerca del tratamiento de combustibles publicada entre 1955 y 1999. Quince estudios examinaron una variedad de tratamientos (quema

prescrita, aclareo, cosecha, y combinaciones de ellas), en rodales de pino y de coníferas mixtas. Se hicieron comparaciones con una variedad de áreas que no reciben tratamientos, aunque solo un estudio incluyó un grupo de control estadístico. Las variables de respuesta incluían el daño a las copas, el área quemada, la altura de la zona quemada, la mortalidad o la supervivencia de los árboles y el daño al suelo. Seis de los quince estudios emplearon pruebas estadísticas, aunque todas hablaban de resultados positivos (solo uno mixto). Así que los vacíos fueron tanto metodológicos como ecológicos. Así, gran parte del conocimiento existente era, como mucho, anecdótico.

Nuestro entendimiento de la eficacia del tratamiento de combustibles se ha expandido recientemente con la publicación de varios compendios (p. ej., Graham et ál., 2004; Peterson et ál., 2005; Agee y Skinner 2005). Estos resúmenes proveen nuevas perspectivas de las opciones de silvicultura, y se enfocan, principalmente, en el aclareo de árboles, la quema prescrita y las alternativas de aclareo y quema. El aclareo es un tratamiento cultural que, primordialmente, reduce la densidad de los rodales para mejorar el crecimiento o la salud del bosque (Helms 1998). La quema prescrita es la aplicación intencional del fuego para alcanzar objetivos de manejo, (Omi 2005), sujeta a condiciones ambientales y de ignición predeterminadas.

Aunque resultan útiles para considerar la eficiencia del tratamiento de combustibles en los bosques secos occidentales, que históricamente han estado sujetos a incendios superficiales de frecuente y baja intensidad, las extrapolaciones hay que hacerlas con precaución. De hecho, las inferencias que intentan hacerse para otros ecosistemas o regímenes de fuego (p. ej., el chaparral del sur de California, los abetales piceos de alta elevación, o los bosques boreales de latitud más alta) pueden contradecir las observaciones en los bosques secos occidentales. Por ende, existen vacíos importantes con respecto a una evaluación abarcadora de la eficiencia del tratamiento de combustible en todos los ecosistemas de interés.

Además, los análisis acerca de la eficiencia del manejo de combustible no han considerado los diversos objetivos y matices de las alternativas de tratamiento. La mayoría de los tratamientos estudiados arriba no necesariamente se condujeron con el fin de reducir el peligro. Asimismo, ahora reconocemos que la necesidad y la eficiencia de los tratamientos de combustibles pueden variar según el régimen histórico de incendios. Así, la eficiencia del tratamiento puede variar dependiendo de la frecuencia, la severidad, la estación del año, el tamaño del territorio y otros descriptores mediante los cuales se clasifican los regímenes de incendios. (Omi 2005). Más aún, la eficiencia puede depender de la clase de condición del régimen de

incendios, un indicador de la salud del ecosistema que depende, en parte, de en qué medida se a mantenido o restaurado la actividad histórica de fuego. En otras palabras, como cualquier manipulación que se le hace al bosque, los resultados varían según una variedad de circunstancias, incluidas las condiciones topográficas y climáticas, bajo las cuales podrían ocurrir incendios eventuales. Resultó ser cierto que esta eventualidad es importante porque los tratamientos de combustible podrían ser instalados y nunca “probados” en una ignición posterior.

Evaluación a escala de proyecto o de rodal

Incluso en los sistemas más ampliamente estudiados, debe tenerse en cuenta la variabilidad. Para ilustrar este punto, pondré ejemplos de un sistema que he estudiado durante los últimos quince años, esto es, la eficacia del tratamiento de combustible en los bosques secos del occidente de EE.UU. En partiular, resumiré los hallazgos de un estudio extendido desde 1994 acerca de los efectos de los incendios forestales en los bosques de pinos de aguja larga, primordialmente, el pino amarillo (*Pinus ponderosa*), que históricamente, ha estado sujeto a frecuentes incendios de baja severidad. (Martinson 2006). La tabla 1 resume este estudio extendido, que abarca tres proyectos de investigación independientes.

Tabla 1. Descripción resumida de los estudios acerca de la eficacia del tratamiento de combustibles 1994- 2006 (Pollet y Omi 2002; Omi y Martinson 2002; Omi y otros 2006).

Descriptor del estudio	Explicación
Número de incendios forestales estudiados	13
Espacio de tiempo	11 años
Localización geográfica	8 estados
Similitud de la vegetación y la topografía entre los tratamientos vs. los controles	Basado en capas de datos IGS obtenidas antes de las visitas de campo
Disposición de las parcelas	Las parcelas no tratadas ubican antes de las parcelas tratadas, basándose en geometría de repartición
Límites del tratamiento	Amortiguado para otorgar un margen de error e cartografiado
Parcela de radio variable: variables independientes	Diámetro del árbol (cm), altura del árbol (m), altura de la base de las copas (m), posición de la copa, densidad del árbol (número de árboles/ha)
Parcela de radio variable: variables de respuesta	Altura del fuste quemado (m), altura de las agujas de pino devastadas (m), volumen de las copas devastadas (%), volumen de consumo de las copas (%)
Área fija (trazado Whittaker modificado): variables independientes	% pendiente, aspecto, densidad de árboles pequeños
Área fija (trazado Whittaker modificado): variables de respuesta	Daño a rodales, alcance de quema

Ocho de los incendios forestales se estudiaron usando comparaciones de pares replicados de parcelas tratadas y no tratadas. Cinco de los primeros estudios previos al año 2000 usaron una metodología menos robusta.

Pudimos evaluar diferencias tratadas frente a las no tratadas en rodales quemados por incendios forestales, mediante los siguientes tratamientos: aclareo, quema prescrita, y aclareo más quema prescrita. Las diferencias se analizaron retrospectivamente, de manera que no todas las combinaciones estuvieran presentes y fueran analizadas en todos los incendios. Los resultados fueron mixtos. Por ejemplo, en dos de los cinco incendios, el chamuscado más el consumo de las copas fue menor en las áreas con aclareo (comparado con áreas en donde no se había hecho aclareo). En contraste, las diferencias debido a los tratamientos de quema prescrita fueron evidentes en cuatro de cinco incendios forestales. Se encontraron diferencias debido al aclareo más la

quema en cuatro de los cuatro incendios forestales donde se implementó esta combinación de tratamientos.

Las diferencias de severidad de incendios entre diversas combinaciones de tratamiento en contraposición a las parcelas no tratadas también se examinaron en términos de posibles variables explicativas. Las variables explicativas examinadas incluyeron la altura hasta el dosel, el grado de espesura, el diámetro residual de los árboles, las condiciones ambientales y la edad del tratamiento.

Nuestros análisis confirmaron tanto la sabiduría popular como la variabilidad de los efectos del tratamiento. También reconocimos el peligro de extrapolar a otros regímenes o ecosistemas. Además, aún quedan preguntas concernientes a la duración de la eficacia, el intervalo de mantenimiento y las definiciones de éxito. Otros vacíos en la información incluyen los efectos del cambio climático, el estado de sucesión de la planta y otras perturbaciones en la eficacia del tratamiento.

La evaluación a nivel paisajístico

Aunque la información fue útil para evaluar proyectos individuales, el estudio resumido anteriormente se llevó a cabo, primordialmente, para examinar los cambios en la severidad de incendios entre los rodales tratados y no tratados, y dejó sin respuesta varias interrogantes acerca de los tratamientos de combustible realizados a nivel paisajístico. Por ejemplo, a pesar de que los tratamientos de combustible pueden reducir la severidad de eventuales incendios forestales, los estudios a nivel de rodal ofrecen una mirada incompleta a la colocación óptima de los tratamientos en un paisaje.

Finney (2006) resume algunas de las consideraciones para evaluar la eficiencia de los tratamientos de combustible a nivel paisajístico. Mediante el uso de simulaciones por computadora, examinó las probabilidades de que un área arda, dado un perímetro o un punto dado, sujeto a distribuciones climáticas, topográficas, de combustible y del umbral histórico de las condiciones meteorológicas que influyen en el fuego. Su programa FSPRO calcula las probabilidades de la propagación del fuego mediante la simulación de miles de incendios con diferentes escenarios de clima, y usa un algoritmo de propagación con un tiempo mínimo de viaje. Él señala que la probabilidad de quema es más alta que la de la ignición, a menos que los combustibles se traten estratégicamente a lo largo y lo ancho del paisaje. Las reducciones significativas en el tamaño del incendio y de la severidad, se pueden tratar posiblemente en un 20% del paisaje, si los tratamientos se alinean

estratégicamente para retardar la severidad y la propagación del fuego. La localización estratégica toma ventaja sobre la reducción de la propagación y severidad en los rodales, colectivamente, a lo largo y lo ancho del paisaje, incluidos los efectos de sombra detrás de las áreas tratadas.

Aunque prometedor, necesitamos reconocer que las nuevas percepciones producto de la modelización dependen, generalmente, de presunciones de los algoritmos de la propagación del fuego, que fueron desarrollados para camas de combustible uniformemente contiguas, que luego se unieron a las ecuaciones de los incendios de copas desarrolladas a partir de un escaso conjunto de datos recogidos en otra parte. De hecho, el modelo de propagación ha estado sujeto a una evaluación limitada en un número pequeño de tipos de combustible, y nunca se ha validado cabalmente con incendios forestales reales. Además, aún existen preguntas concernientes a las consecuencias económicas de los tratamientos implementados en el paisaje.

Estado del conocimiento

Nuestro entendimiento básico sobre la eficacia del tratamiento de combustibles ha mejorado significativamente en los últimos años, debido a los cambios en las prioridades en la comunidad de investigación de incendios y a los incentivos provistos por programas como el Programa Conjunto de Ciencia del Fuego y el Plan Nacional de Incendios. A la vez, aún quedan vacíos en nuestra comprensión de las implicaciones biofísicas, socioeconómicas y políticas de los tratamientos de combustible. Así, nuestra ignorancia puede ser mayor que nuestro conocimiento acerca de la eficacia del tratamiento de combustibles, excepto en los ecosistemas bien estudiados -como el de pino amarillo- que arden con baja severidad y alta frecuencia.

La mejor prueba de la eficiencia del tratamiento de combustibles a nivel de rodal la proveen los incendios forestales que arden en áreas que no fueron tratadas y luego en áreas tratadas, en ese orden, especialmente cuando hay información disponible sobre las estructuras antes y después del tratamiento y de las condiciones de quema en el sitio específico; esto es, las condiciones meteorológicas que influyen en el fuego. Un incendio integra las influencias del combustible, el clima y la topografía mejor que cualquier otro modelo. Los fuegos que se suscitan en condiciones más severas proveen mejores pruebas de eficacia que los incendios relativamente benignos, ya que las diferencias no tratadas frente a las tratadas proveen un mayor entendimiento de la capacidad del rodal de resistir el impacto de los incendios. Aun así, un solo incendio provee una comprensión limitada de las condiciones ambientales en las que ocurre la quema. Se adquiere una mayor comprensión cuando hay información

disponible sobre el desempeño de los tratamientos de combustible durante múltiples incendios que abarcan una gama de gradientes ambientales.

A esto podría suceder un conjunto complejo de tratamientos (y efectos) en muchos ecosistemas que no han experimentado ciclos de incendios debido a prácticas de exclusión. Por ejemplo, es posible que sea necesario un aclareo sistemático, seguido del tratamiento mecánico de los combustibles de la superficie, para reducir la acumulación de combustible antes de que pueda reanudarse la quema como herramienta de manejo segura. El aclareo sistemático y el tratamiento mecánico incluyen numerosas opciones de costos, que dependen de la maquinaria y los patrones seleccionados. Peterson y otros (2005) describen seis diferentes métodos de aclareo, cada uno con diferentes efectos sobre la cubierta forestal, trastornos al suelo (dependiendo del tipo de maquinaria), los costos, y la eficacia, en términos generales, comparada con la condición no tratada.

El tratamiento mecánico o el astillado de los residuos de los árboles pueden tener ventajas en términos de retención de nutrientes que pueden reciclarse *in situ*, y reducen el potencial de incendios y los impactos en el suelo, a la vez que se eliminan materiales que hospedan plagas de insectos. (Fettig y otros 2007). La trituración o el tratamiento mecánico de la vegetación arbustiva puede preceder a la disecación y quema de matorrales. Por otro lado, los altos niveles de monoterpenos producidos durante el astillado pueden atraer a especies de escarabajos de corteza, y causar mortalidad no planificada de árboles en áreas boscosas.

Los costos del fuego prescrito variarán dependiendo de la técnica de ignición, el patrón del fuego, la temporada y el régimen de incendios, entre otros. Los riesgos de escapes o de características de fuego inintencionado pueden afectar la estructura del costo del tratamiento. Generalmente, los análisis de los programas de incendios tienen dificultades al analizar secuencias de tratamiento más detalladas o complicadas.

De hecho, el análisis de los programas de incendios puede estar bastante desconectado de la restauración de los ecosistemas (y de otras preocupaciones relacionadas con la interfaz urbano-forestal, los recursos no madereros y la seguridad de las personas que extinguen incendios) debido a la falta de atención a los detalles. Además, podríamos no saber cómo calcular las métricas importantes. Aunque se ha logrado mucho progreso a través de las simulaciones por computadora, aún no se ha resuelto el cálculo de las oportunidades perdidas como resultado del tratamiento de

combustibles en rodales o paisajes. Por ende, resulta difícil, si no imposible, realizar una evaluación abarcadora de las ventajas y desventajas importantes.

La evaluación de los pro y los contra de los tratamientos de combustible y la extinción de incendios es difícil debido a los problemas de especificación de la función de producción. La relación fundamental entre el tratamiento de combustible y la extinción de incendios se ha resistido a la especificación, ya que es difícil cuantificar las mejoras en la extinción de incendios (p. ej., las reducciones en el costo más las pérdidas), que fueron posibles mediante el tratamiento por adelantado de los combustibles. Davis (1965) fue de los primeros en señalar esta dificultad, pero todos los esfuerzos posteriores de planificación de tratamientos de combustible a los que se aludió antes han tenido que luchar con este problema.

Sin duda, la modelización por computadora continuará jugando un papel importante en los esfuerzos futuros para la planificación del manejo de incendios.

Desafortunadamente, todos los modelos están contruidos sobre presunciones que limitan sus capacidades analíticas o predictivas. La simulación mediante modelos puede ofrecer una alternativa económica a incendiar áreas tratadas y no tratadas. Sin embargo, las diferencias simuladas son meras hipótesis que pueden o no afirmarse mediante sucesos futuros.

La simulación y la modelación sintética pueden proveer hipótesis útiles que esperan una prueba, pero también pueden dejar sin respuesta las preguntas sobre la severidad y los impactos de los próximos incendios forestales, así como las relacionadas con la rentabilidad o el flujo de beneficios y costos de un programa de manejo de combustibles. Desde el punto de vista de la política pública, los analistas también se interesan por las relaciones que vinculan las inversiones en el tratamiento de combustibles con la reducción del costo más la pérdida (y cambio en el valor neto) del manejo de incendios.

Quedan por resolver otros asuntos importantes concernientes a la evaluación de la eficacia del tratamiento de combustibles, pero sólo añadiré unos pocos más. La primera área de preocupación es la necesidad de métricas en la evaluación de la teoría y la práctica del uso de los incendios forestales, no sólo en relación con la reducción del peligro de los combustibles, sino también con la restauración del ecosistema. La segunda área de preocupación tiene que ver con la cantidad de áreas que necesitan tratamiento. Ciertamente, hay otras áreas de interés, pero estas tres vienen a la mente como áreas que requieren solución si es que hemos de estimar los

pro y los contra del tratamiento de combustibles peligrosos, el uso de los incendios forestales y las actividades de extinción de incendios, el tema de esta sesión.

El uso de los incendios forestales

Los organismos federales están adoptando una respuesta de manejo apropiada (AMR, por sus siglas en inglés) para enfrentarse al gasto de incendios cada vez más grandes y temporadas cada vez más largas. En el AMR, el uso de los incendios forestales se está considerando más en el manejo de incidentes, especialmente cuando es posible asociar beneficios a los recursos con las estrategias de pastoreo para algunos incendios causados por rayos que cumplen con recomendaciones predeterminadas. Desde 1998 hasta 2006, se han manejado un promedio anual de 321 incendios siguiendo las recomendaciones del WFU, y se han cubierto 160 mil ac (65.000 ha) (NIFC 2007). A largo plazo, podría tenerse más en cuenta las guías del WFU para cumplir con los objetivos del tratamiento de combustibles.

Recientemente, se han ventilado preocupaciones de que dejar que ardan fuegos de baja intensidad podría producir comportamientos de fuego (y efectos de fuego subsiguientes) que son incompatibles con la actividad histórica de los incendios. En este contexto, se han suscitado preguntas acerca de las consecuencias potencialmente negativas sobre la estructura y la función de los ecosistemas afectados, incluidas las plantas invasivas que reducirán la biodiversidad de la flora y la fauna nativas. Se esperaría que los fuegos prescritos actuales difieran de los incendios históricos con respecto a la intensidad y la severidad, y también se espera que difieran en el tamaño y en la forma, debido a las líneas de defensa y a las estrategias de provocar incendios.

En la medida en que el uso de los incendios forestales se expanda fuera de tierras silvestres remotas, se suscitarán preocupaciones similares concernientes a las discrepancias con las normas históricas de los efectos y el comportamiento del fuego. Los fuegos manejados siguiendo las pautas del WFU tienden a aplicarse en la misma época del año y, a menudo, solo tienen el objetivo de reducir las cargas de combustible (Cohen 2006). No debe haber conflictos para crear un espacio defendible alrededor o en áreas adyacentes a las áreas de interfaz urbana. Sin embargo, se suscitarán conflictos cuando la meta sea la restauración de los procesos naturales y la salud de los ecosistemas, especialmente cuando los fuegos prescritos no repliquen a los incendios naturales históricos. Algunos ejemplos de casos en los que pueden surgir disparidades pueden incluir los chaparrales y los bosques coníferos de alta elevación. Al igual que al sur de California, las especies de matorrales de chaparral están adaptadas, de manera única, para sobrevivir y prosperar en la presencia de incendios de alta severidad que recurren después de varias décadas. Los

mecanismos regenerativos, como el brote desde el cuello de la raíz y los bancos de semillas del suelo, estimulados por temperaturas altas pero aisladas de ellas, tienden a favorecer estas especies nativas dependientes del fuego sobre los competidores menos exitosos, como las plantas exóticas anuales. Por el contrario, el intervalo de recurrencia en los bosques coníferos de alta elevación puede extenderse por cientos de años entre incendios de alta severidad, aunque no toda ignición termine en un gran incendio, y el fuego latente termine en incendios esporádicos o que el frente de fuego se extienda por miles de hectáreas. En cualquiera de los casos (bosques de alta elevación o chaparral), es posible que los fuegos prescritos de baja intensidad no cumplan con los objetivos de restauración.

Atraso en el tratamiento de combustible

A lo largo y lo ancho de la nación, una enorme cantidad de áreas que necesitan tratamiento de combustible permanece como legado parcial de las prácticas de exclusión de fuego del siglo XX. Bosworth (2003) vislumbró una acumulación de 30 millones de ha de tierra de bosques nacionales amenazados por incendios forestales. Para todo el territorio de EE.UU. continental, se calcula que un área 2 ó 3 veces mayor que la anterior pueda necesitar tratamiento para restaurar la sostenibilidad (p. ej., según Schmidt y otros 2002).

Otras razones que contribuyen al atraso incluyen los altos costos de manejo y los bajos incentivos para el uso, la eliminación y el desecho y procesamiento de árboles de diámetro pequeño (Abt y otros 2006). El temor a los escapes de quema prescrita y la aversión al humo también figuran prominentemente entre las razones que explican el lento progreso en la reducción de la acumulación. Mientras, arden los incendios en las zonas que necesitan tratamiento, como se evidenció con los recientes incendios gigantes y los fuegos sitiados. Y aunque ardan incendios forestales en grandes áreas anualmente, los perfiles de combustible que quedan pueden sostener fuegos recurrentes de severidad aún mayor en el futuro, añadiendo así a la acumulación.

Conclusiones

Cuando la producción de madera dominaba las actividades de manejo del Servicio Forestal de los Estados Unidos, los analistas hablaban acerca de la necesidad de considerar la transición de la situación actual del bosque (que en ese tiempo incluía rodales sustanciales de árboles viejos) al bosque totalmente regulado. En la actualidad, nos encontramos en una situación similar, ya que los tratamientos de combustible han remplazado la explotación maderera como foco de la agencia, puesto que los gastos de incendios pueden comprometer cerca del 50% del

presupuesto anual. En vez de rodales viejos y de molinos apropiados al procesamiento de árboles de gran diámetro, nos enfrentamos con una enorme acumulación de áreas que necesitan tratamiento, donde crece mayormente material vegetal de diámetro pequeño. Las áreas silvestres que necesitan tratamiento, ya sea para la reducción del peligro, la restauración ecológica o ambas, tienen pocas probabilidades de soportar un incendio forestal que ocurra durante el período crítico de las condiciones de quema. Con el tiempo, se espera eliminar los atrasos en el tratamiento de los combustibles y regular los rodales y los paisajes periódicamente, dependiendo del régimen de incendios, los valores amenazados y las condiciones de seguridad, entre otras. Se necesitan herramientas analíticas para tomar decisiones económicas sabias durante la reducción de la acumulación, así como para los períodos de tiempo futuro cuando el bosque esté completamente regulado.

Hasta el momento, los análisis presupuestarios basados en los análisis financieros de las alternativas de manejo de incendios no han producido resultados satisfactorios en términos de la planificación del manejo de dichos incendios. Se necesita, no solamente expandir la gama actual de herramientas usadas en la planificación de tratamientos de combustible, sino, también, nuevas aproximaciones. En vez de intentar optimizar los gastos del manejo de combustible, las instituciones deberían considerar admitir las dificultades y adoptar diferentes acercamientos, como por ejemplo, el manejo adaptativo.

El tema de esta sesión evade el asunto de si los tratamientos de combustibles peligrosos y el uso de los incendios forestales reducen o no los costos de extinción. Aunque la información disponible ha aumentado, las herramientas analíticas existentes no proveen una respuesta definitiva. Es probable que esta situación continúe por algún tiempo más, especialmente hasta que la función de producción del tratamiento de combustibles quede sin especificar. En última instancia, comprender las dimensiones humanas de los tratamientos de combustible, podría resultar más importantes que resolver el asunto de las ventajas y las desventajas.

Reconocimientos

Quisiera agradecer al Programa Conjunto de Ciencia del Fuego su apoyo a los proyectos de investigación aquí resumidos. Del mismo modo, agradezco a Erik Martinson su ayuda inapreciable.

Referencias

- Abt, K.L., J. P. Prestemon, K. Ince., J. Barbour, R. Fight, and R. Rummer. 2003. The market economics of mechanical fuel treatments. Pre-prints for the 5th Symp. On Fire and Forest Meteorology and 2nd International Wildland Fire Ecology and Fire Mangement Congress, Orlando FL, 16-20 Nov. 2003. American Meteorology Society
- Agee, J.K. and Skinner, N.C. 2005. Basic principles of forest fuel reduction treatment. *Forest Ecology and Management* 211: 83-96.
- Bosworth, D. 2003. Fires and forest health: our future is at stake. *Fire Management Today* 63(2): 4-11.
- Cohen, D. 2006. Wildland fire use as a prescribed fire primer. *Fire Management Today* 66(4): 47-49.
- Davis, L.S. 1965. The economics of wildfire protection with emphasis on fuel break systems. Sacramento, CA: State of California, Dept. of Cons., Div. of For. 166 p.
- Finney, M.A. 2006. Spatial strategies for landscape fuel treatments. Presentation to Fuels and Fuel Management module, Technical Fire Management, March 14, 2006, Bothell, WA. Washington Institute.
- Fire Program Analysis website. 2005. Fire Program Analysis-Planning for the Future. History of the Legacy Systems: approx. 4:39 minutes. Pdf text of a video presentation available at <http://www.fpa.nifc.gov/Information/Presentations/index.html> (accessed September 28, 2007).
- Graham, R.T., McCaffrey, S., Jain, T.B. (tech. eds.). 2004. Science basis for changing forest structure to modify wildfire behavior and severity. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-120. Ft. Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 43 p.
- Helms, J.A. 1998. The dictionary of forestry. Bethesda, MD: Society of American Foresters, 210 p.
- Hirsch, S.N., Radloff, D.L., Schopfer, W.C., Wolfe, M.L., Yancik, R.F. 1981. The activity fuel appraisal process: instructions and examples. Gen. Tech. Rep. RM-83. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station. 46 p.
- Kilgore, B.M. 1975. Restoring fire to national park wilderness. *American Forests* 81(3): 16-19, 57-59.
- Martinson, E.J. 2006. Assessing mitigation of wildfire severity by fuel treatments. Lesson plan. Forestry 423, Fuels Management, Humboldt State University.

- NIFC, 2007. Wildland Fire Use Fires (1998-2006). National Interagency Fire Center website, Wildland Fire Statistics. http://www.nifc.gov/fire_info/wfu_fires.htm. (Accessed Oct. 2, 2007).
- Omi, P. N. 1977. Long-term planning for wildland fuel management programs. Ph.D. Diss., Univ. of California, Berkeley. 133 p. Univ. Micro. No. 78-12720.
- Omi, P.N. 2005. Forest fires: a reference handbook. Santa Barbara: ABC-CLIO Publishing Co. 347 p.
- Omi, P.N., Martinson, E.J. 2002. Effect of fuels treatment on wildfire severity. Final report to the Joint Fire Science Governing Board. Colorado State University, Fort Collins.
- Omi, P.N., Martinson, E.J., and Chong, G.W. 2006. Effectiveness of pre-fire fuel treatments. Final report: Joint Fire Science Program project 03-2-1-07.
- Omi, P.N., Teeter, L.A., Dyer, A.A. 1986. The national fire management analysis system and fire economics evaluation system: a comparative analysis. *In*: Proc. of the Symp. "Fire Management: the challenge of protection and use." (J.N. Long, ed.), Logan, UT (April 17-19, 1985). Cosponsored by Dept. of For. Res., Utah State University, Intermtn. Soc. of Amer. For., USDA For. Serv., and Nat. Wildlife Coordinating Group.
- Peterson, D.L.; Johnson, M.C.; Agee, J.K.; Jain, T.B.; McKenzie, D., Reinhardt, E.D. 2005. Forest structure and fire hazard in dry forest of Western United States. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-628. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 30 p.
- Pollet, J. and Omi, P.N. 2002. Effect of thinning on wildfire severity. *Int. J. Wildland Fire* 11:1-10.
- Schmidt, K.M., Menakis, J.P., Hardy, C.C., Hann, W.J., and Bunnell, D.L. 2002. Development of coarse-scale data for wildland fire and fuel treatment. Gen. Tech. Rep. RMRS-87. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 41 p.

El Uso del Fuego Prescrito en España para un Manejo Rentable del Combustible¹

D.M. Molina², M. Galán³, D.D. Fababú¹, D. García⁴ y J.B. Mora⁵

Resumen

El uso del fuego prescrito para un manejo rentable del combustible (y también para otros objetivos) está aumentando en algunas regiones de España. En menor escala, los incendios forestales se usan para los mismos propósitos. Este estudio detalla el uso de los incendios tanto en Cataluña como en las Islas Canarias. Los regímenes de incendios forestales están cambiando en Cataluña (nordeste de España) y en las Islas Canarias (suroeste de España), y hay mayor probabilidad de que los grandes incendios forestales (LWFs, por sus siglas en inglés) ocurran cuando la mayoría de los incendios se extinguen con prontitud. Este es un cambio fundamental en el régimen de alteraciones en los bosques y representa una amenaza real para la biodiversidad y para el costo total del manejo de incendios (las pérdidas debido a los incendios, la restauración pos-incendio, la extinción de incendios y los gastos de prevención de los mismos). Esta ponencia estudia la eficacia en función del costo de la quema prescrita como medio para crear macizos forestales de resistencia que permitan el control de incendios forestales. Se basa en el programa en curso (2000-2008) de quema prescrita en ambas regiones. Tenemos en mente, explícitamente, los beneficios que la quema prescrita provee en la instrucción de quienes extinguen los incendios forestales, y cómo ayuda a estas personas proporcionándoles las destrezas necesarias para que, más tarde, puedan usar los incendios como herramientas de extinción de incendios forestales. Los fuegos prescritos parecen ser muy eficaces para mantener los cortafuegos creados con extracción mecánica (*mastication*) y con los fuegos prescritos mismos. Estamos comprometidos, no solo con el establecimiento de cortafuegos, sino, también, en la determinación de su ubicación estratégica (después de simulaciones Farsite y FlamMap). También mostraremos varios estudios de casos.

Palabras claves: Farsite, FlamMap, fuego prescrito, simulación de rentabilidad (eficacia en función del costo), uso de incendios forestales.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación, y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril – 2 de mayo, 2008; Carolina, Puerto Rico

² Universidad de Lleida – Unidad de Fuegos Forestales, Av. Rovira Roure 191, Lleida 25198. 973 702 847, dmolina@pvcf.udl.es.

³ Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil – GRAF. Crtra Universitat Autònoma s/n. Cerdanyola del Vallès. 08290, España. +34 935820424; email: utgraf@gencat.net.

⁴ Cabildo de Gran Canaria. C/ Profesor Agustín Millares Carlo, s/n. Edificio Insular 1, Primera Planta. E-35003 Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. dgarciam@grancanaria.com

⁵ Área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro. C / Trinista 1, 38900 Valverde (EL HIERRO) +34 922 550078, Islas Canarias, España.

Evaluación del uso del fuego prescrito en dos regiones de España

En muchos países, el fuego prescrito es una herramienta ampliamente usada en la silvicultura y en la protección contra incendios (Molina 2000a b) y su uso está aumentando. Nuestro primer estudio de caso es en Cataluña, en el nordeste de España. Desde 1999, las personas encargadas de extinguir los incendios de la “Generalitat de Catalunya” usan la quema prescrita en diferentes tipos de estructuras forestales, siguiendo diferentes metas de manejo que están dentro del ámbito de la planificación de la preextinción y del manejo de incendios. (Castellnou et al. 2002, Larrañaga et alii., 2006). Desde ese mismo año, quienes extinguen los incendios han tratado 490 ha (tabla 1) con el uso de fuego prescrito como herramienta de manejo. Además, suponemos que esta técnica continuará usándose en el futuro.

La preextinción agrupa todos los tratamientos que tienen como objetivo transformar o mantener una estructura forestal, que pueden ser usados eficientemente y con seguridad para sostener acciones de extinción de incendios.

El manejo de los bosques incluye diferentes objetivos: aclareo, mejoramiento de las praderas, la restauración del hábitat para la fauna y flora silvestres, y el manejo del combustible (cortafuegos) para proteger la interfaz urbano-forestal.

Como herramienta de silvicultura, la quema prescrita ha requerido mucho esfuerzo de comunicación y adiestramiento para superar la extrañeza y desconfianza que suscitaba en un principio. Para que se acepte el fuego prescrito, debe llevarse a cabo una evaluación detallada de los costos y de la eficiencia de las herramientas tradicionales y del fuego. El estudio analiza los costos y la productividad de los diferentes objetivos y estructuras tratadas. La evaluación final se definirá por las restricciones establecidas (ya sea por el dueño o por el servicio forestal) que, a su vez, dependen del objetivo de manejo. Esto nos permite empezar una discusión técnica acerca de la productividad y la rentabilidad de la quema prescrita comparada con otros tratamientos.

Tabla 1—cantidad y área de quemas prescritas en Cataluña (nordeste de España), de 1999 a 2006, por tipo de quema que supuso la intervención de bomberos

<i>Tipo de quema prescrita</i>	<i>cantidad</i>	<i>(%) Área (ha)</i>	<i>Área (%)</i>
Terrenos estratégicos para la supresión	32	43	66
Corta combustibles	13	18	76
Lotes industriales baldíos / Interfaz urbana	5	7	6
Interfaz urbano-forestal	4	5	16
Terrenos de investigación	2	3	2
Potenciación de praderas	16	22	324
Total	74		490

El tamaño promedio de una es de 6,6 ha, y varía desde los sitios de investigación (< 1 ha) hasta los sitios de potenciación de praderas, donde el tamaño promedio es de 20 ha.

Es necesario clasificar cuán difícil es una quema prescrita dada para poder evaluar tanto los recursos como las necesidades de seguridad. Consideramos que existen dos factores principales para esto: a) la continuidad del combustible (ya sea vertical u horizontal, o combustible de enlace) y b) el objetivo de la quema.

En Cataluña, el costo promedio de una quema prescrita es de 1200 €/ha para los tipos principales (sitios estratégicos para la extinción de incendios, cortacombustibles y la potenciación de praderas, que alcanzan el 70% de toda la superficie tratada). Los costos individuales y la cantidad de personas y de hectáreas por día se muestran en la tabla 2. Podemos observar que el objetivo de potenciación de praderas refleja el mejor desempeño.

Tabla 2—costos y cantidad de personas que participaron en cada tipo de quema prescrita con intervención de bomberos en Cataluña (nordeste de España) de 1999 a 2006

<i>Tipo de quema prescrita</i>	<i>Costo (€/ha)</i>	<i>Persona-día/ha</i>
Terrenos estratégicos para la supresión de incendios	1247	8
Corta combustibles	1379	10
Lotes industriales baldíos / Interfaz urbana	1148	9
Interfaz urbano-forestal	566	3
Terrenos de investigación	2727	19
Potenciación de praderas	242	2

Desde el año 2002, el Servicio Forestal de Gran Canaria está implementando un programa de manejo de combustible que incluye operaciones de quema prescrita, tanto aislada, como en combinación con otros tratamientos mecánicos (por ejemplo, la extracción mecánica, conocida en inglés como *mastication*). Otros detalles se pueden leer en Molina, et al (2006). En Gran Canaria, la quema prescrita tiene como objetivo no solo mitigar la peligrosidad del combustible en las tierras silvestres, sino potenciar los pastizales y favorecer los programas de restauración forestal. Hasta ahora, es un total de 103 unidades de quema, que representan 166,5 ha de tierras silvestres (tabla 3) desde el 2002 hasta el 2006. Esto equivale al 0,27% del total de área de tierras silvestres en la isla. Es importante mencionar que se investigaron otros objetivos de estas quemas prescritas, así como la protección de las infraestructuras especiales (torres de telecomunicación).

Tabla 3-- cantidad y área de quemas prescritas, según el tipo, en las que participaron bomberos en Gran Canaria (suroeste insular de España), de 2002 a 2006.

<i>Tipo de quema prescrita</i>	<i>cantidad</i>	<i>(%)</i>	<i>Área (ha)</i>	<i>Área (%)</i>
Preparación del terreno antes de la reforestación	7	6,8	24	14,4
Formación forestal joven	9	8,8	13,5	8,1
Potenciación de praderas	3	2,9	20,8	12,5
Sabanas	6	5,8	32,7	19,6
Corta combustibles	34	33	30,5	18,3
Protección de la infraestructura	38	36,9	39,4	23,7
Investigación de incendios forestales	6	5,8	5,6	3,4
Total	103		166,5	

Algunos de los costos, y la cantidad de personas y de hectáreas por día se muestran en la tabla 4. Estos cálculos no son tan precisos como los que se mostraron para Cataluña en la tabla 2. Podemos observar que el objetivo del manejo de praderas refleja el mejor desempeño.

Tabla 4—los costos y la cantidad de personas que participó en cada tipo de quema prescrita en la que intervino personal del Servicio forestal en Gran Canaria (suroeste insular de España), de 2002 a 2006.

<i>Tipo de quema prescrita</i>	<i>promedio ha/día</i>	<i>Costo(€/día)</i>	<i>Costo(€/ha)</i>
Preparación del terreno antes de la reforestación	3,4	1500	441
Formación forestal joven	1,5	1500	1000
Potenciación de praderas	6,9	1500	218
Sabanas	5,5	1500	273
Corta combustibles	0,9	2800	3111
Protección de la infraestructura	1,0	2800	2800
Investigación de incendios forestales	0,9	2800	3111

Si comparamos los dos territorios, hay un promedio anual de 36,3 ha. quemadas (0,27%) por el Servicio Forestal de Gran Canaria, mientras que en Cataluña, hay un promedio anual de 81,6 ha. quemadas (0,025%) por el Departamento de Extinción de Incendios de Cataluña. En términos relativos, esto es más de diez veces mayor en Gran Canaria, aunque, en términos absolutos, es mayor en Cataluña. En la isla El Hierro (y también en las Islas Canarias), el Servicio Forestal de la región está dispuesto a comenzar un programa de quema prescrita regional. Hay tres razones principales por las que se lleva a cabo esta acción:

- a. Ciertas visitas técnicas rentables a las experiencias de quema prescrita de Gran Canaria.

- b. Los tratamientos mecánicos de combustible (*mastication*) son más costosos en El Hierro, donde varían desde 2000 a 4000€/ha.
- c. Las operaciones de quema prescrita son una oportunidad de adiestramiento excelente para el personal que participará más tarde en las operaciones de control de incendios.

Observaciones finales

La última razón será el tema de nuestra observación final. Creemos firmemente que la quema prescrita ocupa el segundo lugar de importancia (luego de los incendios forestales reales) en la provisión de un mejor adiestramiento para los trabajadores que extinguen incendios. Es posible que algunos de los trabajadores que están listos para ser enviados a los incendios forestales solo hayan presenciado un incendio semanas o meses antes. Esto significa que no tienen mucha experiencia en incendios. Y lo más probable es que no tengan la capacidad necesaria para establecer un control seguro y eficaz del perímetro de incendio. Con las operaciones de quema prescrita podemos ofrecer las horas adicionales a aquellos empleados que necesitan entender mejor los cambios del comportamiento de los incendios (debido a cambios sutiles en el modelo de combustible, en el contenido de humedad del mismo, en la exposición al sol, etc); podemos adiestrarlos activamente en las acciones de extinción de incendios, en los asuntos de seguridad de extinción de incendios (Beaver 2001, Pous & Molina 2005, Pous & Molina 2006), en la eficiencia de la comunicación y, también, en los efectos que tienen los incendios en la vegetación. Por lo tanto, en la medida en que obtenemos ganancias por las opciones de adiestramiento, el precio neto por hectárea de la quema prescrita se puede calcular más bajo de lo que se informó anteriormente. Esto es particularmente cierto en las Islas Canarias, donde ocurren muy pocos incendios forestales, y se hace difícil un buen adiestramiento que permita que las personas que extinguen incendios tengan un buen desempeño cuando se enfrentan a situaciones reales de extinción.

Referencias

- Beaver A.K. 2001. Evaluating risk and reward relationships in wildland firefighter safety. Proceedings of the 5th International Fire Safety Summit. International Association of Wildland Fire. Missoula, MT.
- Castellnou, C, Molina, D., Messagué, S., Dalmau, E. & Galán, M. 2002. Fuel Management Philosophy and programme in Catalonia In *Stratégies de prévention des incendies dans les forêts d'Europe du Sud*. Bordeaux France 31-01-2002: 02-02 2002; Collection Actes, Editions Préventique, pp. 95-102.
- Larrañaga A., Galán M., & Pellisa O. 2006. Discussion about the analysis of costs of the prescribed burns in the fields of pre-extinction and forest management. Evaluation of 6 years of experience in Catalonia.. V International Conference on Forest Fire Research, Figueira da Foz, Portugal.
- Molina, DM; Grillo, F; Garcia, D, 2006. Uso del fuego prescrito para la creación de rodales cortafuegos: estudio del caso “Las Mesas de Ana López”, Vega de San Mateo, Gran Canaria, España. *Invest Agrar: Sist Recur For* (2006) 15(3), 271-276, Madrid [http://www.inia.es/gcontrec/pub/271-276-\(15\)-Uso_del_fuego_1166008640062.pdf](http://www.inia.es/gcontrec/pub/271-276-(15)-Uso_del_fuego_1166008640062.pdf)
- Molina, DM. 2000a. El fuego prescrito. En Vélez, R. (Ed): *La Defensa Contra Incendios Forestales Fundamentos y experiencias*; McGraw-Hill, pp. 14.36-14.41.
- Molina, DM. 2000b. Planes de quemas. Prescripciones. En Vélez, R. (Ed): *La Defensa Contra Incendios Forestales Fundamentos y experiencias*; McGraw-Hill, p. 14.42-14.61.
- Pous, E. & Molina, DM. 2005. Methodological proposal hazard abatement actions in prescribed forest fires operations. In: “II International conference on prevention strategies of fires in Southern Europe” Barcelona (Spain) 9-11 Mayo 2005.
- Pous, E. & Molina, DM. 2006. Job Hazard Abatement Actions In Both Prescribed Fire And Backfire Operations In Gran Canaria (Insular SW Spain), 15p. V International Conference on Forest Fire Research, D. X. Viegas (Ed.), 2006.

Cartografiado del Balance Entre los Valores Amenazados en la Interfaz de las Zonas Naturales con las No Naturales¹

Alan Watson², Roian Matt³, Tim Waters⁴, Kari Gunderson⁵, Steve Carver³, y Brett Davis¹

Resumen

En la reserva indígena Flathead en Montana, EE.UU., la zona tribal silvestre Mission Mountains está rodeada por una zona de amortiguación. Para lograr mejorar la salud del bosque dentro de esta zona de amortiguación y restaurar el fuego en las áreas silvestres, las agencias de manejo deben trabajar junto con la comunidad para encontrar soluciones a la creciente amenaza por la acumulación de combustible. Se ha combinado una investigación cualitativa y sensible a la cultura junto con un ejercicio de cartografía en línea para lograr comprender las ventajas y desventajas descritas por los residentes de la reserva indígena en cuanto a las posibles acciones en la zona de amortiguación. Los principales significados que los miembros de la tribu asocian con la zona de amortiguación son: la protección del bosque, la calidad del agua y de la vida silvestre, el acceso y los accesorios funcionales, el recreo y los valores del panorama y los significados personales y culturales. Para ganarse la confianza tanto de los residentes tribales como de los no tribales, los planificadores de los incendios tienen que entender cómo las acciones propuestas interactúan con los valores en riesgo asignados por la comunidad local y describir prioridades que tomen en consideración las amenazas percibidas por el público.

Palabras clave: Paisaje cultura, sistemas de información geográfica, tratamiento de combustible, zona de amortiguación.

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes; del 29 de abril al 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Científico investigador y especialista en SIG, Instituto de Investigación Silvícola Aldo Leopold, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU., Rocky Mountain Research Station (e-mail: awatson@fs.fed.us, bhdavis@fs.fed.us)

³ Coordinador de alcance comunitario, Departamento Forestal, Tribus Confederadas Salish y Kootenai (greeneyednativewoman@yahoo.com)

⁴ Asesor y miembro de la Facultad, University of Leeds (waters_tim@hotmail.com, S.J.Carver@leeds.ac.uk)

⁵ Catedrático Auxiliar, University of Montana (cnd2543@blackfoot.net)

Introducción

La urgencia de restablecer los fuegos por todo el paisaje crece año tras año, debido al cambio climático y la invasión de asentamientos humanos en ecosistemas basados en el fuego; también debido a que los incendios forestales incontrolables se vuelven cada vez más comunes en el oeste de los EE.UU. (Miller 2006). Años de supresión de incendios han llevado a la acumulación de peligrosas cargas de combustible que crean las condiciones idóneas para que se susciten incendios forestales destructivos (Johnson et al. 2001). En la actualidad, el manejo de incendios está muy enfocado en reinstalar los regímenes de incendios naturales mediante un tratamiento progresivo del combustible y permitir, en lo posible, que el fuego vuelva a funcionar en su rol ecológico natural (Miller 2006). El raleo y la quema se están usando para reducir la acumulación de combustible a una condición cercana a las condiciones naturales, luego de lo cual se puede permitir que operen regímenes de incendios naturales. Para inculcar confianza y cumplir con los objetivos de manejo de recursos, se necesita un alto nivel de colaboración y participación del público (Liljeblad y Borrie 2006). Entre los puntos clave de la confianza en las decisiones del manejo de incendios y de combustible se encuentra la justicia procedimental (Liljeblad y Borrie 2006), o la percepción de justicia, igualdad y legitimidad de las decisiones tomadas por los manejadores. La gente quiere estar segura de que los manejadores entienden los valores que el bosque tiene para ellos y que estos valores, por lo menos, se toman con consideración en el proceso de toma de decisiones.

A través del oeste de los EE.UU., las comunidades rurales y las organizaciones federales, estatales y locales están trabajando en colaboración para iniciar planes de reducción de riesgos asociados con la acumulación de combustibles peligrosos en zonas forestales y praderas. La interfaz entre los terrenos silvestres y no silvestres es sumamente importante en el cumplimiento de los objetivos del manejo de incendios y de combustibles (Gunderson 2006). En zonas silvestres designadas, el uso de incendios forestales, incluso la quema prescrita, puede ayudar a restablecer el rol natural del fuego y ayudar a crear un amortiguador a lo largo de la frontera forestal para proteger los valores no silvestres asociados con las tierras colindantes. Esta ponencia describe el proceso de participación y la metodología que se ha desarrollado para ayudar a captar los significados personales y comunitarios (o los valores en riesgo) asociados con el paisaje para la planificación y la posible aplicación del tratamiento de combustible y el manejo de incendios. Los objetivos del proyecto son:

- Describir los significados que los residentes le dan al paisaje dentro de la zona de amortiguación tribal de la reserva indígena Flathead con el fin principal de usar este conocimiento local para el mejor entendimiento de las ventajas y desventajas de los valores en riesgo en las estrategias de reducción

de combustible forestal implementado por el Tribal Forestry Department [Departamento Forestal Tribal]; y

- Cartografiar estos valores en la Zona de Amortiguación Tribal para entender la intensidad y la distribución de los significados individuales y comunitarios asociados con este panorama de significados encontrados.

Trasfondo

En la Reserva Indígena Flathead, en Montana, existe un área de interfaz entre la Zona Silvestre Tribal de las Mission Mountains y la zona no silvestre del valle. El área, formalmente protegida como la Franja de Protección Tribal de las Mission Mountains, se estableció en 1987 en las faldas de estas montañas con la intención de proteger las zonas silvestres de las influencias externas, principalmente de la civilización humana y del desarrollo en el valle (Figura 1). Esta área de interfaz provee oportunidades de usos múltiples que incluyen usos culturales, algunos terrenos para viviendas, recreo y otros usos, tanto destructivos como no destructivos, de los recursos.

Figura 1 – El área silvestre tribal de las Mission Mountains y la Franja de Protección Tribal se extiende de norte a sur a lo largo de la frontera oriental de la Reserva Indígena Flathead.

Una de las preocupaciones principales en esta área de estudio es el efecto que la supresión del fuego ha tenido sobre la estructura y la salud general del bosque dentro de áreas importantes de la zona de amortiguación. Los grandes incendios de 1910 contribuyeron a la

intolerancia y la supresión inmediata de la mayoría Área Silvestre Tribal como la Franja de Protección presentan acumulaciones pesadas y peligrosas de maderos muertos y troncos caídos en el suelo del bosque, un sotobosque denso de maleza y árboles jóvenes, así como árboles muy pegados unos de los otros y una cubierta de copas densa (CSKT 2005c). Este tipo de bosque cada vez más es considerado como “no saludable” y altamente susceptible a incendios forestales destructivos, así como a insectos. En contraste, la cultura tradicional de las tribus locales incluye el uso del fuego como herramienta para nutrir y sustentar los recursos naturales de la tierra. Los miembros de las tribus usaban el fuego en gran escala aplicándolo a la tierra en diferentes períodos del año por varias razones. Esto incluía el raleo de la maleza densa en las zonas boscosas para así mantenerlas “limpias” para la vida silvestre y la cacería, despejar los caminos para poder transitar y nutrirse de alimentos y plantas medicinales para la subsistencia. En el siglo XIX, el uso que le daban los indígenas al fuego comenzó a ser alterado mientras las poblaciones europeas se expandían hacia el Oeste, y para los comienzos del siglo XX, luego de los devastadores incendios de 1910, el uso tradicional que los miembros de las tribus le daban al fuego quedó prácticamente eliminado. Los administradores de los recursos tribales ahora emplean técnicas modernas de manejo de incendios, pero tomando en consideración los valores culturales que se le atribuyen a la tierra (CSKT 2005a).

El enfoque actual de las personas que manejan los recursos es cómo reducir las acumulaciones potencialmente peligrosas de combustible en la Franja de Protección para poder lidiar con “los asuntos emergentes relacionados con la seguridad pública y de los bomberos, reducir el riesgo de grandes incendios de alta intensidad y devolver a los bosques una condición de mayor balance biológico” (CSKT 2005b, p.1). Sin embargo, las propuestas anteriores para cambiar la clasificación de la Franja de Protección de no disponible a disponible para la tala de madera han sido infructuosas debido a la falta de apoyo por parte de los miembros de las tribus. Por lo tanto, el proceso actual utiliza métodos de participación adaptados de proyectos anteriores en el colindante Bosque Nacional Bitterroot (Gunderson y Watson 2007) y se ha expandido para usar métodos de cartografía en línea desarrollados en el Reino Unido (Carver et al. 2001; Evans y Waters 2007) para captar mejor cómo los residentes tribales y no tribales de la Reserva se relacionan con la Franja de Protección y las amenazas que perciben a raíz de esta relación.

El enfoque participatorio a la comprensión de los valores en riesgo

Uno de los problemas clave en el desarrollo de un mejor entendimiento de las diferentes respuestas a las acciones de manejo a nivel de paisaje, tales como los tratamientos de combustible, es la capacidad de documentar confidencialmente y delinear de manera espacialmente acertada los significados que las partes interesadas le dan al paisaje. El trabajo

de desarrollo de metodología realizado anteriormente acerca de la comprensión de los valores de los individuos y la comunidad que se ponen en riesgo, y de cartografiarlos como insumo para el tratamiento de combustible a nivel paisajístico (Gunderson 2006, Gunderson y Watson 2007) utilizó entrevistas semiestructuradas, entrevistas a informantes clave y grupos focales para motivar a las personas a hablar sobre su paisaje local, diferenciar entre los significados asociados con los lugares que comúnmente frecuentan y aquellos que rara vez visitan o nunca han visitado, explorar la escala de estos significados mediante ejercicios de cartografía y discutir cómo estos significados interactúan con los tratamientos de combustible intencionales. Luego, los mapas fueron digitalizados e importados a Sistemas de Información Geográfica, SIG, para exposición durante la toma de decisiones en el lugar y momento en que se empleaban las técnicas y actividades de tratamiento de combustible.

La capacidad de cartografiar y discutir de esta manera los diferentes significados que las personas les dan al paisaje tiene diferentes ventajas en comparación con las técnicas que se basan menos en la ubicación. Estas incluyen la capacidad de vincular los significados a lugares específicos o unidades del paisaje y llevar a cabo análisis avanzados sobre las respuestas mirando las relaciones espaciales basadas en la proximidad, la colindancia, la contención, la conectividad y la visibilidad. Los “lugares críticos” pueden ser delineados a través de la categorización y demostración de información tal como la cantidad de personas que indica un lugar en particular, la importancia que las personas dan a ese lugar y la especificidad del área indicada.

A pesar del éxito de las pruebas de metodología previas, se identificaron varios defectos en los aspectos basados en mapas de la metodología desarrollada. Era especialmente necesario aumentar el número de participantes en esta actividad de cartografía. La pesada tarea para un investigador de reunirse con cada persona, o incluso con grupos focales, y dirigirlos en un ejercicio en lápiz y papel a la vez que intentaba documentar o anotar las cosas que decían acerca de estas áreas importantes era una labor muy complicada. La relación de una persona con el paisaje local es, en esencia, difusa y no puede ser captada fácilmente utilizando componentes tradicionales basados en mapas o entidades como puntos, líneas y polígonos. De manera que, a pesar de que se capta la escala, no se hace de manera eficiente y la intensidad de los significados que se le dan a los lugares no se capta en absoluto.

Para atender estos asuntos, el proyecto actual adopta métodos difusos para capturar las áreas del paisaje que las personas valorizan o para las cuales guardan un significado particular. Esto se fundamenta en la aplicación de un Applet con base Java para construir mapas llamados “Tagger” que utilizan una herramienta estilo rociador que le permite a los participantes definir las áreas sobre un mapa fijo, de tal manera que facilite la variación de la densidad y forma del área rociada (Evans y Waters 2007). Esta herramienta captura

conceptos espaciales difusos al definir las relaciones, así como la certidumbre/incertidumbre y la importancia de los significados relativos que se le dan a estos lugares. El sistema puede ser usado tanto en línea, a través del Internet, o fuera de línea en un ordenador portátil autónomo.

Metodología

Se utilizó una técnica de evaluación rápida expandida (Beebe 1995) para dirigir tres fases de recopilación de datos. Cada fase está guiada por objetivos específicos de la siguiente manera: En la Fase 1, las entrevistas a informantes conocedores clave se utilizaron para desarrollar un entendimiento de la gama y los tipos de significados relacionados con la Franja de Protección Tribal de las Mission Mountains y, para contrastar, también se consideró la zona silvestre, tanto para los miembros de las tribus como para los residentes no tribales de la Reserva Indígena Flathead (Watson et al. en prensa). En la Fase 2, se emplearon métodos SIG participatorios para ilustrar la intensidad y la distribución espacial de los significados diferenciados en la Fase 1 y documentar las amenazas percibidas sobre estos significados, únicamente dentro de la Franja de Protección. En la Fase 3, se están empleando entrevistas a grupos focales para entender mejor la interacción entre los significados del paisaje cartografiado en la Fase 2, las amenazas percibidas y las potenciales opciones de tratamiento de combustible.

Fase 1: entrevistas a informantes clave

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con miembros de las tribus y residentes no tribales de la Reserva Indígena Flathead para solicitar información acerca de la gama y los tipos de significados asociados con este paisaje (zonas silvestres y Franja de Protección). Siguiendo el trabajo de Lewis y Sheppard (2005), los informantes clave fueron seleccionados a base de los criterios a continuación: 1) el conocimiento, el entendimiento y la apreciación de los significados tradicionales tribales y no tribales asociados con el paisaje; 2) los roles en la comunidad que requieren una amplia exposición a las perspectivas y percepciones tribales y no tribales del paisaje; y 3) la capacidad para comunicarse con gente ajena a la tribu y la capacidad para discutir en detalle los asuntos importantes de la investigación.

Se les pidió a veintidós entrevistados que proveyeran información acerca de los significados relacionados con el paisaje durante entrevistas programadas y conducidas según su conveniencia. Estos análisis y resultados están descritos detalladamente en Watson et ál. (2007) y Watson et ál. (en prensa).

Fase 2: cartografía del paisaje

Los métodos usados aquí para captar lugares espacialmente difusos se inspira en trabajos anteriores de cartografiado de los significados que tienen los lugares (véase Gunderson y Watson 2007) y en los SIG participatorios (véase Carver et ál. 2001 y Evans y Waters 2007). Estos métodos se combinan en el desarrollo de una herramienta basada en SIG para recoger el conocimiento local cualitativo, pero espacialmente referenciado, de los informantes clave y de un público más amplio que represente tanto a los residentes tribales como a los no tribales. Estos son analizados mediante la elaboración de mapas compuestos a partir de mapas en los que se han marcado los atributos del paisaje obtenidos de los participantes de las encuestas, y el vincularlos con los comentarios solicitados durante el ejercicio de cartografía y que son anexados a los mapas creados. El resultado de esta fase del proyecto es un conjunto de datos de SIG que proveen una representación visual de la intensidad y la distribución espacial de los significados asociados con la Franja de Protección, así como comentarios acerca de las amenazas a estos significados.

Todos excepto uno de los veintidós entrevistados en la Fase 1 del proyecto participaron en la Fase 2. También se obtuvo insumo adicional por parte de otros residentes de la región a través de una versión en línea del sistema. Si bien se cree posible alcanzar la saturación en relación con la gama y los tipos de significados que tiene el paisaje mediante 15 a 20 entrevistas de informantes clave, una investigación realizada por Gunderson (2006) sugeriría que se requiere de un mayor número de participantes en la Fase 2 para captar la riqueza y la variedad en la distribución espacial de estos significados. Al inicio, treinta y cuatro sujetos participaron en una prueba del sistema para determinar la viabilidad de este sustituto computadorizado del método a lápiz y papel utilizado anteriormente. Algunos datos se recogieron fuera de línea utilizando un ordenador portátil. Otros se recogieron en línea vía Internet. Todos los ejercicios fuera de línea fueron asistidos por un miembro del equipo de investigación. A veces, esto se hacía para facilitar el que los participantes de mayor prioridad (por ejemplo, las personas mayores y las personas que habían participado antes) se involucraran y otras veces se hacía debido a la deficiencia en las destrezas en el manejo de ordenadores o de acceso al Internet. Aunque el ejercicio basado en Internet está abierto por un tiempo prolongado para permitir la participación de la comunidad y una mayor confiabilidad en la generalización, este trabajo ilustra los resultados de los primeros treinta y cuatro sujetos solamente.

Los datos fueron recogidos de forma tal que generaron cinco capas de mapas de significados por temas. Estos fueron resultado de los hallazgos de la Fase 1 y representan los significados que tiene la Franja de Protección para los miembros de la tribu: “la protección del bosque”, “la calidad del agua y de la vida silvestre”, “el recreo y los valores del

panorama”, “el acceso y los accesorios funcionales” y “los significados personales y culturales”. Para propósitos de demostración, este trabajo se centra en 154 imágenes que desarrollaron estos treinta y cuatro sujetos a través de las cinco capas temáticas. Para el mapa global y el proceso de categorización, se promediaron estas 154 imágenes y se produjeron imágenes usando clases basadas en agrupamientos naturales inherentes a los datos, con puntos de discontinuidad identificados eligiendo las discontinuidades de las clases que agrupan respuestas similares y maximizan las diferencias entre las clases (Jenks 1967). Para propósitos de análisis, luego son presentadas las cinco imágenes en capas de significados individuales, basadas en el mismo esquema de clasificación utilizado para desarrollar la imagen de “significado global”. Un análisis adicional es posible y se demuestra a través de análisis de una sola capa usando las clasificaciones de Jenks que se generaron de las respuestas a una sola capa de significados.

Fase 3: Entrevistas a grupos focales

Los objetivos de la tercera fase del proyecto son presentar los resultados de los SIG delineados anteriormente y discutirlos de manera colaborativa con los miembros de las tribus y los residentes no tribales en relación con los potenciales efectos de los diferentes métodos de tratamiento de combustible dentro de la Franja de Protección. Al momento en que se escribe este trabajo, esta tarea continúa. Se conducirán al menos dos entrevistas a grupos focales, facilitadas por miembros del equipo de investigación. La Fase 3 también cumple con el propósito muy positivo de informarle al público que sus puntos de vista están siendo valorados y que se están incorporando al proceso de planificación. Por lo tanto, están ayudando a romper una de las principales barreras en el cumplimiento de los objetivos del manejo de recursos: el mantener la confianza.

El desarrollo de una herramienta para cartografiar el paisaje y la interfaz con el usuario

La principal interfaz de los usuarios se basa en el *software* de definición de área difusa llamado “Tagger”, desarrollado por Evans y Waters (2007) como una aplicación Java que funciona en un ambiente de buscador Web estándar. El software utiliza una herramienta estilo rociador con la cual el usuario puede definir en un mapa las áreas difusas de densidad variada. Las variaciones de intensidad, o de importancia, pueden hacerse fácilmente según la cantidad que se rocíe sobre un área, logrando de esta manera que se vea más oscuro o más claro. La información de los atributos puede anexarse al área difusa a través del uso de cuadros de texto de formato libre. La interfaz básica consiste, en términos generales, de: una herramienta estilo rociador que le permite al usuario rociar áreas difusas sobre un mapa, botones de radio para seleccionar cuán grandes o pequeños serán los rociadores, un botón de “Borrar” para quitar cualquier rociamiento del mapa en uso, un botón de “Nueva área” para

guardar cualquier rociamiento y permitirle al usuario rociar sobre otra área, un botón de “Pintar todo” que abre una ventana de diálogo en la que se pregunta por un número del 0 al 100 por ciento para rociar uniformemente sobre un área completa, un botón de “Enviar todo”, que le envía todos los rociamientos guardados y los atributos anexados al servidor, y áreas de texto en las que se le pregunta al usuario “¿por qué las áreas son importantes?” y “¿cuáles son las amenazas sobre estas áreas?”

Los usuarios progresan a través de la aplicación linealmente, de la siguiente manera:

- 1) Bienvenida y descripción resumida de las tareas y de cualquier requisito técnico que se necesite;
- 2) Información de trasfondo acerca del proyecto, de los tratamientos de combustible y de fuego, y del área de la Franja de Protección;
- 3) Introducción al sistema de cartografiado, en el que se explican conceptos como “mientras más tiempo presione el botón del ratón más se oscurecerá; mientras más oscuro, más importancia tiene” mostrando ejemplos y cómo los participantes pueden usar la herramienta de cartografiado para indicar la intensidad;
- 4) Una página de práctica que le ayude a familiarizarse con la herramienta para rociar los mapas;
- 5) Un cuestionario con preguntas sobre la edad, el sexo, el lugar de residencia, si es parte de una tribu o no, el código de área y si están haciendo el ejercicio individualmente o en grupo;
- 6) Luego del cuestionario, se le pide a cada persona que “por favor, muestre en el próximo mapa las áreas que son más importantes para usted...” en cada una de las cinco capas de significados descritas en la Fase 1. Hay una opción para saltar un mapa, si así se desea.
- 7) Se suministraron mapas (de manera aleatoria, para ayudar a reducir los sesgos) para cada área: a) calidad del agua y la vida silvestre; b) acceso y accesorios funcionales; c) protección de la vida silvestre; d) significados personales y culturales y e) recreo y valores del panorama.
- 8) Aparte de indicar en cada mapa cuáles fueron las áreas de mayor importancia, los participantes también contestaron por qué esas áreas eran importantes y cuáles eran las amenazas sobre ellas.
- 9) Luego de finalizar todos los mapas, aparece una página de agradecimiento, junto con detalles adicionales acerca del proyecto.

Cada área rociada que suministra el usuario es procesada por el *software* “Tagger” a un formato estándar de imagen (gif y GeoTIFF) y luego es comprimida. La imagen y la información de los atributos asociados quedan archivadas y pueden verse tanto de manera individual como de manera combinada, mediante de un mapa “promedio” agregado, basado en las respuestas de todos los participantes. El sistema “Tagger” también incluye una función de búsqueda en la que los investigadores pueden oprimir sobre la imagen compuesta de las respuestas de todos los usuarios y buscar los textos asociados con esta área, ponderados por la intensidad. Las herramientas administrativas adicionales incluyen la capacidad de examinar, borrar o editar los mapas individuales y las respuestas escritas.

Resultados

Los resultados de la Fase 2 del ejercicio de cartografiado se muestran en la Figura 2 como un promedio global de los 154 mapas creados por los usuarios. Estos datos son preliminares y representan el esfuerzo inicial por lograr la participación del público en este proceso. Se incluyó una mezcla de participantes en línea (a través de Internet) y participantes fuera de línea (a través de ordenadores portátiles) y los resultados se monitorizaron para asegurar la calidad de los datos obtenidos. Luego de recoger estos datos preliminares con los treinta y cuatro participantes, se invitó al público general, a través de los medios de comunicación locales, a participar de este proceso, mediante anuncios en el semanario local y el portal Web de Intranet del gobierno tribal, de manera que aparecía en la página de inicio de todos los empleados.

Puede observarse en los mapas promediados de la Figura 3 que existen diferencias marcadas en los patrones espaciales y en la intensidad de los significados asociados con los cinco temas. Debe notarse que para facilitar la comparación, se utilizó el mismo esquema de clasificación y color en los cinco mapas temáticos y en el mapa de promedio general.

Figura 2 – Mapa compuesto de los resultados generales promediados (Método de Jenks, 10 categorías)

Figura 3—Resultados de las cinco capas de significados anexados a la Franja de Protección por los residentes tribales y no tribales (10 categorías –Método de Jenks, sacado del promedio general)

De los cinco temas, la protección del bosque muestra la mayor uniformidad, tal vez como resultado de la visión general que tienen los participantes de la Franja de Protección acerca de que es un área de política pública con valor universal. Una porción significativa de los participantes usó el botón de “Pintar todo” para aplicar una densidad de rociamiento uniforme más amplia para este tema, a fin de indicar un valor de escala amplia (cubriendo toda la Franja de Protección). El tema del acceso exhibe la menor extensión de lugares importantes cubiertos, lo que seguramente se debe a la presencia de terrenos privados dentro de la zona de amortiguación y el limitado número de puntos de acceso a las áreas silvestres. Los puntos críticos dentro de la capa de valores de recreo y panorámicos reflejan la localización de corredores de acceso y responden posiblemente a la frecuencia de las visitas a diversos lugares populares dentro de la Franja de Protección o del bosque. Queda claro que las áreas más remotas e inaccesibles también son altamente valoradas y tienen un significado en varias de las capas. El mapa para la calidad del agua y de la vida silvestre demuestra quizás la mayor variación espacial entre los cinco temas, ya que los usuarios identifican las áreas sin fijarse en la facilidad del acceso o en la frecuencia con que las usan, sino basándose más bien en las credenciales ambientales que tienen para la protección de la vida silvestre y del agua.

Ya que “la protección del bosque” es el significado más amplio que le asignan los sujetos a la zona de amortiguación, para propósitos ilustrativos, se presentan los resultados de las amenazas reportadas por los sujetos. Para treinta y cuatro residentes tribales y no tribales, las amenazas percibidas sobre el significado que la comunidad le da a este aspecto fueron divididas básicamente en cuatro categorías: la amenaza de incendios forestales, la explotación maderera intensa, las carreteras y el desarrollo, y el uso de vehículos fuera de la autopista.

La amenaza de incendios forestales se le atribuye mayormente a “más de ochenta años de restricción de incendio”, y al miedo de que los fuegos puedan suscitarse potencialmente a causa de “personas imprudentes”. “Los incendios incontrolables, ahora, serían desastrosos”, debido a la “exclusión tan prolongada del fuego”. “El no hacer nada” sigue siendo una amenaza para la función que tiene la zona de amortiguación como protectora del bosque. La gente se percata de que la zona de amortiguación está “demasiado llena” o “densa”, que existe una “acumulación de combustible”; se preocupan particularmente por el potencial de “un rodal reemplaza al fuego ahora”. El “peligro” asociado con los incendios forestales potenciales debido a los cambios en la vegetación y a la exclusión del fuego es un tema dominante de las amenazas sobre la capacidad que tiene esta área para proteger el bosque.

Aunque muchas personas reconocen la posibilidad de que ocurra un incendio forestal, la explotación maderera también se sitúa comúnmente entre la lista de amenazas, lo

que plantea el dilema que enfrentan los manejadores de los recursos tribales. Las amenazas se describen mayormente como “uso desmesurado de la tecnología moderna”, “explotación maderera intensa”, “comercio”, “tala extrema”, “tala comercial” y “tala a gran escala”, lo que sugiere que las personas no solo se preocupan por la tala, sino por la escala que pueda suponer la intensidad con que se tale.

Las preocupaciones de los residentes acerca del creciente desarrollo de accesos por carretera, la subdivisión de la propiedad y el uso de vehículos todo terreno y motocicletas dentro y fuera de las carreteras también representan importantes amenazas sobre la zona de amortiguación, aunque no se relacionan particularmente con el propósito de este trabajo. Algunas amenazas adicionales vinculadas con áreas específicas de la zona de amortiguación fueron la ganadería, el uso desmedido de las áreas de recreo, los caballos, la basura, los impactos sobre la calidad del agua y los brotes de insectos. Mientras que la mayoría de las personas indicaron que este significado estaba ampliamente vinculado a la zona de amortiguación más que cualquier otro significado más específico, muchos de estos significados estaban vinculados a áreas específicas de la zona de amortiguación, lo que brinda la oportunidad de fundamentar discusiones acerca de las prioridades que deben tener las medidas de manejo.

Se presentó un nivel adicional de análisis para la capa de “protección del bosque”. En este caso (Figura 4), se utilizó el método de Jenks para cartografiar los promedios obtenidos de los treinta individuos para la capa que representa a este significado. Dentro de este conjunto de datos, emergen algunas de las áreas de mayor prioridad.

Figura 4-- Resultados de todas las capas de significados para la “protección del bosque” vinculados a la Franja de Protección por los residentes tribales y no tribales (6 categorías – método de Jenks)

Conclusiones

Este trabajo describe un nuevo sistema de apoyo a la planificación dirigido a recopilar información contextual y espacial acerca de las percepciones que tiene el público sobre el paisaje para desarrollar un mejor entendimiento de los valores que se basan en la localidad. El acercamiento de tres fases usado aquí muestra un enfoque riguroso a la participación y la recopilación de datos al desarrollar estrategias de manejo y acciones públicamente aceptadas a la luz de múltiples puntos de vista que son espacialmente variables y que a veces están encontrados. El proceso descrito involucra métodos de recopilación de datos tanto de manera personal (cara a cara) como automatizada, entrevistando a participantes clave para informar el desarrollo y el uso de métodos automatizados para captar datos de los atributos y el espacio empleando interfaces computarizadas basadas en mapas.

Los resultados del cartografiado suponen que se ha logrado reflejar la riqueza de los significados vinculados con el complejo paisaje de la zona de amortiguación. La combinación de áreas difusas definidas por los usuarios y los métodos de recopilación de datos cualitativos han permitido que se delimite espacialmente una amplia gama de significados personales y comunitarios a través de un área extensa. La recopilación automatizada de datos y la disponibilidad de la versión en línea del sistema 24 horas al día también supone que el trabajo pueda abarcar una mayor audiencia de la que sería posible mediante métodos de encuestas sociales tradicionales en persona (cara a cara) o por medio de lápiz y papel, lo que posibilita análisis separados y detallados con una cantidad mayor de participantes. Además, el enlace de los patrones rociados según los temas y los atributos marcados junto con los perfiles de los usuarios hace posible un análisis detallado de las diferencias entre los diferentes grupos demográficos y de partes interesadas. Por ejemplo, en el análisis final, es muy posible que el enfoque recaiga sobre las respuestas de los miembros de las tribus. Sin embargo, para los administradores de las tierras y para el Concilio Tribal, también es de interés el poder entender las respuestas de los participantes no tribales. El conjunto de datos finales y las posibilidades de que haya futuros análisis representan una fuente muy rica para el desarrollo de políticas relacionadas con el manejo de los recursos, que tomen en consideración tanto las percepciones del público como las realidades del mundo físico en que se encuentran.

Reconocimientos

La colaboración entre las Tribus Confederadas Salish y Kootenai, el Instituto de Investigación Silvícola Aldo Leopold, la Universidad de Leeds y la Universidad de Montana

fue principalmente auspiciada por estas instituciones, con el financiamiento del U.S. National Plan y el Bitterroot Ecosystem Management Research Project.

Referencias

- Aplet, G.H. 2006. Evolution of wilderness fire policy. *International Journal of Wilderness* 12(1):9-13.
- Beebe, J. (1995) Basic concepts and techniques of rapid appraisal, *Human Organization* 54(1): 42-51.
- Carver, S., Evans, A., Kingston, R. and Turton, I. (2001) Public participation, GIS and cyberdemocracy: evaluating on-line spatial decision support systems, *Environment and Planning B: Planning and Design*. 28(6): 907-921.
- Confederated Salish and Kootenai Tribes (CSKT). (2005a) Confederated Salish and Kootenai Tribes Forestry Department Wilderness Buffer Zone Reclassification Environmental Assessment (Report prepared by the Buffer Zone Interdisciplinary Team), Confederated Salish and Kootenai Tribes of the Flathead Indian Reservation, Pablo, MO.
- Confederated Salish and Kootenai Tribes (CSKT). (2005b) Fire on the land: An interactive educational DVD. Confederated Salish and Kootenai Tribes of the Flathead Indian Reservation, Pablo, MO.
- Confederated Salish and Kootenai Tribes (CSKT). (2005c) Ecosystem Management on the Flathead Indian Reservation Confederated Salish and Kootenai Tribes Forestry Department, Pablo, MO.
- Evans, A.J. and Waters, T. (2007), 'Mapping Vernacular Geography: Web-based GIS Tools for Capturing "Fuzzy" or "Vague" Entities', *International Journal of Technology, Policy and Management* 7(2): 134-150.
- Gunderson, K. (2006) Understanding place meanings for wilderness: personal and community values at risk, *International Journal of Wilderness* 12(1): 27-31.
- Gunderson, K and Watson, A. (2007) Understanding place meanings on the Bitterroot National Forest, Montana, *Society and Natural Resources* 20: 705-721.
- Jenks, G.F. (1967) The Data Model Concept in Statistical Mapping, *International Yearbook of Cartography* 7: 186-190.
- Johnson, E.A., Miyanishi, K and Bridge, S.R.J. (2001) Wildfire Regime in the Boreal Forest and the Idea of Suppression and Fuel Buildup, *Conservation Biology* 15(6): 1554-1557.
- Lewis, J.L. and Sheppard, S.R.J. (2005) Ancient values, new challenges: Indigenous spiritual perceptions of landscapes and forest management, *Society and Natural Resources* 18: 907-920.
- Liljeblad, A. and Borrie, W.T. 2006. Trust in wildland fire and fuel management decisions. *International Journal of Wilderness* 12(1): 39-43.
- Miller, C. (2006) Wilderness fire management in a changing world, *International Journal of Wilderness* 12(1): 18-21.
- Watson, A., Knotek, K., Matt, R. and Yung, L. (2007) Understanding landscape meanings, attributes, and threats for the planning and application of fuel treatment and fire management on the Flathead Indian Reservation, Montana (Report to the Confederated Salish & Kootenia Tribes of Montana), Aldo Leopold Wilderness Research Institute, Missoula, MO.
- Watson, A., Matt, R., Knotek, K., Williams, D. and Yung, L. (In press) Traditional wisdom – protecting wilderness as a cultural landscape, *Proceedings Sharing Indigenous Wisdom International Conference, Green Bay, Wisconsin, June 2007*.

La FAO y sus Asociados en el Manejo de Incendios: Un Enfoque Participativo e Integrado¹

Pieter van Lierop²

Resumen

El artículo describe las diferentes funciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en el manejo de incendios.

Las tres funciones que se distinguen y describen son:

- Facilitar el desarrollo y la implementación de estrategias mundiales y regionales. Proporcionar las directrices y el acceso a acuerdos internacionales que promuevan la colaboración internacional y la revisión de las políticas, las prácticas y los planes necesarios para adoptar enfoques más integrados y holísticos en el manejo de incendios
- Producir y facilitar el acceso universal a la información, la terminología y los datos relacionados con el manejo de incendios
- Capacitar a los países en desarrollo, tanto a nivel nacional como regional, a través de publicaciones, adiestramientos, reuniones, trabajos de campo y otras actividades, enfocándose en enfoques participativos, en particular con las comunidades.

La FAO coordinó las Directrices de Carácter Voluntario para el Manejo del Fuego, así como la Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego, una sociedad mundial con Secretariado en la FAO. Ambas son herramientas y mecanismos importantes para fortalecer la capacidad del manejo de incendios.

Todas las actividades realizadas como parte de estas funciones incluyen dos enfoques considerados cruciales:

- Un enfoque participativo mediante el cual se llevan a cabo esfuerzos para involucrar a las partes interesadas en el manejo de incendios.
- Un enfoque integrado e intersectorial al manejo de incendios con componentes horizontales y verticales:
 - El enfoque vertical incluye todas las actividades relacionadas con el seguimiento y la evaluación del incendio, la prevención, la advertencia temprana, la preparación, la supresión, la monitorización y la evaluación hasta la restauración de los terrenos afectados; y

¹ Una versión abreviada de este trabajo se presentó en el Tercer Simposio Internacional Sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales: Problemas y Enfoques Comunes, 29 de abril - 2 de mayo de 2008; Carolina, Puerto Rico.

² Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales de la FAO, Termas de Caracalla, Roma, Italia

- El enfoque horizontal incluye los usos del terreno relacionados con la vegetación (los bosques, las praderas, los terrenos agrícolas, incluida la interfaz urbano-rural). La mayoría de los incendios comienza fuera de los bosques a raíz de otros usos del terreno, pero algunos incendios pueden iniciarse desde el interior del bosque y tener un impacto en los otros usos del terreno. Es por esto que se requieren enfoques integrados a los incendios en la vegetación, en vez de enfocarse únicamente en los incendios forestales.

Introducción

Durante los últimos 20 años, la FAO ha producido más de cien informes acerca de los incendios forestales y ha implementado más de sesenta proyectos de campo en alrededor de cuarenta países, con el apoyo del Departamento de Cooperación Técnica de la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros donantes bilaterales.

En el pasado, estos proyectos se desarrollaron mayormente a nivel nacional, a pesar de que se organizaron algunas actividades regionales en el Mediterráneo. Las actividades para el manejo de incendios realizadas por la FAO están siendo desarrolladas a nivel mundial cada vez más; por ejemplo, la organización de una estrategia que incremente la cooperación internacional en el manejo de incendios. Las distintas funciones de la FAO en el manejo de incendios pueden describirse de la siguiente manera:

- Facilitar el desarrollo y la implementación de estrategias mundiales y regionales;
- Producir y facilitar el acceso universal a la información y los datos relacionados con el manejo de incendios;
- Desarrollar la capacidad a nivel regional y nacional;
- Mejorar la cooperación internacional en el manejo de incendios

La mayoría de las actividades para el manejo de incendios desarrolladas por la FAO son puestas en vigor mediante asociaciones y con un enfoque participativo e integrado.

Una estrategia para mejorar la cooperación internacional

La Reunión Ministerial de la FAO sobre Bosques y la Decimoséptima Sesión del Comité de Montes de la FAO (COFO, por sus siglas en inglés), celebrada en marzo 2005 (Roma, Italia 2005), fue convocada por la FAO, con la colaboración de los países y otros socios internacionales, incluida la Estrategia Internacional para la

Reducción de Desastres (EIRD/ONU). Su propósito fue desarrollar una estrategia para mejorar la cooperación internacional en el manejo de incendios, que promueva el conocimiento, incremente el acceso a la información y a los recursos y explore nuevos enfoques para la cooperación en todos los niveles. La FAO también pidió que se prepararan directrices de carácter voluntario relativas a la prevención, la supresión y la recuperación tras los incendios forestales. La necesidad de herramientas que promuevan la cooperación internacional también ha sido recalcada en la Tercera Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales y la Cumbre Internacional sobre Incendios Forestales (Sydney, Australia 2003) debido al aumento en la incidencia de grandes incendios y la severidad de su impacto a nivel mundial.

Una reunión internacional de expertos (Madrid, mayo de 2006) estuvo de acuerdo en que la Estrategia para Aumentar la Cooperación Internacional para el Manejo de Incendios, que no es vinculante, incluya un marco que comprenda las siguientes partes: i) Directrices de Carácter Voluntario para el Manejo del Fuego; ii) Implementación de una Alianza o Sociedad; iii) Evaluación Mundial del Manejo de Incendios; y iv) Revisión de la Cooperación Internacional en el Manejo del Fuego

Figura 1 –Estrategia y componentes para Mejorar la Cooperación Internacional en el Manejo de Incendios, según coordinado por la FAO.

Estas herramientas han sido diseñadas especialmente para quienes formulan las políticas relacionadas con el uso del terreno, incluidos los gobiernos, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, para que ayuden en la formulación de las condiciones políticas, legales y reguladoras así como de acciones estratégicas para un enfoque más integral en el manejo de incendios. Su alcance incluye los impactos sociales, culturales, medioambientales y económicos, positivos o negativos, de los incendios forestales –naturales o planificados— en bosques, arboledas, pastizales, praderas y zonas agrícolas y rural-urbanas. El alcance del manejo del fuego incluye la advertencia temprana, la prevención, la preparación (internacional, nacional, sub-nacional y comunitaria), el ataque inicial seguro y eficaz a las incidencias de incendios y la restauración del paisaje tras el incendio.

Las directrices se utilizaron en dos talleres regionales en el Caribe en 2007 para desarrollar planes de acción nacional y propuestas para proyectos también a nivel nacional.

El propósito de la Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego es promover un manejo de incendios mejorado y reducir el daño ocasionado por los incendios en todo el mundo. Sus objetivos son:

- examinar y actualizar las Directrices de Carácter Voluntario para el Manejo del Fuego;
- animar a las partes interesadas en todos los niveles a adoptar y utilizar las Directrices de Carácter Voluntario;
- examinar las experiencias de la aplicación de las Directrices de Carácter Voluntario;
- fortalecer la cooperación internacional en el manejo de incendios.

La Alianza se fundó en el Congreso Internacional sobre Incendios Forestales en Sevilla, 2007, y ahora cuenta con 43 miembros de 23 países, incluidos organismos gubernamentales, institutos de investigación, universidades, asociaciones, empresas privadas, etc.

La FAO le provee a la Alianza las comunicaciones, la coordinación y los servicios relacionados a través del Secretariado. Cualquier organización, organismo o grupo puede pertenecer. Las solicitudes para pertenecer deben ser enviadas a la Secretaría. En ellas, se debe exponer el compromiso con el manejo de incendios, la intención de afiliarse a la Alianza y unirse a su Propósito, Objetivos y Principios. Un Grupo de Consulta aprueba las matrículas. Con regularidad, se informa a los miembros sobre las actividades de manejo de incendios realizadas por otros miembros y éstos podrán establecer asociaciones para sobrellevar los retos que enfrentan.

Es importante entender que los componentes de la estrategia fueron desarrollados por un grupo de socios y coordinados por la FAO. Entre los socios

colaboradores clave figuran: el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Centro Mundial para el Monitoreo de los Incendios, Australasian Fire Authorities Council [Concilio de Autoridades contra Incendios de Australasia], Corporación Nacional Forestal de Chile, South African Forestry Research Centre Jonkershoek [Centro de Investigación Forestal Sudafricana Jonkershoek], Servicio Nacional contra Incendios Forestales de España, The Nature Conservancy (TNC), New Zealand Rural Fire Office [Oficina de Incendios Rurales de Nueva Zelanda], Institut National de la Recherche Agronomique de France [Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de Francia], las Redes Regionales de Incendios Forestales de la ONU/EIRD, y el Instituto Ruso de adiestramiento en el Manejo de la Ecología y la Naturaleza. Sin embargo, una amplia gama de organizaciones para el manejo de incendios participó en el proceso que abarca a múltiples partes interesadas.

La FAO es miembro de la International Liaison Committee [Comité de enlace internacional] que ayuda al comité organizador de los Congresos Internacionales sobre Incendios Forestales, celebrados cada cuatro años.

Al reconocer la importancia de la cooperación regional, la FAO también apoya a las redes regionales de la ONU/EIRD sobre el manejo de incendios.

Construir la capacidad a nivel nacional y regional

Todos los proyectos de la FAO a nivel nacional (actualmente: la República Árabe Siria, Croacia, Nicaragua, Líbano, Zimbabwe, Marruecos, Cabo Verde) tienen un componente para construir la capacidad nacional. Esto puede consistir en adiestramiento, a menudo de brigadas locales contra incendios, constituidas por miembros de la comunidad. Sin embargo, también puede consistir en el desarrollo de nuevos marcos legales y/o políticas nacionales relacionadas con el manejo de incendios, o en la revisión de aquellos ya existentes.

La FAO, junto con sus asociados, también ha llevado a cabo talleres de adiestramiento regional sobre el Manejo de Incendios con Base Comunitaria: en Sudáfrica (2004) con el Centro Global para el Monitoreo de Incendios (CGMI), así como en Belice (2005) e Indonesia (2007) con The Nature Conservancy (TNC). Otra actividad para construir la capacidad regional ha sido el desarrollo de una política regional para la cooperación relacionada con el manejo de incendios en América Latina y el Caribe, al igual que el desarrollo de una estrategia para cada subregión: Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

El construir la capacidad regional también surgió durante dos talleres llevados a cabo en Cuba y Trinidad. Las partes interesadas nacionales en el manejo de incendios discutieron y analizaron las Directrices de Carácter Voluntario y desarrollaron estructuras de trabajo lógicas para llevar a cabo planes de acción nacional, con

duración de 3 a 5 años, y propuestas de proyectos a realizarse en dichas islas.

Un acceso universal a los datos y la información sobre el manejo de incendios

El proyecto Fire Information for Resource Management System (FIRMS) [Sistema de Información sobre Incendios para el Manejo de Recursos] brinda información a través de Internet, correos electrónicos y mensajes de texto a teléfonos móvil sobre los incendios activos detectados, utilizando las localizaciones descubiertas por las Imágenes de Espectro-diámetro de Resolución Moderada (MODIS, por sus siglas en inglés), procesadas por el Sistema de Respuesta Rápida MODIS. En esta iniciativa, trabajan en conjunto la Universidad de Maryland, la NASA y la FAO.

A través de los años, la FAO ha producido, o ha ayudado a producir, muchas publicaciones, tanto en papel como en versiones digitales para la página Web, sobre el manejo de incendios.

Algunos ejemplos de los trabajos publicados desde 2000 son:

- La Evaluación Mundial de Manejo del Fuego junto con las Redes Regionales de Incendios Forestales de la ONU/EIRD
- Las Directrices de Carácter Voluntario para el Manejo del Fuego (2007), actualmente disponibles en español, inglés, francés, ruso, indonesio/bahasa, coreano y que están siendo traducidas al portugués y al nepalés
- Una revisión del manual de adiestramiento (2007) acerca del manejo de incendios desarrollado por el Organismo de Desarrollo Internacional Finlandés (FINNIDA, por sus siglas en inglés) disponible en inglés y próximamente en español
- Dos publicaciones sobre el *Manejo del fuego por las comunidades* (2002, 2003) que presentan muchos estudios de caso de alrededor del mundo realizados junto con el proyecto FireFight South East Asia
- Un manual sobre protección contra incendios en el Mediterráneo (2001) realizado junto con el Instituto de Investigación Francés para la Agricultura y el Medio Ambiente (Cemagref, por sus siglas en francés), el Ministerio Francés para el Manejo del Terreno y el Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Piscicultura y Alimentos, próximamente disponible en tres idiomas
- Un informe sobre la última Consulta de Expertos sobre incendios forestales (Madrid, 2006)
- Un documento de trabajo sobre *Legal Frameworks for Forest Fire management: International Agreements and National Legislation* (2004)³

³ Todos los documentos de trabajo de la FAO sobre el manejo del fuego pueden encontrarse en: www.fao.org/forestry/site/35853/en |

[Directrices legales para el manejo de incendios: acuerdos internacionales y legislación nacional]

- Un documento de trabajo sobre el Modelo para Acuerdos Internacionales en el Manejo de Incendios Forestales (2004)

Mantenemos una página Web con las actividades, las publicaciones y los eventos realizados por la FAO sobre el manejo de incendios (www.fao.org/forestry/site/firemanagement/en) y también una página Web acerca de la Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego (www.fao.org/forestry/site/firealliance).

Esta página Web provee una bibliografía de las acciones sobre el manejo de incendios llevadas a cabo por los miembros de la Alianza, basándose en la información que ellos brindan. La lista de acciones será la herramienta clave para compartir el conocimiento y la experiencia sobre el manejo de incendios.

El enfoque participativo y las asociaciones

La FAO promueve un enfoque participativo en sus actividades relacionadas con el manejo del fuego al:

- Involucrarse con una variedad de instituciones, tanto de manera geográfica como según la representación de las partes interesadas, al desarrollar información mundial y regional al igual que instrumentos como el desarrollo de las Directrices de Carácter Voluntario y la Evaluación Mundial de Manejo de Fuego.

- Organizar talleres regionales sobre el Manejo de Incendios con Base Comunitaria;

- Aplicar los principios del Manejo de Incendios con Base Comunitaria en proyectos tanto a nivel nacional como a nivel de aldea.

Se recalca la necesidad de los enfoques participativos en los talleres regionales y en los proyectos, incluido el involucrar a los habitantes locales en la planificación e implementación de los programas; en la prevención, detección y control de los incendios forestales; así como en el manejo efectivo del uso del fuego como herramienta para el aclareo planificado del terreno y el manejo de las tierras usadas para el pastoreo.

Muchas de las Actividades para el Manejo de Incendios de la FAO (publicaciones, instrumentos mundiales, mejora de la capacidad regional) son desarrolladas mediante colaboraciones. La Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego servirá como la plataforma en la que se puedan formar y fortalecer muchas asociaciones.

Un enfoque integrado

Se necesitan acercamientos más amplios al paisaje ya que los incendios ocurren dentro y fuera de los bosques, afectando tanto a estos como a los otros usos del terreno. El concepto —~~manejo~~ manejo del fuego”, según la FAO, abarca todo tipo de incendio que ocurra en la vegetación: bosques, arboledas, chaparrales, praderas y pastizales y los incendios en la interfaz rural-urbana.

La FAO considera que las Políticas para el Manejo de Incendios deben establecer un balance en la atención que se le presta y los recursos que se asignan a todas las actividades relacionadas con el manejo de incendios —desde la prevención, la advertencia temprana, el monitoreo y la evaluación, la preparación y la supresión del fuego hasta la restauración de los terrenos afectados—. A menudo, luego de grandes incendios, existe una mayor demanda de equipo de supresión de alta tecnología pesada, mientras que es difícil obtener ayuda para realizar actividades de prevención cuando no han surgido incendios por algún tiempo.

La FAO apoya a las autoridades contra incendios rurales, en especial por el conocimiento que tienen acerca de los fuegos forestales y la participación comunitaria; lo que pudiera perderse si se fundiesen las autoridades contra incendios rurales y las metropolitanas (urbanas).

Muchos sectores y organismos están involucrados en el manejo de incendios, por lo que la coordinación es muy importante. Los marcos legales de los diferentes sectores deben ajustarse entre sí en vez de contradecirse; los diferentes sectores deben trabajar conjuntamente para la prevención, etc.

La complejidad del manejo de incidentes de incendios, junto con la creciente necesidad de que se involucren diversos organismos, ha aumentado la necesidad de un sistema de manejo de incidentes estándar e interorganizacional, como el Sistema de Comando de Incidente.

Retos futuros

A pesar de que las funciones y los enfoques de la FAO han cambiado, existen nuevos retos por venir. El primero es asistir a los países en el desarrollo, la adaptación e implementación de su política de manejo de incendios, guiados por directrices; especialmente en países donde el manejo de incendios participativo e integrado es un concepto nuevo.

El reto no es sólo para la FAO, sino también para las asociaciones, que han sido muy útiles en el desarrollo de la Estrategia y las Directrices de Carácter Voluntario. La Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego, establecida recientemente, tendrá un papel importante en esto.

Otro reto será el vincular las actividades para el manejo de incendios con la

mitigación del cambio climático y la adaptación a tal cambio.

Según la Evaluación de los Recursos Naturales Mundiales dirigida por la FAO (GFRA, por sus siglas en inglés), 2005, no existe, en el presente, una clasificación mundial que diferencie los incendios beneficiosos de los perjudiciales y, como consecuencia, no hay información detallada sobre los tipos de incendios en los bosques y otros terrenos silvestres. Para la FAO, es un reto producir información mundial sobre la totalidad de las áreas afectadas por los fuegos según el tipo de terreno (ya sea bosque, arboleda o cualquier otro terreno) y el tipo de incendio (ya sea incendio forestal o quema prescrita) con la GFRA 2010

No obstante, la FAO también exhorta al sector de la economía de incendios a proveer información acerca del impacto económico mundial de los incendios forestales para lograr desarrollar una base más fuerte con el fin de realizar actividades a nivel mundial sobre el manejo de incendios y convencer a las instituciones nacionales, regionales e internacionales, los organismos y los gobiernos de apoyar dichas actividades.

Referencias

- Colin et all. 2001. Protection des forêts contre l'incendie. Cahier FAO Conservation n° 36 Rome, 2001
- FAO. 2007. *Fire Management – global assessment 2006*. FAO Forestry Paper 151
- FAO. 2006. *Fire Management: Voluntary guidelines. Principles and strategic actions*. Fire Management Working 17. Rome
- FAO, 2006. *Global Forest resources Assessment 2005. Progress towards sustainable forest management*. FAO Forestry Paper 146.
- FAO (2004). *Legal Frameworks for Forest Fire Management: International Agreements and National Legislation. Follow-up Report to FAO/ITTO International Expert Meeting on Forest Fire Management, March 2001*. Forest Protection Working Papers, Working Paper FFM/3/E. Forest Resources Development Service, Forest Resources Division. FAO, Rome
- FAO and FireFight South East Asia (2003): *Community based Fire Management: case studies from China, The Gambia, Honduras, India, the Lao People's Democratic Republic and Turkey*. RAP Publication 2003/08, Bangkok, Thailand
- ILC (2003). *Legal International Wildland Fire Management Agreements Template*. The Template was prepared for the International Wildland Fire Summit held in Sydney, Australia in October 2003 by the International Liaison Committee. Working Paper FFM/2/E. Forest Resources Development Service, Forest Resources Division, FAO, Rome
- Moore et all (eds). 2002: *Communities in flames: proceedings of an international conference on community involvement in fire management*. FAO and FireFight South East Asia, RAP Publication 2002/25, Bangkok, Thailand